Table des matières

Stades repères **Page 2**

[repères végétatifs (2) ; échelles phénologiques (3)]

Liste des produits phytosanitaires autorisés en céréales **Page 4**

Réalisé en collaboration par le **CePiCOP et le Comité régional PHYTO** avec les données disponibles sur phytoweb.be en date du 17/01/2025 **et l'expertise du CRA-W dans le domaine.**
Vos remarques sont les bienvenues : 081/62 21 39 ou info@cepicop.be
Ces inventaires sont mis à jour régulièrement et
consultable sur https://centrespilotes.be/cp/cepicop/

!! Lire attentivement l'étiquette du produit avant toute utilisation !!

Herbicides **Page 6**

[Liste herbicide – Légendes (6) ; Sensibilité des adventices (7) ; Mode d'action des substances actives (8) ; Composition des produits (9) ; Herbicides de pré-semis à pré-émergence (10) ; Herbicides levée à début tallage (13) ; Herbicides tallage à gonflement gaine (19)]

Antiverse **Page 29**

Fongicides **Page 34**

[Introduction (34) ; orge, escourgeon (35) ; froment, seigle, triticale et épeautre (42) ; avoine (55)]

Insecticides **Page 58**

PPP autorisés autres céréales **Page 61**

Ce que vous pouvez trouver en ligne aux adresses

https://livre-blanc-cereales.be/ppp/
https://centrespilotes.be/cp/cepicop/cereales/produits-autorises/

- Anti-mousse, additif, mouillant, phytoprotecteur
- Traitements des semences
- Molluscicides

Outil agronomique et de traçabilité

Le CePiCOP édite et diffuse un **carnet de champ (format de poche)** pour collationner les interventions menées dans chaque parcelle de l'exploitation. Il constitue un outil dans le cadre de la traçabilité. Dans le contexte de l'auto-contrôle, il est adapté et peut servir de « fiche parcellaire ».

PRINCIPAUX STADES REPERES DE LA VEGETATION EN CEREALES

(A)	(B)	(C)	Brève description	Dates approximatives de la réalisation des stades en région limoneuse			
				Froment d'hiver	**Escourgeon et orge d'hiver**	**Froment de printemps et avoine**	**Orge de printemps**
21	E	2	Début tallage: début de l'apparition des tiges secondaires ou talles.	Fin d'hiver - début mars	Avant et pendant l'hiver	Fonction de la date de semis	
25	F	3	Plein tallage: plante étalée. Formation de nombreuses talles.	15-30 mars	01-10 mars	et des conditions	
30	G	4	Fin tallage: la tige maîtresse se redresse, les talles commencent à se redresser. Redressement: talles dressés. Début d'allongement.	10-15 avril	20-25 mars	Particulières de la saison.	
30	H	5	Epi à 1 cm: fin redressement. Tout début du 1er nœud.	20 avril	5-10 avril		
31	I	6	Premier nœud: se forme au ras du sol. Décelable au toucher.	5-10 mai	20-25 avril	15-20 mai	15-20 mai
32	J	7	Deuxième nœud: apparition du 2ème nœud sur la tige principale.	12-15 mai	1-5 mai	Fin mai	20-25 mai
37	K	8	Apparition de la dernière feuille: encore enroulée. Tige enflée au niveau de l'épi.	20-25 mai	6-10 mai	Début juin	1-10 juin
39	L	9	Ligule visible: ligule (oreillette) développée. Début de l'apparition des barbes pour l'escourgeon.	25 mai 1 juin	15 mai	-	-
51	N	10,1	Epi émerge: le sommet de l'épi sort de sa gaine.	Début juin	20-25 mai	10-15 juin	15-20 juin
59	O	10,5	Epi dégagé: épi complètement dégagé de sa gaine.	10-15 juin	Début juin	-	-

(A) : Echelle selon Zadoks
(B) : Echelle selon Keller et Baggiolini
(C) : Echelle selon Feekes et Large

	Levée	Une feuille	Deux feuilles	Trois feuilles	Début tallage	Plein tallage
BBCH	09	11	12	13	21	22 à 28
Zadoks	10	11	12	13	21	26
Keller et Baggioloni	A	B	C	D	E	F
Feekes et Large	1	1	1	1	2	3

Listes des produits phytopharmaceutiques autorisés en céréales

Les listes qui suivent ont été réalisées par le CRP de l'ASBL Corder sur base des données reprises sur le site internet www.phytoweb.be en date du **17/01/2025** et en collaboration avec le CePiCOP et le CRA-W.

Les conditions d'usage des produits inscrits dans ces listes sont synthétisées et sont susceptibles de changer.

Avant tout achat et/ou utilisation de ces produits, il est donc important de consulter le site www.phytoweb.be qui tient compte des dernières mises à jour et de l'entièreté des conditions d'application, et de lire l'étiquette du produit. Le site web www.phytoweb.be est la source de référence des produits phytopharmaceutiques autorisés en Belgique. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à la newsletter Phytoweb pour recevoir les dernières informations sur les retraits de produits et autres informations fédérales utiles.

N'oubliez donc pas de tenir compte des précautions d'utilisation et autres précautions spécifiques au produit que vous comptez utiliser (cultures suivantes, sensibilité variétale, alternance des modes d'action, mesures antiérosives, équipements de protection individuelle, mesures de protection des organismes non cibles…) **afin de limiter les problèmes de phytotoxicité, de dépassement des limites en résidus, de protéger votre santé et celle des autres, ainsi que de préserver l'environnement.**

Certains produits inscrits dans ces listes ont une date limite d'utilisation. Après cette date, ces produits ne pourront plus être utilisés et seront considérés comme des PPNU. Ils devront donc être séparés des autres produits dans le local phyto pour ensuite être rapportés auprès d'AgriRecover pour être recyclés. Il est donc important d'y être attentif afin d'éviter le gaspillage et des pertes économiques. Les campagnes de collecte des PPNU ont lieu cette année (durant les années impaires). Visitez le site www.agrirecover.eu pour connaitre les dates et lieux des points de collecte.

Pour rappel, afin d'assurer la traçabilité, il est obligatoire de tenir un registre d'entrée des produits achetés ainsi qu'un registre d'utilisation qui peut être tenu sous forme de carnet de champ comme celui du CePiCOP.

Le CRP de l'ASBL Corder ne peut en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dégâts, directs ou indirects, pouvant survenir suite à l'application des données fournies dans ces listes, à une attitude inadéquate ou à une négligence.

Comment utiliser ces listes ?
Afin de faciliter les recherches dans les pages jaunes, les produits sont classés par ordre alphabétique.
Les produits retirés du marché sont en gras-italique et leur date limite d'utilisation est inscrite entre parenthèses.
Les cases vides correspondent à des usages qui ne sont pas autorisés.
Plusieurs abréviations sont utilisées. En voici la signification :

- *Colonne formulation :*

CS : Suspension de capsules
DC : Concentré dispersable
EC : Concentré émulsionnable
ES : Émulsion pour traitement de semences
EW : Émulsion aqueuse
FS : Suspension concentrée pour traitement des semences
GR : Granulé
ME : Micro-émulsion
OD : Dispersion huileuse
RB : Appât prêt à l'emploi
SC : Suspension concentrée
SE : Suspo-émulsion
SG : Granulés solubles dans l'eau
SL : Concentré soluble
WG : Granulés à disperser dans l'eau
WP : Poudre mouillable
ZC : Suspension de capsules + suspension concentrée

- *Colonne AB :* Autorisé en agriculture biologique (mentionné par une croix)
- *Colonne cultures :* H : céréale d'hiver / P : céréale de printemps
- *Colonne stade d'application BBCH :* La signification des stades BBCH peut être consultée dans les pages n°-n°.
- *Colonne nombre d'applications maximum :*
  - /an : nombre d'applications sur une même terre pendant une année quoiqu'elle porte comme cultures
  - /culture : nombre d'applications par culture
- *Colonne DAR :* délai avant récolte

Voici les différentes listes de PPP autorisés en date du 12/01/2024 :

- **Agents anti-moussants, mouillants, phytoprotecteurs et additifs**
- **Herbicides** (pré-émergence, levée-début tallage et tallage-dernière feuille)
- **Régulateurs de croissance/antiverses**
- **Fongicides**
- **Traitements fongicides/insecticides de semences**
- **Insecticides** (contre pucerons et cécidomyies)
- **Molluscicides**
- **Blé dur, engrain/petit épeautre, amidonnier et blé poulard/barbu**

L'ensemble de ces tableaux sont mis à jour en septembre et consultables sur le site **https://centrespilotes.be/cp/cepicop/.** Vous pouvez également nous communiquer **vos remarques ou questions** au 0499/63.99.00 ou à l'adresse suivante : info@cepicop.be
De plus, si vous avez des questions à propos de la législation sur les produits phytopharmaceutiques en Wallonie, n'hésitez pas à contacter le CRP de l'asbl CORDER.
Par téléphone au 010/47 37 54 ou via l'adresse mail crp@corder.be .
Plus d'infos sur le nouveau site internet www.corder.be/crphyto .

Liste herbicide

Légende symbole des listes :

Ga = Graminées annuelles ; Da = Dicotylées annuelles ; Dv = Dicotylées vivaces.

Ch = Chardons ; Cd = Chiendent ; Co = Composées ; Cr = Crucifères ; Fa = Folle avoine ; Gg = Gaillet gratteron ; Jv = Jouet du vent ; Mc = Matricaire camomille ; Mo = Mouron des oiseaux ; Pa = Pâturin annuel ; Vc = Vulpin des champs.

* La dose maximum varie selon le type de sols et la culture.
** En mélange avec une huile de colza estérifiée ou une autre huile minérale.
*** En mélange avec un engrais azoté liquide, un mouillant ou un autre herbicide, la dose autorisée doit être diminuée de moitié.
**** Moitié de la dose max. si appliqué en mélange avec un produit autorisé contre le gaillet gratteron ou avec un engrais azoté liquide.
***** En mélange avec une huile de colza estérifiée à la dose de 1 l/ha.

° Avec action phytoprotectrice.
°° Les mélanges avec d'autres herbicides, huiles ou surfactants pourraient réduire l'efficacité du produit ou augmenter sa phytotoxicité.
°°° En mélange avec un adjuvant à base d'huile de colza estérifiée ou triglycéride éthoxylé 10 OE à la dose de 0,8 l/ha.
°°°° En mélange avec un adjuvant à base d'huile de colza estérifiée ou triglycéride éthoxylé 10 OE à la dose de 1 l/ha.

¶ Mode de pénétration racinaire (R) et/ou foliaire (F).
¶¶ Tenir compte de la sensibilité variétale. Pour les produits à base de clopyralid, ne pas les appliquer entre la mi-octobre et la mi-mars (protection des eaux souterraines).
Un délai d'attente avant la culture suivante est parfois obligatoire.

^ 1 kg d'éthofumesate /36 mois

Légende mode d'action :

1. Inhibition de l'acetyl-coenzyme A carboxylase
2. Inhibition de l'acetolactase synthase
3. Inhibition de l'assemblage des microtubules
4. Imitateur de l'auxine
5. Inhibition de la photosynthèse PS II - Serine 264
6. Inhibition de la photosynthèse PS II - Histidine 215
12. Inhibition de la biosynthèse des caroténoïdes
14. Inhibition de la protoporphyrinogène oxidase
15. Inhibition de la biosynthèse des longues chaines d'acides gras
23. Inhibition de l'organisation des microtubules
29. Inhibition de la synthèse de la cellulose
32. Inhibition de la solanesyl diphosphate synthase

*° Les usages des produits à base de prosulfocarbe ont été suspendus le 09/02/2024. Cela signifie que la vente et l'utilisation de ces produits ne sont plus permises jusqu'à nouvel ordre.

Sensibilité des principales adventices aux herbicides

Produits	N° du produit	FOLLE AVOINE	JOUET DU VENT	PATURIN	VULPIN	ALCHEMILLE	CAPSELLE BOURSE A PASTEUR	CHENOPODE BLANC	CHRYSANTHEME DES MOISSONS	COQUELICOT	FUMETERRE	GAILLET GRATTERON	LAMIER POURPRE	MATRICAIRE CAMOMILLE	MOURONS DES OISEAUX	PENSEE SAUVAGE	RENONCULE	RENOUEE FAUX LISERON	RENOUEE DES OISEAUX	RENOUEE PERSICAIRE	SENE MOUTARDE DES CHAMPS	SENECON	TABOURET DES CHAMPS	VERONIQUE DE PERSE	VERONIQUE FEUILLE DE LIERRE	CHARDON DES CHAMPS	LAITERON DES CHAMPS
Lutte contre les GRAMINEES																											
ALTIVATE	**4**	**S**	**S**	**S**	**S**	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
AVADEX FACTOR	**8**	**AS**	**S**	**S**	**S**	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
AXIAL et AXEO	**9**	**S**	**S**	**S**	**S**	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
FOXTROT	**35**	**S**	**AS**	(1)	**S**	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Lutte contre les GRAMINEES et les DICOTYLEES ANNUELLES																											
ARCHIPEL STAR	**5**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**		**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
ATTRIBUT	**6**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	R	**S**	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	**S**	R	**S**	R	R	R	R	R
CAPRI	**19**	**S**	**S**	**AS**	**S**	AR	**S**			R	R	**AS**	R	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	AR	**AS**	**S**	**S**		**S**	**S**	R	**AS**
CAPRI DUO	**20**	**S**	**S**	**AS**	**S**	AR	**S**			**S**	R	**S**	R	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**		**S**	**S**	**AS**	**S**
CAPRI FORTE et MANHATTAN FORTE	**21**	**S**	**S**	**AS**	**S**	AR	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	AR	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	R	**S**
CAPRI TWIN et BROADWAY	**22**	**S**	**S**	**AS**	**S**	AR	**S**			**S**	R	**S**	R	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**		**S**	**S**	**AS**	**S**
flufenacet	**12, 31 et 36**		**S**	**S**	**S**						R	AR		**AS**	**AS**	R							R	AR	R		
GORDIUM STAR	**37**	AR	**S**	**S**	R	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
HEROLD SC et autres produits	**40**		**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**		**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**		**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	R	R
HUSSAR ULTRA	**41**	AR	**S**	**S**	R	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**
KALENKOA	**44**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**AS**	**AS**	**AS**
LIBERATOR et GIDDO	**47**		**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**		**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**		**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	R	R
MALIBU	**48**	AR	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**	R	R
MANHATTAN	**49**	**S**	**S**	**AS**	**S**	AR	**S**	**S**		**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	AR	**AS**	**S**	**S**		**S**	**S**	R	**AS**
MATENO DUO	**50**	AR	**AS**	**AS**	R	**AS**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	AR	**S**	**S**	**S**	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	R	R
MONITOR	**52**	**AS**	**S**	**S**	AR	**AS**	**S**	**AS**	**AS**	R	**AS**	**S**	R	**S**	**S**	R	**S**	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	R	**S**	R	R	R	R
OTHELLO	**56**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	AR	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**AS**	**AS**	**AS**
PONTOS	**60**		**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**		**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**		**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	R	R
QUIRINUS	**64**		**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**		**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**		**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	R	R
REXADE TRIO	**65**	**AS**	**S**	R	**AS**	AR	**S**	**S**		**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**	AR	**S**
SIGMA FLEX	**67**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**AS**	AR	R	AR	AR	AR	AS	AR	AR	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	R	**S**	AR	R	AR	AR
SIGMA MAXX	**68**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**AS**	**AS**	AR	AR	**AS**	**AS**	**S**	**AS**	**AS**	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	**AR**	**S**	**AS**	AR	**AS**	**AS**
SIGMA PLUS et SIGMA SUPRA	**69**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	AR	**AS**	**AS**
SIGMA STAR	**70**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**		**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
TOLUREX SC et autres produits (2)	**74**	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	R	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	R	R	AR	**S**	**AS**	R	**AS**	**AS**	AR	AR	**AS**	**S**	**S**	R	R	R	R
TRINITY	**78**	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	AR	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	R	R
XERTON	**82**	AR	**AS**	**AS**	AR		AR	AR		R	AR	AR	R	R	**AS**	AR	AR	AR	AR	AR	R	R	R	AR	R	R	R
ZEPPOS et autres produits	**83**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	AR	**S**	AR	AR	AR	AR	**S**	**S**	AR	**AS**	**AS**	**AS**	AR	**S**	**S**	**S**	AR	AR	AR	AR
Lutte contre les DICOTYLEES ANNUELLES																											
ALLIE et autres produits	**1 et 43**	R	AR	R	R	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	R	R	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**AS**	R	**S**	**S**
ALLIE EXPRESS	**2**	R	R	R	R	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**
ALLIE STAR et BOUDHA	**3 et 17**	R	AR	R	R	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	AR	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**
AURORA 40 WG	**7**	R	R	R	R	R	**S**	**S**	R	**S**	AR	**S**	**S**	R	R	**AS**	R	R	R	R	**S**	R	AR	**S**	**AS**	R	R
AZ 500	**10**	R	R	R	R	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	R	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	R	R
BEFLEX et GOUPIL	**13**	R	**AS**	R	R	**S**	**S**			**AS**	**AS**			**AS**	**AS**	**S**	AR						**S**	**S**	AR		
BIATHLON	**14**	R	R	R	R	**AS**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	AR	**S**	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**
BIATHLON DUO	**15**	R	R	R	R	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	AR	**S**	**S**	**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**
CAMEO et autres produits	**18 et 77**	R	R	R	R	**AS**	**S**	**S**	AR	**S**	**AS**	AR	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	AR	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	R	**S**	**S**
CHEKKER	**23**	R	AR	AR	R	**AS**	**S**	**AS**	**AS**	**AS**	AR	**S**	**AS**	**S**	**S**	AR	**AS**	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	AR	AR	**AS**	**AS**
DIFLANIL 500 SC et autres produits	**29 et 58**	AR	AR	R	R	**AS**	**S**	**AS**	**AS**	AR	**AS**	AR	**S**	AR	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**AS**	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	**AS**	AR	R	R
DUPLOSAN et DUPLOSAN KV-P	**30**	R	R	R	R	R	**AS**	**S**	R	**S**	R	**S**	R	R	**S**	R	**S**	R	AR	AR	**S**	R	**S**	AR	AR	AR	AR
FLAME DUO	**33**	R	R	R	R	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	R	**S**	**S**
FOX 480 SC	**35**	R	R	R	R		**AS**	R		**AS**	AR	R	**S**			**S**		AR					**AS**	AR	**S**	**S**	
GRATIL	**39**	R	R	R	R	R	**AS**	R	R	AR	R	**S**	R	**AS**	AR	R	R	AR	AR	R	**S**	R	**S**	R	R	R	R
HARMONY M et autres produits	**27 et 39**	R	AR	AR	R	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	AR	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	AR	**S**	**S**
MATRIGON et autres produits	**26 et 51**	R	R	R	R	R	R	R	**S**	R	R	R	R	**S**	R	R	R	**AS**	R	R	R	**S**	**S**	R	R	**S**	**S**
OMNERA LQM	**54**	R	R	R	R	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	AR	**S**	**S**
PICO SOLO	**57**	R		R	R	**AS**	**S**			AR	AR	**AS**	**AS**	**AS**	**AS**	**S**					**S**	**AS**		**S**	**S**	R	R
PILOTI	**58**	R	R	R	R	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	AR	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**AS**	AR	**S**	**S**
PIXXARO EC et FRIMAX	**59**	R	R	R	R	AR	**AS**	**S**	R	**AS**	**S**	**S**	**S**	R	**S**	R	**S**	**S**	AR	**AS**	R	R		AR	AR	R	R
PRIMSTAR et autres produits	**45, 61 et 71**	R	R	R	R	**S**	**S**	R	**AS**	**S**	R	**S**	**AS**	**S**	**S**	R	**S**	**S**	AR	AR	**S**	**AS**	**S**	R	R	**AS**	**S**
PRIMUS et autres produits	**62**	R	R	R	R	**S**	**S**	R	**AS**	**AS**	R	**S**	R	**S**	**S**	R	**S**	**S**	**AS**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	R	R	AR	**AS**
PRIMUS PERFECT	**63**	R	R	R	R	**S**	**S**	R	**S**	**AS**	R	**S**	R	**S**	**S**	R	**S**	**S**	**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	R	R	**S**	**S**
SARACEN DELTA	**66**	AR	AR	R	R	**S**	**S**	**AS**	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**AS**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	AR	AR	**AS**
STARANE FORTE et autres produits	**11, 33 et 72**	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	**S**	AR	R	**S**	R	**S**	**AS**	**AS**	**AS**	AR	R	**S**	AR	AR	R	R
STOMP AQUA et autres produits	**53 et 73**	AR	**AS**	AR	AR	**AS**	**S**	**S**	R	**S**	**AS**	AR	**S**	AR	**S**	**S**	**S**	**AS**	**AS**	**S**	**AS**	R	**S**	**S**	**S**	R	R
TREVISTAR	**75**	R	R	R	R		**S**	AR		**AS**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**S**	R	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**		AR	AR	**S**	**S**
TREZAC	**76**	R	R	R	R		**AS**	**S**		**S**	**S**	**S**	**S**	R	**AS**	AR	**AS**	**AS**	**AS**	**AS**	R	R		AR	AR	R	**AS**
U-46-D-500 et autres produits	**79 et 80**	R	R	R	R	R	**AS**	**S**	R	**AS**	AR	R	**AS**	R	AR	AR	**AS**	R	R	R	**S**	**AS**	**S**	R	R	**AS**	AR
U 46 M et autres produits	**81**	R	R	R	R	R	**AS**	**S**	R	**AS**	R	R	R	R	R	R	**S**	R	R	R	**S**	**AS**	**S**	AR	AR	**AS**	R
ZYPAR et autres produits	**84**	R	R	R	R	AR	**S**	**S**	**AS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	R	**S**	**S**	AR	AR	**S**	**AS**		AR	AR	R	**S**
Lutte contre les DICOTYLEES ANNUELLES et VIVACES																											
BOFIX et KINVARA	**16 et 46**	R	R	R	R	R	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	AR	**AS**	**S**	R	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	AR	AR	**S**	**S**
CIRRAN et autres produits	**24 et 25**	R	R	R	R	R	**AS**	**S**	R	**AS**	R	R	R	R	R	R	**S**	R	R	R	S	**AS**	**S**	AR	AR	**S**	AR
DUPLOSAN SUPER et GRAMIX SUPER	**30**	R	R	R	R	R	**S**	**S**	R	**S**	**S**	**S**	**AS**	AR	**S**	R	**S**	**AS**	**AS**	**AS**	**S**	**AS**	**S**	**AS**	**AS**	**S**	**AS**

S= sensible ***AS***= Assez sensible AR= assez résistant R= résistant

(1) fenoxaprop + safener: Paturin commun: S; Paturin annuel: R

(2) ATTENTION: certaines variétés de froment sont sensibles au chlortoluron - la liste des variétés sensibles/tolérantes est disponible dans le Livre Blanc Céréales de septembre.

Mode d'action et famille chimique des substances

Modes d'action		Familles chimiques	Substances actives	Mode de pénétration	Produits
1	Inhibiteurs de l' ACCase	Aryloxyphenoxypropionates	fenoxaprop	foliaire	35
		Phenylpyrazolines	pinoxaden	foliaire	9
2	Inhibiteurs de l'ALS	Sulfonylurées	amidosulfuron	foliaire	23, 38, 69
			iodosulfuron	foliaire	5, 23, 37, 41, 44, 56, 68, 69, 70, 83
			mesosulfuron	foliaire	4, 5, 42, 44, 56, 67, 68, 69, 70, 83
			metsulfuron	foliaire	1, 2, 3, 17, 27, 39, 43, 54, 58
			sulfosulfuron	racinaire et foliaire	52
			thifensulfuron	foliaire	27, 39, 54
			tribenuron	foliaire	3, 17, 18, 32, 77
			tritosulfuron	foliaire	14, 15
		Triazolinones	propoxycarbazone	racinaire	6, 67
			thiencarbazone	racinaire et foliaire	5, 37, 42, 70
		Triazolopyrimidines	florasulam	foliaire	15, 20, 21, 22, 45, 61, 62, 63, 65, 66, 71, 75, 84
			pyroxsulam	foliaire	19, 20, 21, 22, 32, 49, 65
3	Inhibiteurs de l'assemblage des microtubules	Dinitroanilines	pendimethaline	racinaire	48, 53, 73, 78
4	Phytohormones	Acides phenoxy-carboxyliques	2,4-D	foliaire	24, 25, 79, 80
			dichlorprop-p	foliaire	30
			MCPA	foliaire	16, 24, 25, 30, 46, 81
			mecoprop-p	foliaire	29, 30
		Acides pyridine-carboxyliques	aminopyralide	foliaire	76
			clopyralide	foliaire	16, 26, 46, 51, 63, 75
			fluroxypyr	foliaire	11, 16, 33, 45, 46, 54, 59, 61, 71, 72, 75
		Arylpicolinates	halauxifen	foliaire	21, 49, 59, 65, 76, 84
5	Inhibiteurs de la photosynthèse	Urées	chlortoluron (1)	racinaire	74, 78
12	Inhibiteurs de la biosynthèse des caroténoides	Phenylethers	beflubutamide	racinaire et foliaire	13
			diflufenican	racinaire et foliaire	28, 40, 44, 47, 50, 55, 56, 58, 66, 78
			picolinafen	racinaire et foliaire	57, 60, 64
14	Inhibiteurs de la PPO	Diphenylethers	bifenox	foliaire	34
		Triazolinones	carfentrazone	foliaire	2, 7
15	Inhibiteurs de la biosynthèse des lipides	Benzofuranes	ethofumesate	foliaire	82
		Oxyacetamides	flufenacet	racinaire	12, 31, 36, 40, 47, 48, 60, 64
		Thiocarbamates	triallate	racinaire	8
29	Inhibiteurs de la biosynthèse de cellulose	Benzamides	isoxaben	racinaire	10
32	Inhibiteurs de la biosynthèse des caroténoides	Diphenylethers	aclonifen	racinaire	50

(1) ATTENTION: certaines variétés de froment sont sensibles au chlortoluron - la liste des variétés sensibles/tolérantes est disponible dans le Livre Blanc Céréales de septembre.

Composition des produits

	Noms commerciaux	Substances actives	Composition	Mode d'action	Voir produit N°
1	ALLIE et autres produits	metsulfuron	SG: 20%	2	43
2	ALLIE EXPRESS	carfentrazone + metsufluron	WG: 40 + 10 %	14 + 2	
3	ALLIE STAR	tribenuron + metsulfuron	SG: 22,2 + 11,1 %	2 + 2	17
4	ALTIVATE	mesosulfuron + safener	WG: 6 + 12 %	2	
5	ARCHIPEL STAR	mesosulfuron + iodosulfuron + thiencarbazone + safener	WG: 4,5 + 4,5 + 3,75 + 13,5%	2 + 2 + 2	70
6	ATTRIBUT	propoxycarbazone	SG: 70%	2	
7	AURORA 40 WG	carfentrazone	WG: 40%	14	
8	AVADEX FACTOR	triallate	CS: 450 g/L	15	
9	AXIAL et AXEO	pinoxaden + safener	EC: 50 + 12,5 g/L	1	
10	AZ 500	isoxaben	SC: 500 g/L	29	
11	BARCLAY HURLER 200 et autres produits	fluroxypyr	EC: 200 g/L	4	33, 72
12	BATTLE et autres produits	flufenacet	SC: 500 g/L	15	31, 36
13	BEFLEX et GOUPIL	beflubutamide	SC: 500 g/L	12	
14	BIATHLON	tritosulfuron	WG: 71,4 %	2	
15	BIATHLON DUO	tritosulfuron + florasulam	WG: 71,4 + 5,4 %	2 + 2	
16	BOFIX	mcpa + fluroxypyr + clopyralide	EW: 200 + 40 + 20 g/L	4 + 4 + 4	46
17	BOUDHA	tribenuron + metsulfuron	WG: 25 + 25 %	2 + 2	3
18	CAMEO et ASSYNT	tribenuron	SG: 50%	2	77
19	CAPRI	pyroxsulam + safener	WG: 7,5 + 7,5 %	2	
20	CAPRI DUO	pyroxsulam + florasulam + safener	WG: 7,1 + 1,4 + 7,1%	2 + 2	22
21	CAPRI FORTE et MANHATTAN FORTE	pyroxsulam + halauxifen + florasulam + safener	WG: 18,8 + 5,2 + 3,8 + 26,6 %	2 + 4 + 2	65
22	CAPRI TWIN et BROADWAY	pyroxsulam + florasulam + safener	WG: 6,8 + 2,3 + 6,8 %	2 + 2	20
23	CHEKKER	amidosulfuron + iodosulfuron + safener	WG: 12,5 + 1,25 + 12,5 %	2 + 2	
24	CIRRAN	mcpa + 2,4-D	SL: 315 + 360 g/L	4 + 4	25
25	CIRRAN EXTRA et DAMEX FORTE SUPER	mcpa + 2,4-D	SL: 345 + 345 g/L	4 + 4	24
26	CLAP	clopyralide	SL: 300 g/L	4	51
27	CONNEX et RACING EXTRA	thifensulfuron + metsulfuron	WG: 68,2 + 6,8	2 + 2	39
28	DIFLANIL 500 SC et autres produits	diflufenican	SC: 500 g/L	12	55
29	DUPLOSAN KV-P et DUPLOSAN	mecoprop-p	SL: 600 g/L	4	
30	DUPLOSAN SUPER et GRAMIX SUPER	dichlorprop-p + mcpa + mecoprop-p	SL: 310 + 160 + 130 g/L	4 + 4 + 4	
31	FENCE	flufenacet	SC: 480 g/L	15	12, 36
32	FLAME DUO	tribenuron + florasulam	SG: 25 + 10%	2 + 2	
33	FLUROSTAR 180 et GALGONE 180 SC	fluroxypyr	EC: 180 g/L	4	11, 72
34	FOX 480 SC	bifenox	SC: 480 g/L	14	
35	FOXTROT	fenoxaprop + safener	EW: 69 + 35 g/L	1	
36	GLOSSET SC	flufenacet	SC: 600 g/L	15	12, 31
37	GORDIUM STAR	iodosulfuron + thiencarbazone + safener	WG: 3,3 + 2,5 + 15	2 + 2	
38	GRATIL	amidosulfuron	WG: 75%	2	
39	HARMONY M	thifensulfuron + metsulfuron	SG: 40 + 4 %	2 + 2	27
40	HEROLD SC et autres produits	flufenacet + diflufenican	SC: 400 + 200 g/L	15 + 12	47
41	HUSSAR ULTRA	iodosulfuron + safener	OD: 100 + 300 g/L	2	
42	INCELO	mesosulfuron + thiencarbazone + safener	WG: 4,5 + 1,5 + 11,25%	2 + 2	
43	ISOMEXX et autres produits	metsulfuron	WG: 20%	2	1
44	KALENKOA	diflufenican + mesosulfuron + iodosulfuron + safener	OD: 120 + 9 + 7,5 + 27 g/L	12 + 2 + 2	56
45	KART et autres produits	fluroxypyr + florasulam	SE: 100 + 1 g/L	4 + 2	61, 71
46	KINVARA	mcpa + fluroxypyr + clopyralide	ME: 233 + 50 + 28 g/L	4 + 4 + 4	16
47	LIBERATOR et GIDDO	flufenacet + diflufenican	SC: 400 + 100 g/L	15 + 12	40
48	MALIBU	pendimethaline + flufenacet	EC: 300 + 60 g/L	3 + 15	
49	MANHATTAN	pyroxsulam + halauxifen + safener	WG: 25 + 7 + 35,4 %	2 + 4	
50	MATENO DUO	aclonifen + diflufenican	SC: 500 + 100 g/L	32 + 12	
51	MATRIGON et autres produits	clopyralide	SL: 100 g/L	4	26
52	MONITOR	sulfosulfuron	WG: 80%	2	
53	MOST MICRO et RAMPAR	pendimethaline	CS: 365 g/L	3	73
54	OMNERA LQM	fluroxypyr + thifensulfuron + metsulfuron	OD: 135 + 30 + 5 g/L	4 + 2 + 2	
55	OSSETIA et autres produits	diflufenican	WG: 50%	12	28
56	OTHELLO	diflufenican + mesosulfuron + iodosulfuron + safener	OD: 50 + 7,5 + 2,5 + 22,5 g/L	12 + 2 + 2	44
57	PICO SOLO	picolinafen	WG: 75 %	12	
58	PILOTI	diflufenican + metsulfuron	WG: 60 + 6 %	12 + 2	
59	PIXXARO EC et FRIMAX	fluroxypyr + halauxifen + safener	EC: 280 + 12 + 12	4 + 4	
60	PONTOS	flufenacet + picolinafen	SC: 240 + 100 g/L	15 + 12	64
61	PRIMSTAR et autres produits	fluroxypyr + florasulam	SE: 100 + 2,5 g/L	4 + 2	45, 71
62	PRIMUS et autres produits	florasulam	SC: 50 g/L	2	
63	PRIMUS PERFECT	clopyralide + florasulam	SC: 300 + 25 g/L	4 + 2	
64	QUIRINUS	flufenacet + picolinafen	SC: 240 + 50 g/L	15 + 12	60
65	REXADE TRIO	pyroxsulam + florasulam + halauxifen + safener	WG: 24 + 10 + 10 + 21%	2 + 2 + 4	21
66	SARACEN DELTA	diflufenican + florasulam	SC: 500 + 50 g/L	12 + 2	
67	SIGMA FLEX	propoxycarbazone + mesosulfuron + safener	WG: 6,75 + 4,5 + 9%	2 + 2	
68	SIGMA MAXX	mesosulfuron + iodosulfuron + safener	OD: 10 + 2 + 30 g/L	2 + 2	83
69	SIGMA PLUS et SIGMA SUPRA	amidosulfuron + mesosulfuron + iodosulfuron + safener	WG: 5 + 3 + 1 + 9%	2 + 2 + 2	
70	SIGMA STAR	mesosulfuron + thiencarbazone + iodosulfuron + safener	WG: 4,5 + 2,25 + 0,9 + 13,5 %	2 + 2 + 2	5
71	SPITFIRE	fluroxypyr + florasulam	SE: 100 + 5 g/L	4 + 2	45, 61
72	STARANE FORTE	fluroxypyr	EC: 333 g/L	4	11, 33
73	STOMP AQUA	pendimethaline	CS: 455 g/L	3	53
74	TOLUREX SC et autres produits	chlortoluron (1)	SC: 500 g/L	5	
75	TREVISTAR	fluroxypyr + clopyralide + florasulam	EC: 144 + 80 + 2,5 gL	4 + 4 + 2	
76	TREZAC	halauxifen + aminopyralide + safener	EC: 21 + 25 + 30 g/L	4 + 4	
77	TRIBE et autres produits	tribenuron	WG: 75%	2	18
78	TRINITY	pendimethaline + chlortoluron + diflufenican	SC: 300 + 250 + 40 g/L	3 + 5 + 12	
79	URI	2,4-D	SL: 600 g/L	4	80
80	U-46-D-500 et autres produits	2,4-D	SL: 500 g/L	4	79
81	U 46 M et autres produits	mcpa	SL: 750 g/L	4	
82	XERTON	ethofumesate	SC: 417 g/L	15	
83	ZEPPOS et autres produits	mesosulfuron + iodosulfuron + safener	WG: 0,6 + 3 + 9 %	2 + 2	68
84	ZYPAR et autres produits	halauxifen + florasulam + safener	OD: 6 + 5 + 6 g/L	4 + 2	

(1) ATTENTION: certaines variétés de froment sont sensibles au chlortoluron - la liste des variétés sensibles/tolérantes est disponible dans le Livre Blanc Céréales de septembre.

Herbicides (1/3) - Pré-semis à pré-émergence (BBCH00-08) (màj : 17-01-2025)																													
Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	Culture(s)														Cible(s)			Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine		Graminées annuelles	Dicotylées		le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps		Annuelles	Vivaces	50%	75%	90%	50%	75%	90%
AAKO CHLORTOLURON 500 SC¶¶	500 g/l chlortoluron	5	74	9549P/B	SC	R	01-08	3 l/ha*	1/an	x		x		x		x						Ga	Da		6	6	6	2	2	1
ARNOLD	400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	40	10877P/B ; 1351P/P	SC	R/F	00-08	0,6 l/ha	1/culture	x		x		x		x		x				Ga	Da		-	20	10	-	20	10
AVADEX FACTOR	450 g/l triallate	15	8	10947P/B	CS	R	Pré-semis 01-08	3,6 l/ha	1/culture	x	x	x		x	x	x	x					Ga Vc Fa			-	-	20	-	-	20
							Après le semis, pré-émergence			x	x	x		x	x	x	x					Ga Vc Fa			-	-	20	-	-	20
AZ 500	500 g/l isoxabène	29	10	7573P/B	SC	R	01-08	0,2 l/ha	1	x		x		x		x							Da		6	6	6	5	2	1
BATTLE	500 g/l flufénacet	15	12	10886P/B	SC	R	00-08	0,5 l/ha	1	x		x		x				x				Ga			-	-	10	-	-	10
BEFLEX	500 g/l béflubutamide	12	13	10124P/B	SC	R/F	01-08	0,4 l/ha	1	x		x		x		x		x					Da		30	20	10	30	20	10
BRODAL	500 g/l diflufénican	12	28	35305P/B	SC	R/F	01-08	0,1l/ha	1/culture	x		x		x		x		x		x			Da		10	6	6	10	5	1
CARPATUS	400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	40	11084P/B	SC	R/F	00-07	0,6 l/ha	1/culture	x		x		x		x		x				Ga	Da		6	6	6	5	2	1
CEVINO 500 SC	500 g/l flufénacet	15	12	31446P/B	SC	R	Pré-émergence	0,24-0,3 l/ha	1/culture	x		x										Ga	Da		10	6	6	10	5	1
CHLOORTOLURON 500 SC¶	500 g/l chlortoluron	5	74	7980P/B	SC	R	01-07	3 l/ha*	1/an	x		x		x		x						Ga	Da		6	6	6	2	2	1
CHLORTOLURON 500 SC¶¶ (DLU : 30-04-2025)	***500 g/l chlortoluron***	***5***	***74***	***1311P/P***	***SC***	***R***	***01-07***	***3 l/ha****	***1/an***	***x***		***x***		***x***		***x***	***x***					***Ga***	***Da***		***10***	***6***	***6***	***10***	***5***	***1***
DIFLANIL 500 SC	500 g/l diflufénican	12	28	9408P/B	SC	R/F	01-08	0,375 l/ha	1/an	x		x		x	x	x	x	x	x				Da		10	6	6	10	5	1
DIFLUSTAR 500	500 g/l diflufénican	12	28	30594P/P	SC	R/F	01-08	0,375 l/ha	1/culture	x		x		x	x	x	x	x	x				Da		6	6	6	2	2	1
FLUENT 500 SC	500 g/l flufénacet	15	12	10988P/B	SC	R	00-08	0,4 l/ha	1	x		x		x		x		x				Ga			6	6	6	5	2	1
FLUENT 500 SC (DLU : 15-06-2026)	***500 g/l flufénacet***	***15***	***12***	***1352P/P***	***SC***	***R***	***00-08***	***0,4 l/ha***	***1***	***x***		***x***		***x***		***x***		***x***				***Ga***			***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***

Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration[F]	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	Culture(s)										Cible(s)		Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
									Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine		Graminées annuelles	Dicotylées	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
									Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps		Annuelles / Vivaces	50%	75%	90%	50%	75%	90%
240 g/l flufénacet 100 g/l picolinafen	15 12	60	1408P/P	SC	R/F	00-09	1l/ha	1			x		x								Ga Vc Jv	Da	10	6	6	10	5	1
400 g/l flufénacet 100 g/l diflufénican	15 12	47	10806P/B	SC	R/F	00-08	0,6 l/ha	1culture	x		x				x						Ga	Da	6	6	6	5	2	1
600 g/l flufénacet	15	36	11009P/B	SC	R	00-07	0,2 l/ha	1culture					x				x				Ga		10	6	6	10	5	1
500 g/l béflubutamide	12	13	11071P/B	SC	R/F	01-08	0,4 l/ha	1	x		x		x		x		x					Da	30	20	10	30	20	10
400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	40	9533P/B	SC	R/F	01-08	0,6 l/ha	1	x		x										Ga	Da	-	20	10	-	20	10
500 g/l diflufénican	12	28	24950P/P	SC	R/F	01-08	0,375 l/ha	1culture	x		x		x		x		x					Da	10	6	6	10	5	1
500 g/l isoxabène	29	10	1100P/P	SC	R	01-08	0,2 l/ha	1	x		x		x		x							Da	6	6	6	5	2	1
500 g/l isoxabène	29	10	26708P/P	SC	R	01-08	0,2 l/ha	1	x		x		x		x							Da	6	6	6	5	2	1
500 g/l chlortoluron	5	74	8875P/B	SC	R	01-08	3 l/ha*	1/an	x		x		x		x						Ga Vc	Da	10	6	6	10	5	1
400 g/l flufénacet 100 g/l diflufénican	15 12	47	9681P/B	SC	R/F	00-08	0,6 l/ha	1culture	x		x		x		x						Ga	Da	6	6	6	5	2	1
300 g/l pendiméthaline 60 g/l flufénacet	3 15	48	9316P/B	EC	R	00-09	2,5 l/ha	1/an	x		x										Ga	Da	10	6	6	10	5	1
500 g/l aclonifène 100 g/l diflufénican	32 12	50	11094P/B	SC	R/F	00-07	0,7 l/ha	1culture			x		x								Jv Pa	Dv	20	10	6	20	10	5
							0,35 l/ha										x					Dv	10	6	6	10	5	1
365 g/l pendiméthaline	3	53	10330P/B	CS	R	01-08	2,2 l/ha	1culture	x													Da	10	6	6	10	5	1
400 g/l flufénacet 100 g/l diflufénican	15 12	40	10603P/B	SC	R/F	00-08	0,6 l/ha	1culture	x		x		x		x		x				Ga	Da	6	6	6	5	2	1
400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	40	12240P/B	SC	R/F	00-08	0,6 l/ha	1culture	x		x		x		x		x				Ga	Da	10	6	6	10	5	1
400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	40	11212P/B	SC	R/F	00-08	0,6 l/ha	1culture	x		x		x		x		x				Ga	Da	10	6	6	10	5	1
50 % diflufénican	12	55	10622P/B	WG	R/F	01-08	0,24 kg/ha	1	x		x		x		x		x					Da	10	6	6	10	5	1
							0,125 kg/ha			x		x										Da	10	6	6	10	5	1

Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	Culture(s)										Cible(s)			Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
									Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine		Graminées annuelles	Dicotylées annuelles	Dicotylées vivaces	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
									Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps				50%	75%	90%	50%	75%	90%
750 g/l picolinafène	12	57	11252P/B	WG	F	00-08	0,133 kg/ha	1	x		x		x		x							Da		-	20	10	10	20	10
240 g/l flufénacet 100 g/l picolinafen	15 12	60	10604P/B	SC	R/F	00-09	1l/ha	1/culture	x		x		x		x						Ga Vc Jv	Da		10	6	6	10	5	1
455 g/l pendiméthaline	3	73	28123P/P	CS	R	00-08	2 l/ha	1	x													Da		10	6	6	10	5	1
240 g/l flufénacet 50 g/l picolinafen	15 12	64	10605P/B	SC	R/F	00-08	1l/ha	1/culture	x		x		x		x						Ga Vc Jv	Da		6	6	6	5	2	1
500 g/l diflufénican	12	28	35531P/B	SC	R/F	01-08	0,375 l/ha	1/culture	x		x		x	x	x	x						Da		10	6	6	10	5	1
365 g/l pendiméthaline	3	53	10590P/B	CS	R	01-08	2,2 l/ha	1/culture	x													Da		10	6	6	10	5	1
500 g/l diflufénican	12	28	1196P/P	SC	R/F	01-08	0,375 l/ha	1/an	x		x		x	x	x	x	x	x				Da		10	6	6	10	5	1
400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	40	11030P/B	SC	R/F	00-09	0,6 l/ha	1/culture	x		x		x		x							Da		-	20	10	-	20	10
500 g/l diflufénican	12	28	10088P/B	SC	R/F	01-08	0,375 l/ha	1	x		x		x	x	x	x						Da		6	6	6	2	2	1
500 g/l flufénacet	15	12	11213P/B	SC	R	01-08	0,48 l/ha	1	x		x										Ga			20	10	6	20	10	5
455 g/l pendiméthaline	3	73	9839P/B ; 24949P/P ; 25298P/P	CS	R	01-08	2 l/ha	1/culture	x												Ga			6	6	6	1	1	1
500 g/l flufénacet	15	12	10938P/B	SC	R	00-08	0,36 l/ha 0,48 l/ha	1/culture	x		x		x								Da	Da		10	6	6	10	5	1
50 % diflufénican	12	55	10839P/B	WG	R/F	01-08	0,125 kg/ha 0,24 kg/ha	1		x		x		x		x					Pa Jv Vc	Da		10	6	6	10	5	1
500 g/l chlortoluron	5	74	7733P/B	SC	R	01-08	3 l/ha*	1/an	x		x		x		x						Ga	Da	Dv	6	6	6	2	2	1
500 g/l diflufénican	12	28	9653P/B	SC	R/F	01-08	0,375 l/ha	1/an	x		x		x		x							Da		10	6	6	10	5	1
300 g/l pendiméthaline 250 g/l chlortoluron 40 g/l diflufénican	3 5 12	78	10572P/B	SC	R/F	00-08	2 l/ha	1/an	x		x		x								Ga Jv	Da		10	6	6	10	5	1
50 % diflufénican	12	55	10992P/B	WG	R/F	01-08	0,125 kg/ha 0,24 kg/ha	1		x		x									Ga Jv	Da		20	10	6	20	10	5
500 g/l diflufénican	12	28	32586P/P	SC	R	01-08	0,375 l/ha	1	x		x		x	x	x	x	x	x				Da		10	6	6	10	5	1
500 g/l isoxabène	***29***	***10***	***11372P/P***	***SC***	***R***	***01-08***	***0,2 l/ha***	***1***	***x***		***x***		***x***		***x***							***Da***		***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***

Herbicides (2/3) - Levée à début tallage (BBCH09-20) (màj : 17-01-2025)

Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration¶	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	Culture(s)												Cible(s)			Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine					le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Graminées annuelles	Dicotylées Annuelles	Dicotylées Vivaces	50%	75%	90%	50%	75%	90%
ABUTO	200 g/kg metsulfuron-méthyle	2	1	31885P/B	WG	F	20	25 g/ha	1/an	x		x		x		x		x					Da	Dv	6	6	6	1	1	1
							13-20	30 g/ha			x		x		x		x						Da	Dv						
ACCURATE	20 % metsulfuron-méthyle	2	1	9551P/B	WG	F	10-19	0,02 kg/ha°°	1/an		x		x		x		x		x		x		Da	Dv	-	6	6	-	1	1
							20	0,025 kg/ha		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da	Dv						
ALLIE	20 % metsulfuron-méthyle	2	1	9450P/B	SG	F	12-20	0,03 kg/ha°°	1	x		x		x	x	x	x	x	x				Da	Dv	6	6	6	1	1	1
ALLIE STAR	11,1% metsulfuron-méthyle 22,2 % tribénuron-méthyle	2 2	3	9795P/B	SG	F	12-20	0,045 kg/ha	1	x		x		x		x		x	x				Da	Dv	6	6	6	1	1	1
ALTIVATE	60 g/kg mésosulfuron-méthyl 120 g/kg méfenpyr-diéthyl (Phytoprotecteur)	2 PP	4	32471P/B	WG	F	20	0,25 kg/ha	1/culture			x										Vc Fa			6	6	6	1	1	1
								0,15 kg/ha					x	x								Pa Jv								
ARNOLD	400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	40	10877P/B ; 1351P/P	SC	R/F	09-13	0,6 l/ha	1/culture	x		x		x		x		x				Ga	Da		-	20	10	-	20	10
ARYLEX TECHNICAL°	7,5 g/l cloquintocet-méxyl 7,8 g/l halauxifène-méthyle	pp 4	-	10517P/B	EC	F	10-20	1 l/ha	1/an	x		x		x		x		x					Da		-	20	10	-	20	10
							13-20	0,8 l/ha			x		x		x		x		x				Da								
ASSYNT	500 g/kg tribenuron-méthyle	2	18	10704P/B	SG	F	20	30 g/ha	1	x		x											Da		10	6	6	10	5	1
											x		x										Da		6	6	6	1	1	1
ATTA-DIFLUCAN	400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	40	11207P/B	SC	R/F	11-13	0,6 l/ha	1/culture	x		x		x				x				Ga	Da		10	6	6	10	5	1
AXEO°	12.5 g/l cloquintocet-méxyl 50 g/l pinoxaden	pp 1	9	9603P/B	EC	F	13-20	0,9 l/ha	1/culture	x	x	x	x	x	x	x	x					Fa Jv Vc			6	6	6	1	1	1
								1,2 l/ha		x		x		x	x	x	x					Vc								
AXIAL°	12.5 g/l cloquintocet-méxyl 50 g/l pinoxaden	pp 1	9	9602P/B	EC	F	13-20	0,9 l/ha	1/culture	x	x	x	x	x	x	x	x					Fa Jv Vc			6	6	6	1	1	1
								1,2 l/ha		x		x		x	x	x	x					Vc								
AZ 500	500 g/l isoxabène	29	10	7573P/B	SC	R	09-13	0,2 l/ha	1	x		x		x		x							Da		6	6	6	5	2	1
BATTLE	500 g/l flufénacet	15	12	10886P/B	SC	R	09-21	0,5 l/ha	1	x		x		x				x				Ga			-	-	10	-	-	10
BEFLEX	500 g/l béflubutamide	12	13	10124P/B	SC	R/F	09-20	0,4 l/ha	1	x		x		x		x		x					Da		30	20	10	30	20	10
BIATHLON (DLU : 30-06-2025)	***71,4 % tritosulfuron***	***2***	***14***	***9779P/B***	***WG***	***F***	***13-20***	***0,07 kg/ha***	***1***		***x***		***x***		***x***		***x***				***x***		***Da***		***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
BIATHLON DUO (DLU : 30-06-2025)	***5,4 % florasulame 71,4 % tritosulfuron***	***2 2***	***15***	***10263P/B***	***WG***	***F***	***13-20***	***0,04 kg/ha***	***1/culture***		***x***		***x***		***x***		***x***				***x***		***Da***		***-***	***6***	***6***	***-***	***1***	***1***
								0,07 kg/ha			***x***		***x***		***x***		***x***				***x***		***Gg***	***Dv***						

Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	Culture(s)														Cible(s)		Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive									
										Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine		Graminées annuelles	Dicotylées		le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage					
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps		Annuelles	Vivaces	50%	75%	90%	50%	75%	90%			
BOUDHA	25 % metsulfuron-méthyle 25 % tribénuron-méthyle	2 2	17	10190P/B	WG	F	12-19 20	0,008 kg/ha 0,01kg/ha	1/an	×	×	×	×										Da		-	-	6	-	-	1		
BRODAL	500 g/l diflufénican	12	28	35305P/B	SC	R/F	01-08	0,375 l/ha	1/an	×		×											Da		10	6	6	10	5	1		
CAMEO	50 % tribénuron-méthyle	2	18	9581P/B	SG	F	12-20	0,045 kg/ha	1	×		×											Da	Dv	6	6	6	2	2	1		
CAPRIFORTE	37,5 g/kg florasulam 52,1g/kg halauxifène-méthyl 187,5 g/kg pyroxsulam 266 g/kg cloquintocet-acide (Phytoprotecteur)	2 4 2 pp	21	28801P/B	WG	-	12-20	0,1kg/ha	1/culture			×	×				×					Vc Pa Jv	Da		-	-	20	-	-	20		
CARPATUS	400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	40	11084P/B	SC	R/F	11-13	0,6 l/ha	1/culture	×		×		×			×					Ga	Da		20	10	6	20	10	5		
CEVINO 500 SC	500 g/l flufénacet	15	12	31446P/B	SC	R	11-20 12-20	0,35 l/ha	1/culture		×											Ga	Da Ga		10	6	6	10	5	1		
CONNEX	68,2 % thifensulfuron-méthyle 6,8 % metsulfuron-méthyle	2 2	27	9814P/B	WG	F	12-20	0,06 kg/ha	1	×	×	×	×	×	×								Da		6	6	6	1	1	1		
DEFT	20 % metsulfuron-méthyle	2	1	9552P/B	WG	F	10-19 20	0,02 kg/ha	1/an		×	×	×		×	×	×	×	×	×	×		Da Da	Dv Dv	-	-	6	-	-	1		
DIFLANIL 500 SC	500 g/l diflufénican	12	28	9408P/B	SC	R/F	09-20	0,375 l/ha	1/an	×		×		×			×						Da		10	6	6	10	5	1		
DIFLUSTAR 500	500 g/l diflufénican	12	28	30594P/P	SC	R/F	09-20	0,375 l/ha	1/culture	×		×		×			×						Da		6	6	6	2	2	1		
FENCE	480 g/l flufénacet	15	31	10523P/B	SC	R	11-13	0,5 l/ha	1/culture			×										Ga			6	6	6	5	2	1		
FINY	20 % metsulfuron-méthyle	2	1	9482P/B	SG	F	12-20	0,03 kg/ha	1	×		×		×			×						Da	Dv	-	-	6	-	-	1		
FORASULAM 50 SC	50 g/l florasulame	2	62	28884P/P	SC	F	14-20	0,05 l/ha 0,1 l/ha 0,05 l/ha 0,1 l/ha	1/culture	×	×	×	×										Da Mo	Mc	-	-	10	-	-	10		
										×	×	×	×												-	-	10	-	-	10		
														×	×	×	×						Da Mo	Mc	-	-	10	-	-	10		
																		×	×						-	-	10	-	-	10		
FLORELCO	50 g/l florasulame	2	62	1205P/P	SC	F	14-20	0,05 l/ha 0,1 l/ha	1/culture	×	×	×	×							×	×		Da Mc Mo		6	6	6	1	1	1		
														×	×	×	×						Da Mc									
																		×	×				Gg									
FLUENT 500 SC	500 g/l flufénacet	15	12	10988P/B	SC	R	09-16	0,4 l/ha	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	Ga			6	6	6	5	2	1		
FLUENT 500 SC (DLU : 15-06-2026)	***500 g/l flufénacet***	***15***	***12***	***13527P/P***	***SC***	***R***	***09-16***	***0,4 l/ha***	***1***	***x***		***x***		***x***		***x***		***x***				***Ga***			***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***		

Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration[a]	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	Culture(s)										Cible(s)		Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine				le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Graminées annuelles	Dicotylées Annuelles / Vivaces	50%	75%	90%	50%	75%	90%
FLUPICOS 340 SC	240 g/l flufénacet 100 g/l picolinafen	15 12	60	1408P/P	SC	R/F	10-29	0,5 l/ha	1	×		×		×		×		×				Ga	Da	10	6	6	10	5	1
FOXTROT°	69 g/l fenoxaprop-P-éthyle 34,5 g/l cloquintocet-mexyl	1 pp	35	9705P/B	EW	F	13-20	1 l/ha	1	×		×		×		×		×				Ga		6	6	6	1	1	1
FRAGMA	50 g/l florasulame	2	62	10349P/B	SC	F	14-20	0,05 l/ha***	1/culture	×		×		×						×			Da Mc Mo						
															×						×		Da Mc Gg	-	-	10	-	-	10
								0,1 l/ha***		×	×									×	×		Gg						
FRIMAX°	280 g/l fluroxypyr 12,5 g/l halauxifène-méthyle 12 g/l cloquintocet-mexyl	4 4 pp	59	10595P/B	EC	F	13-20	0,5 l/ha	1/an		×						×						Da	-	6	2	1		
								0,25 l/ha															Dv						
GIDDO	400 g/l flufénacet 100 g/l diflufénican	15 12	47	10806P/B	SC	R/F	09-20	0,6 l/ha	1/culture	×		×				×						Ga	Da	6	6	6	5	2	1
GLOBUS	50 g/l florasulame	2	62	10997P/B	SC	F	14-20	0,05 l/ha***	1/culture	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				Da	-	-	6	-	-	1
								0,1 l/ha***		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				Gg						
GLOSSET SC	600 g/l flufénacet	15	36	11009P/B	SC	R	11-13	0,4 l/ha	1	×		×		×		×						Ga		10	6	6	10	5	1
GOUPIL	500 g/l béflubutamide	12	13	11071P/B	SC	R/F	09-20	0,4 l/ha	1	×		×		×		×							Da	30	20	10	30	20	10
GRANIPROP 600 SC (DLU : 15-06-2026)	***400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican***	***15 12***	***40***	***1269P/P***	***SC***	***R/F***	***11-13***	***0,6 l/ha***	***1***	***x***		***x***		***x***								***Ga***	***Da***	***10***	***6***	***6***	***10***	***5***	***1***
GRATIL	75 % amidosulfuron	2	38	8316P/B	WG	F	13-20	0,04 kg/ha	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				Cr Gg	6	6	6	1	1	1
HARMONY M	40 g/kg metsulfuron-méthyle 400 g/kg thifensulfuron-méthyle	2 2	39	9510P/B	SG	F	12-20	0,1 kg/ha	1	×		×		×									Da	6	6	6	1	1	1
HEROLD SC	400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	40	9533P/B	SC	R/F	11-13	0,6 l/ha	1/culture	×		×				×						Ga	Da	-	10	6	-	10	5
INCELO**	47 g/kg mésosulfuron-méthyl 12,5 g/kg méfenpyr-diéthyl 15,8 g/kg thiencarbazone-méthyl	2 pp 2	42	12211P/B	WG	F	13-20 13-20	0,2 kg/ha 0,33 kg/ha	1			×										Pa Jv Vc	Da	6	6	6	2	2	1
INTER DIFLUFENICAN 500 SC	500 g/l diflufénican	12	28	24950P/P	SC	R/F	09-20	0,375 l/ha	1	×		×		×		×		×					Da	10	6	6	10	5	1
INTER ISOXABEN 500	500 g/l isoxabène	29	10	11100P/P	SC	R	09-13	0,2 l/ha	1	×		×		×		×							Da	6	6	6	5	2	1
INTER RETIL SC	400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	40	24970P/P	SC	R/F	11-13	0,6 l/ha	1/culture	×		×				×						Ga	Da	10	6	6	10	5	1
ISOMEXX	20 % metsulfuron-méthyle	2	43	9481P/B	WG	F	10-19 20	0,02 kg/ha°° 0,025 kg/ha°°	1/an				×		×		×		×		×		Da Dv	6	6	6	1	1	1
ISOMEXX WG	200 g/kg metsulfuron-méthyle	2	43	31150P/B	WG	F	20	0,025 kg/ha°°	1/an	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				Da Dv	-	6	6	-	1	1
ISOXABELCO 500	500 g/l isoxabène	29	10	26708P/P	SC	R	09-13	0,2 l/ha	1	×		×		×									Da	6	6	6	5	2	1
LIBERATOR	400 g/l flufénacet 100 g/l diflufénican	15 12	47	9683P/B	SC	R/F	10-29	0,6 l/ha	1/culture	×		×				×						Ga	Da	6	6	6	5	2	1

Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration[1]	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	Culture(s)														Cible(s)			Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine							le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Graminées annuelles	Dicotylées annuelles	Dicotylées vivaces	50%	75%	90%	50%	75%	90%
LOUKOUM 600 SC (DLU : 30-04-2026)	***400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican***	***15 12***	***40***	***1283P/P***	***SC***	***R/F***	***11-13***	***0,6 l/ha***	***1/culture***	***x***		***x***		***x***				***x***				***Ga***	***Da***		***10***	***6***	***6***	***10***	***5***	***1***
MALIBU	300 g/l pendiméthaline 60 g/l flufénacet	3 15	48	9316P/B	EC	R	10-20	2 l/ha	1/an	x		x										Jv	Da		10	6	6	10	5	1
								3 l/ha		x		x										Ga								
MANHATTAN	69,5 g/kg halauxifène-méthyl 250 g/kg pyroxsulam 354 g/kg cloquintocet-acide (Phytoprotecteur)	4 2 pp	49	28074P/B	WG	-	10-20	0,075 kg/ha	1/culture			x		x		x		x				Vc Pa Jv	Da		-	-	10	-	-	10
MANHATTAN FORTE	37,5 g/kg florasulam 52,1g/kg halauxifène-méthyl 187,5 g/kg pyroxsulam 266 g/kg cloquintocet-acide (Phytoprotecteur)	2 4 2 pp	21	30264P/B	WG	-	12-20	0,1kg/ha	1/culture			x		x		x		x				Vc Pa Jv	Da		-	-	20	-	-	20
MATENO DUO	500 g/l aclonifène 100 g/l diflufénican	32 12	50	11094P/B	SC	R/F	10-13	0,7 l/ha	1/culture			x		x		x						Jv Pa	Da	Dv	20	10	6	20	10	5
								0,35 l/ha		x								x					Da	Dv	10	6	6	10	5	1
MATTERA°	6,25 g/l halauxifène-méthyle 6 g/l cloquintocet-méxyl 5 g/l florasulame	4 pp 2	84	10657P/B	OD	F	11-20	0,75 l/ha	1/an	x		x		x		x		x					Da Gg		-	-	6	-	-	1
							13-20			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Da Gg							
							11-20	0,5 l/ha												x			Da								
MAXADEN°	12.5 g/l cloquintocet-méxyl 50 g/l pinoxaden	pp 1	9	1201P/P	EC	F	13-20	0,9 l/ha	1/culture	x	x	x	x	x	x	x	x					Vc Fa Jv			6	6	6	1	1	1
								1,2 l/ha		x		x		x	x	x	x					Vc								
MERTIL	400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	40	10833P/B	SC	R/F	11-13	0,6 l/ha	1/culture	x		x		x				x				Ga	Da		10	6	6	10	5	1
MERTIL (DLU : 30-04-2026)	***400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican***	***15 12***	***40***	***1350P/P***	***SC***	***R/F***	***11-13***	***0,6 l/ha***	***1/culture***	***x***		***x***		***x***				***x***				***Ga***	***Da***		***10***	***6***	***6***	***10***	***5***	***1***
METRO SG	20 % metsulfuron-méthyle	2	1	10143P/B	SG	F	12-20	0,03 kg/ha°°	1	x		x		x		x		x		x			Da	Dv	6	6	6	5	2	1
METSULFURON 20% WG	20 % metsulfuron-méthyle	2	1	1335P/P	WG	F	10-19	0,02 kg/ha	1/an		x		x		x		x		x		x		Da	Dv	-	-	6	-	-	1
							20	0,025 kg/ha		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da	Dv						
MONITOR	80 % sulfosulfuron	2	52	9158P/B	WG	R/F	13-21	0,0125 kg/ha**	2 (4 sem.)			x		x	x	x	x					Ga	Da		6	6	6	2	2	1
MOST MICRO	365 g/l pendiméthaline	3	53	10330P/B	CS	R	09-20	2,2 l/ha	1/culture	x													Da		10	6	6	10	5	1
							11-12					x											Da							
NACETO	400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	40	10603P/B	SC	R/F	11-13	0,6 l/ha	1/culture	x		x		x		x				x		Ga	Da		20	10	6	20	10	5
NAVIGATE	400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	40	11240P/B	SC	R/F	09-13	0,6 l/ha	1/culture	x		x		x		x		x				Ga	Da		10	6	6	10	5	1
NUCLEUS	400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	40	11212P/B	SC	R/F	09-13	0,6 l/ha	1/culture	x		x		x		x		x				Ga	Da		10	6	6	10	5	1
OSSETIA	50 % diflufénican	12	55	10622P/B	WG	R/F	09-20	0,24 kg/ha	1	x		x		x	x	x	x	x	x				Da		10	6	6	10	5	1
								0,125 kg/ha			x		x										Da							
PICO SOLO	750 g/l picolinafène	12	57	11252P/B	WG	F	09-20	0,133 kg/ha	1	x		x		x		x		x					Da		-	20	10	-	20	10

Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration[a]	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	Culture(s)												Cible(s)		Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine		Céréales annuelles	Dicotylées		le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps		Annuelles	Vivaces	50%	75%	90%	50%	75%	90%
PIXXARO EC°	280 g/l fluroxypyr 125 g/l halauxifène-méthyle 12 g/l cloquintocet-méxyl	4 2 pp	59	10575P/B	EC	F	13-20	0,25 l/ha 0,5 l/ha	1/an														Da	Dv	-	6	6	-	2	1
PONTOS	240 g/l flufénacet 100 g/l picolinafen	15 12	60	10604P/B	SC	R/F	10-20	0,5 l/ha	1/culture	x		x		x		x					Ga		Da		10	6	10	-	5	1
PRIMUS	50 g/l florasulame	2	62	9074P/B	SC	F	14-20	0,05 l/ha*** 0,1l/ha*** 0,05 l/ha***	1/culture	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Da Mc Mo Gg Da Mc		6	6	6	1	1	1
PRIMUS PERFECT¶¶	300 g/l clopyralide 25 g/l florasulame	4 2	63	10317P/B	SC	F	14-20	0,15 l/ha	1/an	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Da		-	-	-	-	-	1
PROWL AQUA	455 g/l pendiméthaline	3	73	28123P/P	CS	R	11-12 09-20	2 l/ha	1		x		x		x								Da		10	6	10	-	5	1
QUIRINUS	240 g/l flufénacet 50 g/l picolinafen	15 12	64	10605P/B	SC	R/F	10-20	1 l/ha	1/culture	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Ga Vc Jv	Da		10	6	10	-	5	1
QUOTIENT	500 g/l diflufénican	12	28	35531P/B	SC	R/F	09-20	0,375 l/ha	1/culture	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Da		10	6	10	-	5	1
RACING EXTRA	68 %thifensulfuron-méthyle 7 %metsulfuron-méthyle	2 2	27	10021P/B	WG	F	12-20	0,06 kg/ha	1	x	x			x	x	x	x	x	x				Da		6	6	6	2	2	1
RAMPAR	365 g/l pendiméthaline	3	53	10590P/B	CS	R	09-20 11-12	2,2 l/ha	1/culture	x		x											Da		10	6	10	10	5	1
RELIANCE	400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	40	10739P/B	SC	R/F	11-13	0,6 l/ha	1/culture	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Ga	Da		10	6	10	10	5	1
RENITAR°	6,25 g/l halauxifène-méthyle 6 g/l cloquintocet-méxyl 5 g/l florasulame	4 pp 2	84	10656P/B	OD	F	11-20 13-20 13-20	0,75 l/ha 0,5 l/ha	1/an	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Da Gg Da Gg Da		-	-	6	-	-	1
SARACEN DELTA	500 g/l diflufénican 50 g/l florasulame	12 2	66	10386P/B	SC	R/F	12-22	0,075 l/ha	1/an	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Da		-	-	10	-	-	10
SATURNE 500 SC	500 g/l diflufénican	12	28	1196P/P	SC	R/F	09-20	0,375 l/ha 0,125 l/ha	1/an	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Da		10	6	10	10	5	1
SAVVY	20 %metsulfuron-méthyle	2	1	9980P/B	WG	F	10-19 20	0,02 kg/ha° 0,025 kg/ha°	1/an		x		x		x		x		x				Da	Dv	-	6	-	-	6	1
SEIBOLD	400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	40	11030P/B	SC	R/F	10-13	0,6 l/ha	1/culture	x		x		x		x		x			Ga		Da		20	10	20	-	20	10

Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration[3]	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	Culture(s)										Cible(s)		Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Orge		Froment		Triticale		Epeautre		Seigle		Avoine		Graminées annuelles	Dicotylées	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps		Annuelles / Vivaces	50%	75%	90%	50%	75%	90%
SEMPRA	500 g/l diflufénican	12	28	10088P/B	SC	R/F	09-20	0,375 l/ha	1	x													Da	6	6	6	2	2	1
SIRIONOVA	500 g/l flufénacet	15	12	11213P/B	SC	R	09-20	0,48 l/ha	1			x	x									Ga		20	10	6	20	10	5
STOMP AQUA	455 g/l pendiméthaline	3	73	9539P/B ; 24949P/P ; 25208P/P	CS	R	09-20	2 l/ha	1'culture					x	x							Ga	Da	6	6	6	1	1	1
							11-12									x	x							10	6	6	10	5	1
SUNFIRE	500 g/l flufénacet	15	12	10938P/B	SC	R	09-20	0,36 l/ha	1'culture	x	x	x	x	x	x							Jv Pa		10	6	6	10	5	1
								0,48 l/ha														Vc						
THEIA	50 %diflufénican	12	55	10819P/B	WG	R/F	09-20	0,125 kg/ha	1														Da	10	6	6	10	5	1
								0,24 kg/ha		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Da						
TOUCAN	500 g/l diflufénican	12	28	9653P/B	SC	R/F	09-20	0,375 l/ha	1'an	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Da	10	6	6	10	5	1
TREVISTAR¶¶¶	100 g/l fluroxypyr 80 g/l clopyralide 2,5 g/l florasulame	4 4 2	75	9799P/B	EC	F	13-20	1 l/ha	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Da	Dv	-	-	6	-	-	1
TREZAC°	313 g/l halauxifène-méthyle 30 g/l cloquintocet-mexyl 25 g/l aminopyralide	2 pp 4	76	10791P/B	EC	F	13-20	0,2 l/ha	1			x	x			x	x						Da		-	6	6	-	1	1
TRIBE	750 g/kg tribenuron-méthyle	2	77	10843P/B	WG	F	20	0,02 kg/ha	1	x	x	x	x	x	x			x	x				Da		6	6	6	1	1	1
TRIMONO	80 %sulfosulfuron	2	52	1172P/P	WG	R/F	13-21	0,0125 kg/ha**	2 (4 sem.)			x	x	x	x	x	x			Ga			Da		6	6	6	2	2	1
TRINITY¶¶¶	300 g/l pendiméthaline 250 g/l chlorotoluron 40 g/l diflufénican	3 5 12	78	10572P/B	SC	R/F	09-20	2 l/ha	1'an			x	x							Ga Jv			Da		10	6	10	5	1
										x	x			x	x								Da	20	10	6	20	10	5
TUSK	50 %diflufénican	12	55	10992P/B	WG	R/F	09-20	0,125 kg/ha	1			x	x										Da		6	6			
								0,24 kg/ha		x	x			x	x	x	x	x	x					10			10	5	1
UPTON (DLU : 30-04-2025)	***50 g/l florasulame***	***2***	***62***	***11053P/B***	***SC***	***F***	***14-20***	***0,05 l/ha******	***1/culture***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***				***D a M c M o***						
								0,1 l/ha***		***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***							***Gg***		***-***	***-***	***6***	***-***	***-***	***1***
VSM DIFLUFENICAN	500 g/l diflufénican	12	28	32586P/P	SC	R	09-20	0,375 l/ha	1	x				x	x	x	x	x	x				Da	10	6	6	10	5	1
VSM ISOXABEN 500 (DLU : 30-06-2025)	***500 g/l isoxabène***	***29***	***10***	***11372P/P***	***SC***	***R***	***09-13***	***0,2 l/ha***	***1***	***x***		***x***		***x***									***Da***	***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***
WOPRO SULFOSULFURON 80	80 %sulfosulfuron	2	52	1406P/P	WG	R/F	13-21	12,5 g/ha**	1			x	x	x	x	x	x						Da	6	6	6	6	2	1
XERTON	417 g/l éthofumesate^	15	82	11229P/B	SC	-	11-20	0,6 l/ha	1	x		x										Pa Jv		6	6	6	1	1	1
ZYPAR°	6,25 g/l halauxifène-méthyle 6 g/l cloquintocet-méxyl 5 g/l florasulame	2 pp 2	84	10655P/B	OD	F	11-20	0,5 l/ha	1'an											x			Da						
							13-20	0,75 l/ha		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Da Gg		-	-	-	-	-	1
							11-20																Da Gg						

Herbicides (3/3) - Début tallage au gonflement de la gaine (BBCH21-45) (màj : 17-01-2025)

| Nom commercial | Composition | Mode d'action | Code | N° autorisation | Formulation | Mode de pénétration | Stade d'application BBCH | Dose maximum autorisée | Nombre d'applications maximum (et intervalle) | DAR (jours) | Culture(s) | | | | | | | | | | | | | | | | Cible(s) | | | Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive | | | | | | | | | | | | | | | |

Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)														Cible(s)		Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
											Orge		Froment		Triticale		Epeautre		Seigle		Avoine		Graminées annuelles	Dicotylées		le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
											Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps		Annuelles	Vivaces	50%	75%	90%	50%	75%	90%
BARCLAY HURLER 200	200 g/l fluroxypyr	4	11	9829P/B	EC	F	21-32	0,9 l/ha***	1/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Da	Dv	-	6	6	-	1	1
BATTLE	500 g/l flufénacet	15	12	10886P/B	SC	R	21-32	0,5 l/ha	1	-	x		x		x			x					Ga			-	-	10	-	-	10
BEFLEX	500 g/l béflubutamide	12	13	10124P/B	SC	R/F	21-30	0,4 l/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Da		30	30	20	10	30	20	10
BIATHLON (DLU : 30-06-2025)	***71,4 % tritosulfuron***	***2***	***14***	***9779P/B***	***WG***	***F***	***21-39***	***0,07 kg/ha***	***1***	***-***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***Da***		***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
BIATHLON DUO (DLU : 30-06-2025)	***5,4 % florasulame 71,4 % tritosulfuron***	***2 2***	***15***	***10263P/B***	***WG***	***F***	***21-32 21-39***	***0,04 kg/ha 0,07 kg/ha***	***/culture***	***-***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***Da***	***Gg***	***Dv***	***-***	***6***	***6***	***-***	***1***	***1***
BOFIX¶¶	200 g/l MCPA 40 g/l fluroxypyr 20 g/l clopyralide	4 4 4	16	8173P/B ; 1244P/P	M E	F	29-31	3,5 l/ha 3 l/ha	1/an	-		x		x									Da	Dv Da	Dv	-	-	10	-	-	10
BOUDHA	25 %metsulfuron-méthyle 25 %tribénuron-méthyle	2 2	17	10390P/B	WG	F	20-29 30-39	0,01kg/ha° 0,02 kg/ha°°	1/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Da		-	-	6	-	-	1
BROADWAY°	6,8 %cloquintocet-méxyl 6,8 %pyroxsulam 2,3 %florasulame	pp 2 2	22	10689P/B	WG	F	21-31	0,22 kg/ha**	1/culture	-			x						x					Da		6	6	6	2	2	1
CAMEO	50 %tribénuron-méthyle	2	18	9583P/B	SG	F	21-39	0,045 kg/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Da	Dv	6	6	6	2	2	1
CAPRI°	7,5 % cloquintocet-méxyl 7,5 % pyroxsulam	pp 2	19	9764P/B	WG	F	21-31	0,09kg/ha** 0,25 kg/ha**	1/culture	-			x		x		x		x				Jv Jv Pa Vc			-	6	6	-	1	1
CAPRI DUO°	7,08 %cloquintocet-méxyl 7,08 %pyroxsulame 1,42 %florasulame	pp 2 2	20	9900P/B	WG	F	21-31	0,265 kg/ha** 0,210 kg/ha** 0,140 kg/ha	1/culture	-			x		x		x		x				Jv Jv Pa Vc		Da	6	6	6	1	1	1
CAPRI FORTE	37,5 g/kg florasulam 52,1g/kg halauxifène-méthyl 187,5 g/kg pyroxsulam 266 g/kg cloquintocet-acide (Phytoprotecteur)	2 4 2 pp	21	2880P/B	WG	-	21-32	0,1kg/ha	1/culture	-			x		x		x		x				Vc Vc Pa Jv		Da	-	20	-	-	20
CAPRI TWIN°	6,8 %cloquintocet-méxyl 6,8 %pyroxsulam 2,3 %florasulame	pp 2 2	22	9765P/B	WG	F	21-31	0,22 kg/ha	1/culture	-			x		x		x		x				Jv Jv Pa Vc		Da	6	6	6	2	2	1
CEVINO 500 SC	500 g/l flufénacet	15	12	31446P/B	SC	R	21-25	0,35 l/ha	1/culture	-	x												Ga			10	6	6	10	5	1
CHEKKER°	12,5 %amidosulfuron 12,5 %iodosulfuron-méthyle-Na 12,5 %méfenpyr-diéthyle	2 2 pp	23	9366P/B	WG	F	21-31	0,2 kg/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Da	Dv		6	6	6	1	1	1
CHLOORTOLURON 500 SC¶¶	500 g/l chlorotoluron	5	74	7980P/B	SC	R	25-29	3 l/ha*	1/an	-	x	x	x	x	x	x							Ga	Da		6	6	6	2	2	1

Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration[a]	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)																Cible(s)			Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive									
											Orge		Froment		Triticale		Epeautre		Seigle		Avoine		Graminées annuelles		Dicotylées			le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage						
											Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps			Annuelles	Vivaces		50%	75%	90%		50%	75%	90%					
		5	74	1312P/P	SC	R	25-29	3 l/ha*	1/an	-	x		x		x		x x							Ga	Da		10	6	6		10	5	1					
CHLORTOLURON 500 SC¶¶ (DLU : 30-04-2025)	500 g/l chlorotoluron																																					
CIRRAN	360 g/l 2,4-D 315 g/l MCPA	4 4	24	6490P/B	SL	F	29-32	1,5 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Da	Dv		6	6	6		5	2	1				
CIRRAN EXTRA	345 g/l 2,4-D 345 g/l MCPA	4 4	25	8503P/B	SL	F	29-32	1,5 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Da	Dv		6	6	6		5	2	1				
CLAP¶¶	300 g/l clopyralide	4	26	10842P/B	SL	F	29-31	0,3 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Co	Ch		-	6	6		-	1	1				
CLEAVE	100 g/l fluroxypyr 2,5 g/l florasulame	4 2	61	10341P/B	SE	F	21-31	0,5 l/ha*** 1l/ha***	1/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Mc Mo Da Gg			6	6	6		1	1	1				
CLIOPHAR 100¶¶	100 g/l clopyralide	4	50	10040P/B	SL	F	29-31	0,9 l/ha	1/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Co	Ch		6	6	6		1	1	1				
CLOPYFLEX 300¶¶	300 g/l clopyralide	4	26	29338P/P	SL	F	29-31	0,3 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Co	Ch		-	6	6		-	1	1				
CLOPYRELCO 100 SL¶¶	100 g/l clopyralide	4	50	13321P/P	SL	F	29-31	0,9 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Co	Ch		6	6	6		1	1	1				
CLYDE COMBI	100 g/l fluroxypyr 1g/l florasulame	4 2	45	11102P/B	SE	F	21-31	1,2 l/ha***	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Da Gg			6	6	6		5	2	1				
CONNEX	68,2 % thifensulfuron-méthyle 6,8 % metsulfuron-méthyle	2 2	27	9814P/B	WG	F	21-39	0,06 kg/ha	1	-	x	x	x	x	x	x			x		x	x			Da			6	6	6		1	1	1				
CORIDA	75 % tribénuron-méthyle	2	77	10849P/B	WG	F	31-39	0,025 kg/ha	1	-	x	x	x	x									Ga	Da	Da			6	-	10		-	-	10				
DALTRICE	6 g/kg iodosulfuron-méthyl-sodium 30 g/kg mésosulfuron-méthyl 90 g/kg méfenpyr-diéthyl	2 2 pp	83	32844P/B	WG	F	21-32	0,5 kg/ha*** 0,4 kg/ha*** 0,3 kg/ha	1/culture	-	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x			Ga Da Ga	Da Da		-	6	-		-	-	1				
DAMEX FORTE SUPER	345 g/l 2,4-D 345 g/l MCPA	4 4	25	10322P/B	SL	F	29-32	1,5 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Da	Dv		6	6	6		5	2	1				
DARBY	500 g/l 2,4-D	4	80	11198P/B	SL	F	29-32	1,6 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Da	Dv		6	6	6		1	1	1				
DEFT	20 % metsulfuron-méthyle	2	1	9552P/B	WG	F	20-29 30-39	0,025 kg/ha 0,03 kg/ha	1/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Da	Dv		-	-	6		-	-	1				
DIFLANIL 500 SC	500 g/l diflufénican	12	28	9408P/B	SC	R/F	21-29 26-29	0,375 l/ha 0,125 l/ha	1/an	-	x	x	x	x	x	x									Da			10	6	6		10	5	1				
DIFLUSTAR 500	500 g/l diflufénican	12	28	30594P/P	SC	R/F	21-29 26-29	0,375 l/ha 0,125 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Da			6	6	6		2	2	1				
DUPLOSAN	600 g/l mécoprop-P	4	29	10803P/B	SL	F	21-31	1,5 l/ha	1	-	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x			Da			-	-	6		-	-	1				
DUPLOSAN KV-P	600 g/l mécoprop-P	4	29	7615P/B	SL	F	21-31	2,4 l/ha	1	-	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x			Da	Dv		6	6	6		1	1	1				
DUPLOSAN SUPER	310 g/l dichlorprop-P 160 g/l MCPA 130 g/l mécoprop-P	4 4 4	30	7618P/B	SL	F	29-31	2,5 l/ha	1	-	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x			Da	Dv		6	6	6		5	2	1				
FINY	20 % metsulfuron-méthyle	2	1	9482P/B	SG	F	21-39	0,03 kg/ha**	1	-	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x			Da	Dv		-	-	6		-	-	1				
FLAME DUO	104 g/kg florasulam 250 g/kg tribenuron-méthyle	2	32	10956P/B	SG	F	23-39	0,06 kg/ha	1	-	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x			Da			-	-	6		-	-	1				

Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration*	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)														Cible(s)			Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive									
											Orge		Froment		Triticale		Epeautre		Seigle		Avoine						le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
											Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Graminées annuelles	Annuelles	Dicotylées	Vivaces	50%	75%	90%	50%	75%	90%
FORASULAM 50 SC	50 g/l florasulame	2	62	28884P/P	SC	F	21-32	0,05 l/ha***	1/culture	-													Gg	Da Mo	Mc		-	-	10	-	-	10
								0,1 l/ha***																								
								0,05 l/ha***							x	x									Da		-	-	10	-	-	10
								0,1 l/ha***															Gg								
FLORELCO	50 g/l florasulame	2	62	12105P/P	SC	F	14-20	0,05 l/ha***	1/culture	-	x	x					x	x			x	x		Da Mc Mo			6	1	1	6	1	1
								0,1 l/ha***					x	x					x	x				Da Mc								
																								Gg								
FLORELCORN BOOST	100 g/l fluroxypyr 1 g/l florasulame	4 2	45	12143P/P	SE	F	21-31	12 l/ha***	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Da Gg			-	-	1	6	6	1
FLUPICOS 340 SC	240 g/l florasulame 100 g/l picolinafen	15 12	60	11408P/P	SC	R/F	10-29	1 l/ha	1	-	x		x										Ga	Da		10	6	5	10	5	1
FLUROSTAR 100	100 g/l fluroxypyr	4	33	9506P/B	EC	F	21-32	1 l/ha***	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Da	Dv		6	1	1	6	1	1
FLUROSTAR PRIMO	180 g/l fluroxypyr	4	33	10904P/B	SE	F	21-31	0,5 l/ha***	1/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mc Mo			6	1	1	6	1	1
								1 l/ha***					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da								
							21-39																	Gg								
FOX 480 SC	480 g/l bifénox	14	34	10861P/B	SC	F	21-29	1,5 l/ha	1	-	x		x		x		x							Da			6	5	2	6	2	1
FOXTROT°	69 g/l fenoxaprop-P-éthyle 34,5 g/l cloquintocet-méxyl	1 pp	35	9705P/B	EW	F	13-20	1 l/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x					Ga			6	1	1	6	1	1
FRAGMA	50 g/l florasulame	2	62	10349P/B	SC	F	21-32	0,05 l/ha***	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Da Mc Mo			-	-	10	-	-	10
								0,1 l/ha***															Da Mc Gg								
																							Gg	Gg							
FRIMAX°	280 g/l fluroxypyr 12,5 g/l halauxifène-méthyle 12 g/l cloquintocet-méxyle	4 4 pp	59	10595P/B	EC	F	21-32	0,5 l/ha	1/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Da	Dv		-	6	1	6	2	1
							31-45																	Gg								
							33-45	0,375 l/ha																Gg								
							21-30	0,25 l/ha																Da	Dv							
GALGONE 100 EC	100 g/l fluroxypyr	4	33	10444P/B	EC	F	21-32	1 l/ha***	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Da	Dv		6	1	1	6	1	1
GALISTOP	200 g/l fluroxypyr	4	11	9830P/B	EC	F	21-32	0,9 l/ha***	1/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Da	Dv		-	6	1	6	1	1
GIDDO	400 g/l flufénacet 100 g/l diflufénican	15 12	47	10806P/B	SC	R/F	20-29	0,6 l/ha	1/culture	-	x		x				x						Ga	Da		6	5	2	6	2	1
GLOBUS	50 g/l florasulame	2	62	10997P/B	SC	F	21-32	0,05 l/ha***	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Da Mc Mo			-	-	6	-	-	1
								0,1 l/ha***															Gg								
GORDIUM STAR	15 % métenpyr-diéthyle 3,3 % iodosulfuron-méthyle-Na 2,5 % thiencarbazone-méthyle	pp 2 2	37	11043P/B	WG	R/F	21-31	0,3 kg/ha**	1/culture	-			x	x	x	x							Fa	Da Gg		6	-	-	6	-	1
								0,2 kg/ha**	1/culture				x		x								Jv	Mo							

Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration*	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)												Cible(s)		Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
											Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine		Graminées annuelles	Dicotylées		le long des cours et plans d'eau		le long des fossés de bord de route, de drainage		
											Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps		Annuelles	Vivaces	50%	75%	90%	75%	90%
GOUPIL	500 g/l ibéfludurtamide	12	13	1070P/B	SC	R/F	21-30	0,4 l/ha	1	-	x		x		x		x							Da		30	20	10	20	10
GRAMIX SUPER	310 g/l dichlorprop-P 160 g/l MCPA 130 g/l mécoprop-P	4 4 4	30	9535P/B	SL	F	29-31	2,5 l/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x						Da	Dv	6	6	6	2	1
GRATIL	75 % amidosulfuron	2	38	8316P/B	WG	F	21-39	0,04 kg/ha	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x						Cr Gg		6	6	6	1	1
HARMONY M	40 g/kg metsulfuron-méthyle 400 g/kg thifensulfuron-méthyle	2	39	9510P/B	SG	F	21-39	0,1kg/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x						Da		6	6	6	1	1
HATCHET XTRA	200 g/l fluroxypyr	4	11	9966P/B	EC	F	21-32	0,9 l/ha***	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x						Da	Dv	6	6	6	1	1
HUSSAR ULTRA	300 g/l mésosulfuron-méthyle-Na 100 g/l iodosulfuron-méthyle-Na	pp 2	41	9576P/B	OD	F	21-31	0,1 l/ha	1culture	-		x		x		x							Da		-	6	-	1	1
INCELO**	47 g/kg mésosulfuron-méthyl 122,5 g/kg méfenpyr-diéthyl 15,8 g/kg thiencarbazone-méthyl	2 pp 2	42	1221P/B	WG	F	21-32	0,2 kg/ha 0,33 kg/ha	1	-													Pa Jv Vc Fa Vc Fa Vc		6	6	6	2	1
INTER DIFLUFENICAN 500 SC	500 g/l diflufénican	12	28	24950P/P	SC	R/F	21-29 26-29	0,375 l/ha 0,125 l/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x						Da		10	6	10	5	1
ISOMEXX	20 % metsulfuron-méthyle	2	43	9481P/B	WG	F	20-29 30-39	0,025 kg/ha** 0,03 kg/ha**	1/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x						Da		6	6	6	2	1
ISOMEXX WG	20 % metsulfuron-méthyle	2	43	31150P/B	WG	F	30-39 21-29	0,03 kg/ha** 0,025 kg/ha**	1/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x						Da	Dv	6	6	6	2	1
KALENKOA	120 g/l diflufénican 27 g/l méfenpyr-diéthyle 9 g/l mésosulfuron-méthyle 7,5 g/l iodosulfuron-méthyle-Na	12 pp 2 2	44	10247P/B	OD	R/F	21-29	1l/ha	1/an	-			x				x							Da		-	10	6	10	5
KART	100 g/l fluroxypyr 1g/l florasulame	4 2	45	9463P/B	SE	F	21-31	1,2 l/ha***	1'culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Da Gg		-	6	-	1	1
KINVARA	233 g/l MCPA 28 g/l clopyralid 50 g/l fluroxypyr	4 4 4	46	30980P/B	ME	-	24-39	3 l/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Da	Dv	-	10	-	10	
LENTIPUR 500 SC¶¶	500 g/l chloroturon	5	74	8875P/B	SC	R	25-29	3 l/ha*	1/an	-	x		x		x		x							Da		10	6	10	5	1
LIBERATOR	400 g/l flufénacet 100 g/l diflufénican	15 12	47	9681P/B	SC	R/F	20-29	0,6 l/ha	1'culture	-	x		x		x								Ga Vc		Ga	Da	6	5	2	1
MALIBU	300 g/l pendiméthaline 60 g/l flufénacet	3 15	48	9316P/B	EC	R	21-39	2 l/ha 3 l/ha	1/an	-	x	x												Da		Jv 10	Da 6	6	5	2	1
MANHATTAN	69,5 g/kg halauxifène-méthyl 250 g/kg pyroxsulam 354 g/kg clopyralide-acide (Phytoprotecteur)	4 2 pp	49	28074P/B	WG	-	10-20	0,075 kg/ha	1'culture	-			x		x		x						Vc Pa Jv		Da	-	10	-	10	
MANHATTAN FORTE	37,5 g/kg florasulam 52,1g/kg halauxifène-méthyl 187,5 g/kg pyroxsulam 266 g/kg clopyralide-acide (Phytoprotecteur)	2 4 2 pp	21	30264P/B	WG	-	12-20	0,1kg/ha	1'culture	-			x		x		x						Vc Pa Jv		Da	-	20	-	20	
MATRIGON¶¶	100 g/l clopyralide	4	50	8200P/B	SL	F	29-31	0,9 l/ha	1'culture	-														Co	Ch	6	6	6	1	1

Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration*	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)												Cible(s)		Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
											Orge		Froment		Triticale		Epeautre		Seigle		Avoine		Graminées annuelles	Dicotylées Annuelles	Dicotylées Vivaces	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
											Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps				50%	75%	90%	50%	75%	90%
MATTERA°	6,25 g/l halauxifène-méthyle 6 g/l cloquinto cet-méxyl 5 g/l florasulame	4 pp 2	84	10657P/B	OD	F	21-29	0,75 l/ha	1/an	50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Da Gg	Da Gg Da Gg Gg Da	Dv	-	-	6	-	-	1
							21-32	1l/ha			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
							33-45	0,5 l/ha			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
							21-30														x	x								
MAXADEN°	12,5 g/l cloquintocet-méxyl 50 g/l pinoxaden	pp 1	9	12015P/P	EC	F	21-31	0,9 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Vc Fa Jv			6	6	6	1	1	1
								1,2 l/ha			x	x	x		x	x	x	x	x	x			Vc							
MCPA 750	750 g/l MCPA	4	81	1399P/P	SL	F	29-32	1,3-2 l/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Da	Da	Dv	6	6	6	5	2	1
MESIOFIS PRO	30 g/l méfenpyr-diéthyle 10 g/l mésosulfuron-méthyle 2 g/l iodosulfuron-méthyle-Na	pp 2 2	68	12115P/P	OD	F	21-31	0,9 l/ha**	1/culture	-		x		x		x		x		x	Vc Jv	Da	Da	Dv	6	6	6	1	1	1
								1,5 l/ha**													Vc Pa Jv									
MESIOFIS PRO (DLU : 30-06-2026)	***30 g/l méfenpyr-diéthyle 10 g/l mésosulfuron-méthyle 2 g/l iodosulfuron-méthyle-Na***	***pp 2 2***	***68***	***1307P/P***	***OD***	***F***	***21-31***	***0,9 l/ha****	***1/culture***	***-***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***Da***	***Da***	***Dv***	***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
								0,9 l/ha*															***V c J v***								
								1,5 l/ha*															***V c P a J v***								
MESIOFIS SUPER WG	6 g/kg iodosulfuron-méthyl-sodium 30 g/kg mésosulfuron-méthyl 90 g/kg méfenpyr-diéthyl	2 2 pp	83	33104P/P	WG	F	21-32	0,5 kg/ha***	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ga	Da	Dv	-	-	6	-	-	1
								0,4 kg/ha***																						
								0,3 kg/ha															Ga								
METRO SG	20 % metsulfuron-méthyle	2	1	10143P/B	SG	F	21-39	0,03 kg/ha**	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da	Dv	6	6	6	5	2	1
METSULFURON 20%WG	20 % metsulfuron-méthyle	2	1	13315P/P	WG	F	20-29	0,025 kg/ha	1/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da	Dv	6	-	-	-	-	1
							30-39	0,03 kg/ha			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
MINSTREL	200 g/l fluroxypyr	4	11	10746P/B	EC	F	21-32	0,9 l/ha***	1/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da	Dv	6	6	6	-	1	1
MONITOR	80 % sulfosulfuron	2	52	9158P/B	WG	R/F	21-31	0,025 kg/ha**	1	-														Ga Da							
							21	0,025 kg/ha**	1																						
							31-32	0,025 kg/ha**	2																						
							31-32	0,025 kg/ha**	1																						
MOST MICRO	365 g/l pendiméthaline	3	53	10330P/B	CS	R	21-25	2,2 l/ha	1/culture	-													Cd	Da		10	6	10	5	6	1
OBELISK	6 g/kg iodosulfuron-méthyl-sodium 30 g/kg mésosulfuron-méthyl 90 g/kg méfenpyr-diéthyl	2 2 pp	83	38175P/B	WG	F	21-32	0,3 kg/ha	1	-			x	x									Ga	Da		-	-	6	-	-	1
								0,4 kg/ha***																						
								0,5 kg/ha***															Ga								
OMNERA LQM	135 g/l fluroxypyr 30 g/l thifensulfuron-méthyle 5 g/l metsulfuron-méthyle	4 2 2	54	10645P/B	OD	F	21-39	1l/ha	1/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da		10	-	-	10	-	-

Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration[a]	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)														Cible(s)			Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive			
											Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine		Graminées annuelles	Dicotylées Annuelles	Dicotylées Vivaces	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
											Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps				50%	75%	90%	50%	75%	90%
OSSETIA	50 % diflufénican	12	55	10622P/B	WG	R/F	21-29	0,24 kg/ha 0,125 kg/ha	1	-			x	x										Da Da		10 10	6 6	1 1	10 10	5 5	1 1
OTHELLO°	50 g/l diflufénican 22,5 g/l méfenpyr-diéthyle 7,5 g/l mésosulfuron-méthyle 2,5 g/l iodosulfuron-méthyle-Na	12 pp 2 2	56	9873P/B	OD	R/F	21-29	2 l/ha 12 l/ha	1/culture	-			x		x			x	x				Vc Pa Jv Vc Jv	Da Da		- 10 6	- 10 6	- 5 1	- 10 2	- 5 2	- 5 1
PHYBELCOZAN	310 g/l dichlorprop-P 160 g/l MCPA 130 g/l mécoprop-P	4 4 4	30	32793P/P	SL	F	29-31	2-2,5 l/ha	1/an	-			x	x	x	x	x	x			x	x		Da	Dv	6	6	1	6	2	1
PICO SOLO	750 g/l picolinafène	12	57	11252P/B	WG	F	21-29	0,133 kg/ha	1	-			x		x		x		x					Da		6	6	1	10	-	10
PILOTI	60 % diflufénican 6 % metsulfuron-méthyle	12 2	58	10180P/B	WG	R/F	21-29	0,07 kg/ha	1/culture	-			x	x	x	x	x	x	x							10	6	1	10	5	1
PIXXARO EC°	280 g/l fluroxypyr 12,5 g/l halauxifène-méthyle 12 g/l cloquintocet-méxyle	4 4 pp	59	10575P/B	EC	F	21-30 21-32 33-45 33-45	0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,375 l/ha	1/an	-														Da Gg Gg	Dv Da Dv	-	6	2	-	2	1
PONTOS	240 g/l flufénacet 100 g/l picolinafen	15 12	60	10604P/B	SC	R/F	21-29	0,5 l/ha 1l/ha	1/culture	-			x	x	x	x	x	x	x				Ga Ga Vc Jv	Da Da		10	6	1	10	5	1
PRIMSTAR	100 g/l fluroxypyr 2,5 g/l florasulame	4 2	61	9327P/B	SE	F	21-31 32-39	1l/ha*** 0,5 l/ha*** 1l/ha***	1/culture	-			x	x	x	x	x	x	x					Da Gg Mc Mo Gg		-	6	1	-	1	1
PRIMUS	50 g/l florasulame	2	62	9074P/B	SC	F	21-32	0,05 l/ha*** 0,1l/ha*** 0,05 l/ha***	1	-			x	x	x	x	x	x	x					Da Mc Mo Gg Da Mc		6	6	1	1	1	1
PRIMUS PERFECT™	300 g/l clopyralide 25 g/l florasulame	4 2	63	10317P/B	SC	F	21-31	0,15 l/ha	1/an	-			x	x	x	x	x	x	x					Da		-	6	1	-	-	1
PROWL AQUA	455 g/l pendiméthaline	3	73	28223P/P	CS	R	21-25	2 l/ha	1	-			x	x	x	x	x	x	x					Da		10	6	1	10	5	1
PYROXSTAR° (DLU : 30-06-2026)	***7,5 % cloquintocet-méxyl 7,5 % pyroxsulam***	***pp 2***	***19***	***24765P/P***	***WG***	***F***	***21-31***	***0,09kg/ha** 0,25 kg/ha****	***1/culture***	-			***x***		***x***	***x***	***x***	***x***	***x***				***Jv J v P a V c Da***		-	***6***	***6***	-	***1***	***1***

Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration*	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)												Cible(s)			Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive									
											Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine			Graminées annuelles	Dicotylées		le long des cours et plans d'eau				le long des fossés de bord de route, de drainage			
											Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps			Annuelles	Vivaces	50%	75%	90%		50%	75%	90%	
PYROXSTAR DUO	7,08 % cloquintocet-méxyl 7,08 % pyroxsulame 142 % florasulame	pp 2 2	20	2861000P/P	WG	R/F	21-31	0,265 kg/ha**** 0,21 kg/ha**** 0,14 kg/ha****	1	-			x				x						Jv Pa Vc	Da		6	6	6	1	1	1	1
QUIRINUS	240 g/l flufénacet 50 g/l picolinafen	15 12	64	2060005P/B	SC	R/F	21-29	1 l/ha	1 culture	-	x		x		x		x						Ga Vc Jv	Da		6	6	6	2	5	2	1
QUOTIENT	500 g/l diflufénican	12	28	3553000P/B	SC	R/F	09-20	0,375 l/ha	1 culture	-	x		x		x	x	x	x								10	6	6	5	10	5	1
RACING EXTRA	68,2 % thifensulfuron-méthyle 6,8 % metsulfuron-méthyle	2 2	27	1002000P/B	WG	F	21-39	0,06 kg/ha	1	-	x		x		x	x	x	x								6	6	6	2	10	2	1
RAMPAR	365 g/l pendiméthaline	3	53	2060590P/B	CS	R	21-25	2,2 l/ha	1 culture	-	x															10	6	6	5	10	5	1
RENITAR°	6,25 g/l halauxifène-méthyle 6 g/l cloquintocet-méthyle 5 g/l florasulame	4 pp 2	84	2060656P/B	OD	F	21-29 21-32 21-30 33-45	0,75 l/ha 0,5 l/ha 1 l/ha	1/an	50	x		x		x	x	x	x						Da Gg	Da Gg		-	-	6	-	-	1
REXADE TRIO°	24 % pyroxsulame 21,25 % cloquintocet-acide 10,42 % halauxifène-méthyle 10 % florasulame	2 pp 4 2	65	2070979P/B	WG	F	21-32	0,05 kg/ha** 0,04 kg/ha**	1/an	60				x									Fa Jv Fa	Da Da		-	-	6	-	-	1
SARACEN DELTA	500 g/l diflufénican 50 g/l florasulame	12 2	66	2060386P/B	SC	R/F	21-32 21-22	0,1 l/ha 0,075 l/ha	1 culture	-	x		x		x	x	x	x			x			Da Da	Da Da		-	-	10	-	-	10
SATURNE 500 SC	500 g/l diflufénican	12	28	2060196P/P	SC	R/F	21-29 26-29	0,375 l/ha 0,125 l/ha	1/an	-	x		x		x	x	x	x		x				Da Da	Da Da		10 6	6 6	6 6	10 2	5 2	1 1
SAVVY	20 % metsulfuron-méthyle	2	1	2059980P/B	WG	F	20-29 30-39	0,025 kg/ha° 0,03 kg/ha°	1/an	-	x		x		x	x	x	x						Da Da	Dv Dv		-	-	6	-	-	1
SEMPRA	500 g/l diflufénican	12	28	2060088P/B	SC	R/F	21-29 26-29	0,375 l/ha 0,125 l/ha	1	-	x		x		x	x	x	x						Da	Da		6	6	6	2	2	1
SIGMA FLEX°	9 % méfenpyr-diéthyle 6,75 % propoxycarbazone-Na 4,5 % mésosulfuron-méthyle	pp 2 2	67	2060623P/B	WG	R/F	21-31 21-31	0,2 kg/ha** 0,33 kg/ha**	1 culture	-			x		x	x	x	x					Jv Pa Vc Fa	Da		10	6	6	10	5	1
SIGMA MAXX	30 g/l méfenpyr-diéthyle 10 g/l mésosulfuron-méthyle 2 g/l iodosulfuron-méthyle-Na	pp 2 2	68	2060409P/B	OD	F	21-31	0,9 l/ha** 1,5 l/ha** 0,9 l/ha**	1 culture	-			x		x	x	x	x					Vc Pa Jv Vc Jv	Da		6 - 6	6 6 6	6 6 6	1 - 1	1 2 1	1 1 1

Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration[1]	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)														Cible(s)		Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
											Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine		Graminées annuelles	Dicotylées		le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
											Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps		Annuelles	Vivaces	50%	75%	90%	50%	75%	90%
SIGMA PLUS®	9 % méfenpyr-diéthyle 5 % amidosulfuron 3 % mésosulfuron-méthyle 1% iodosulfuron-méthyle-Na	pp 2 2 2	69	1041 0P/B	WG	F	21-31	0,3 kg/ha** 0,5 kg/ha** 0,3 kg/ha**	1/culture	-			x		x	x							Jv Vc Vc Pa Jv	Da	-	-	10	-	-	10
SIGMA STAR	13,5 % méfenpyr-diéthyle 4,5 % mésosulfuron-méthyle 2,25 % thiencarbazone-méthyle 0,9 % iodosulfuron-méthyle-Na	pp 2 2 2	70	1063 6P/B	WG	R/F	21-32	0,2 kg/ha** 0,33 kg/ha**	1/culture	-			x		x	x							Jv Vc Jv Pa Vc	Da	6 -	6 6	6 6	1 -	1 1	1 1
SIGMA SUPRA®	9 % méfenpyr-diéthyle 5 % amidosulfuron 3 % mésosulfuron-méthyle 1% iodosulfuron-méthyle-Na	pp 2 2 2	69	1069 3P/B	WG	F	21-31	0,3 kg/ha** 0,5 kg/ha** 0,3 kg/ha**	1/culture	-			x		x	x							Jv Vc Vc Pa Jv	Da	- -	- -	6 10	- -	- -	1 10
SIRIONOVA	500 g/l flufénacet	15	12	1221 3P/B	SC	R	21-23	0,48 l/ha	1	-	x												Ga	Da	-	-	10	-	-	10
SPITFIRE	100 g/l fluroxypyr 5 g/l florasulame	4 2	71	1018 7P/B	SE	F	21-31	0,25 l/ha*** 0,75 l/ha***	1/culture	-	x		x		x	x							Ga	Mc Mo Da Gq	20 6	10 6	10 6	5 1	10 1	10 1
STAPLER	500 g/l 2,4-D	4	80	1199 9P/B	SL	F	29-32	1,6 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da	6	6	6	1	1	1
STARANE FORTE	333 g/l fluroxypyr	4	72	1026 0P/B	EC	F	21-32	0,54 l/ha***	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da	6	6	6	1	1	1
STOMP AQUA	455 g/l pendiméthaline	3	73	9839P/B ; 24949P/P ; 25298P/P	CS	R	21-25	2 l/ha	1/culture	-	x		x		x	x								Da	10 6	10 6	10 6	10 5	10 5	10 5
SUNFIRE	500 g/l flufénacet	15	12	1093 8P/B	SC	R	21-23	0,36 l/ha 0,48 l/ha	1/culture	-	x		x		x	x		x		x			Jv Vc Vc		10 6	10 6	10 6	10 5	10 5	10 5
TANDUS	200 g/l fluroxypyr	4	11	1119 3P/B	EC	F	21-32	0,9 l/ha***	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da	Dv	6	6	6	1	1	1
TERCERO DUO	104 g/kg florasulam 250 g/kg tribenuron-méthyle	2 2	32	35992P/P	SG	F	23-39	0,06 kg/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da		-	-	6	-	-	1
THEIA	50 % difluénican	12	55	1083 9P/B	WG	R/F	21-29	0,125 kg/ha 0,24 kg/ha	1	-		x		x		x		x		x				Da		10 6	10 6	10 6	5 1	10 6	10 1
TOLUREX SC¶¶	500 g/l chlorotoluron	5	74	7733P/B	SC	R	25-29	3 l/ha* 3 l/ha	1/an	-	x		x		x		x						Ga Vc Ga Vc	Da	6	6	6	2	2	1
TOMAHAWK 200 EC	200 g/l fluroxypyr	4	11	1045 5P/B	EC	F	21-32	0,9 l/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da	Dv	6	6	6	1	1	1
TOUCAN	500 g/l difluénican	12	28	9653P/B	SC	R/F	21-29 26-29	0,375 l/ha 0,125 l/ha	1/an	-	x		x		x	x		x						Da		10 6	10 6	6 6	5 2	5 2	1 1
TREVISTAR¶¶	144,1 g/l fluroxypyr 80 g/l clopyralide 2,5 g/l florasulame	4 4 2	75	9799P/B	EC	F	21-39	1 l/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da	Dv	-	-	6	-	-	1

Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration[a]	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)												Cible(s)		Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
											Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine		Graminées annuelles	Dicotylées		le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
											Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps		Annuelles	Vivaces	50%	75%	90%	50%	75%	90%
TREZAC°	313 g/l halauxifène-méthyle 30 g/l cloquintocet-mexyl 25 g/l aminopyralide	4 pp 4	76	10793P/B	EC	F	21-32	0,2 l/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da		-	6	6	-	1	1
TRIBE	75 % tribénuron-méthyle	2	77	10843P/B	WG	F	20-39	0,02 kg/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da		6	6	6	1	1	1
TRIMONO	80 % sulfosulfuron	2	52	11172P/P	WG	R/F	31-32	0,0125 kg/ha**	2	-													Jv	Da		6	6	6	2	2	1
							21	0,025 kg/ha**	1														Cd	Da							
							21-31	0,0125 kg/ha**															Ga	Da							
TRINITY¶¶	300 g/l pendiméthaline 250 g/l chlorotoluron 40 g/l diflufénican	3 5 12	78	10572P/B	SC	R/F	21-29	2 l/ha	1/an	-		x		x									Ga Jv	Da		10	6	5	5	10	1
TUSK	50 % diflufénican	12	55	10992P/B	WG	R/F	21-29	0,125 kg/ha	1	-	x		x		x		x						Ga Jv	Da		20	10	20	20	10	5
								0,24 kg/ha																Da		10	6	10	10	6	1
U46 M	750 g/l MCPA	4	81	8439P/B	SL	F	29-32	2 l/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da	Dv	6	6	5	2	2	1
U46 M 750	750 g/l MCPA	4	81	9310P/B ; 13919P/P	SL	F	29-32	2 l/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da	Dv	6	6	5	2	2	1
U-46-D-500	500 g/l 2,4-D	4	80	7018P/B	SL	F	29-32	1,6 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Da	Dv	6	6	1	1	1	1
UP TON (DLU : 30-04-2025)	*50 g/l florasulame*	*2*	*62*	*11053P/B*	*SC*	*F*	*21-32*	*0,05 l/ha****	*/culture*	-	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*							*Gg*	*Da*	*Co*	*6*			-		*1*
URI	600 g/l 2,4-D	4	79	30852P/B	SC		21-32	1,25 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x	x	x								Da		30	20	20	10	10	10
VIVENDI 100 SL¶¶	100 g/l clopyralide	4	50	9356P/B	SL	F	29-31	0,9 l/ha	1/an	-	x	x	x	x	x	x								Co	Ch	6	6	1	1	1	1
VSM DIFLUFENICAN	500 g/l diflufénican	12	28	32586P/P	SC	R	21-29 26-29	0,375 l/ha 0,125 l/ha	1	-		x												Da		10 6	6 6	5 2	5 2	1 1	1 1
WOPRO SULFOSULFURON 80	80 % sulfosulfuron	2	52	11406P/P	WG	R/F	21	12,5 g/ha**	1	-													Ga	Da		6	6	2	2	1
							21-31	12,5 g/ha**	1	-													Ga	Da							
							31-32	25 g/ha**	1	-													Cd								
							12-32	12,5 g/ha**	2	-													Jv								
XERTON	417 g/l éthofumesate^	15	82	11229P/B	SC	-	21-23	0,6 l/ha	1	-													Pa Jv			6	6	1	1	1
ZEPPOS	6 g/kg iodosulfuron-méthyl-sodium 30 g/kg mésosulfuron-méthyl 90 g/kg métépyr-diéthyl	2 2	83	31633P/B	WG	F	21-32	0,3 kg/ha 0,4 kg/ha°° 0,5 kg/ha°°°	1	-													Ga	Da		-	6	-	-	1
ZYPAR°	6,25 g/l halauxifène-méthyle 6 g/l cloquintocet-mexyl 5 g/l florasulame	4 pp 2	84	10655P/B	OD	F	21-30	0,5 l/ha	1/an	50														Da		-	6	-	-	1
							21-32	0,75 l/ha																Da Gg						
							21-29																	Da Gg						
							33-45	1 l/ha																Gg						

Régulateurs de croissance

Régulateurs de croissance (màj : 17-01-2025)

1. Chlorméquat ; 2. Éthephon ; 3. Prohéxadione ; 4. Trinexapac-éthyle ; 5. Mélanges de plusieurs susbtances actives

*Éventuellement fractionnné en 2 applications à intervalle d'au moins 7 jours

**N'ayant pas reçu préalablement de chlorméquat

***Si en combinaison avec 240 g/ha d'éthéphon

°N'ayant pas reçu préalablement de chlorméquat. Dans les parcelles préalablement traitées au chlorméquat (froment d'hiver : stade BBCH 31) et dans lesquelles subsiste un risque de verse, un traitement antiverse complémentaire avec un produit à base d'éthéphon peut être envisagé; il sera appliqué à la dose de : 240-360 g. s.a./ha (BBCH 37-45) pour le froment d'hiver ; 240 g. s.a./ha (BBCH 39-45) pour l'épeautre d'hiver.

Nom commercial	Composition	Formulation	N° autorisation	Formulation	Culture(s)		Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applic. max. (et int.)	DAR (jours)	Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
											le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
											50%	75%	90%	50%	75%	90%
ARVEST	480 g/l éthephon	2	7064P/B	SL	Orge	H	37-39	1,25 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P		0,8 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	37-45	0,75 l/ha			6	6	6	1	1	1
								1,25 l/ha**			6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P					6	6	6	1	1	1
					Épeautre			0,75 l/ha**			6	6	6	1	1	1
							39-45	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Seigle			1,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Avoine		-	-	-		-	-	-	-	-	-
BELCOCEL 400	400 g/l chlorméquat-chlorure	1	31252P/B	SL	Froment	H	30-32	1,875 l/ha	2 (7 jours)	-	6	6	6	1	1	1
						P	21-30	1,875 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	30-32	1,875 l/ha	2 (7 jours)	-	6	6	6	1	1	1
					Épeautre	H/P	30-32	1,875 l/ha	2 (7 jours)	-	6	6	6	1	1	1
BELCOCEL 750	750 g/l chlorméquat	1	7384P/B	SL	Orge	H/P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Froment	H	30-32	1 l/ha	2	-	6	6	6	1	1	1
						P	21-30		1		6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	30-32		2		6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle		-	-	-		-	-	-	-	-	-
					Avoine		40 cm	1,9 l/ha	1		6	6	6	1	1	1
CCC 750	750 g/l chlorméquat	1	10675P/B	SL	Orge	H/P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Froment	H	30-32	1 l/ha	2	-	6	6	6	1	1	1
						P	21-30		1		6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	30-32		2		6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle		-	-	-		-	-	-	-	-	-
					Avoine		40 cm	1,9 l/ha	1		6	6	6	1	1	1
CYCOCEL 75	750 g/l chlorméquat	1	8679P/B	SL	Orge	H/P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Froment	H	30-32	1 l/ha	2	-	6	6	6	1	1	1
						P	21-30		1		6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	30-32		2		6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle		-	-	-		-	-	-	-	-	-
					Avoine		40 cm	1,9 l/ha	1		6	6	6	1	1	1
CYCOFIX 750	750 g/l chlorméquat	1	8800P/B	SL	Orge	H/P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Froment	H	30-32	1 l/ha	2	-	6	6	6	1	1	1
						P	21-30		1		6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	30-32		2		6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle		-	-	-		-	-	-	-	-	-
					Avoine		40 cm	1,9 l/ha	1		6	6	6	1	1	1
EPHON TOP	660 g/l éthephon	2	10941P/B	SL	Orge	H	37-39	0,91 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P		0,58 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H/P	37-45	0,55 l/ha			6	6	6	1	1	1
								0,91 l/ha**			6	6	6	1	1	1
					Triticale	H					6	6	6	1	1	1
					Épeautre	H/P		0,36 l/ha			6	6	6	1	1	1
								0,55 l/ha**			6	6	6	1	1	1
					Seigle	H	39-45	1,1 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Avoine		-	-	-		6	6	6	1	1	1
ETHEPHON CLASSIC	480 g/l éthephon	2	9202P/B	SL	Orge	H	37-39	1,25 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P		0,8 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	37-45	0,75 l/ha			6	6	6	1	1	1
								1,25 l/ha**			6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P					6	6	6	1	1	1
					Épeautre			0,75 l/ha**			6	6	6	1	1	1
							39-45	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Seigle			1,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Avoine		-	-	-		-	-	-	-	-	-

Nom commercial	Composition	Formulation	N° autorisation	Formulation	Culture(s)		Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applic. max. (et int.)	DAR (jours)	Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
											le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
											50%	75%	90%	50%	75%	90%
FABULIS OD	50 g/l prohéxadione	3	10902P/B	OD	Orge	H/P	29-39	1,5 l/ha	1*	-	6	6	6	1	1	1
					Froment						6	6	6	1	1	1
					Triticale		29-34				6	6	6	1	1	1
					Épeautre		29-39				6	6	6	1	1	1
					Seigle		31-34				6	6	6	1	1	1
					Avoine						6	6	6	1	1	1
FLORDIMEX 480 (DLU : 31-10-2025)	***480 g/l éthephon***	***2***	***8678P/B***	***SL***	***Orge***	***H***	***37-39***	***1,25 l/ha***	***1***	-	***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
						P		***0,8 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Froment	***H***		***0,75 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
								1,25 l/ha*			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Triticale	***H/P***	***37-45***				***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Épeautre			***0,75 l/ha****			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
							39-45	***0,5 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Seigle			***1,5 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Avoine		***-***	***-***	***-***		-	-	-	-	-	-
GRASSROOTER	480 g/l éthephon	2	10875P/B	SL	Orge	H	41-51	1 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P	41-49	0,75 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	41-51	1 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	-	-	-		-	-	-	-	-	-
					Épeautre											
					Seigle											
					Avoine											
JADEX O 720	720 g/l chlorméquat	1	9189P/B	SL	Orge	H/P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Froment	H	30-32	1 l/ha	2	-	6	6	6	1	1	1
						P	21-30		1		6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	30-32		2		6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle		-	-	-		-	-	-	-	-	-
					Avoine		40 cm	2 l/ha	1		6	6	6	1	1	1
K2	620 g/l chlorméquat	1	10433P/B	SL	Orge	H/P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Froment	H	30-32	1,2 l/ha	2	-	6	6	6	1	1	1
						P	21-30		1		6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	30-32		2		6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle		-	-	-		-	-	-	-	-	-
					Avoine		30-39	2,2 l/ha	1		6	6	6	1	1	1
KHEOPS	620 g/l chlorméquat	1	10434P/B	SL	Orge	H/P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Froment	H	30-32	1,2 l/ha	2	-	6	6	6	1	1	1
						P	21-30		1		6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	30-32		2		-	-	-	-	-	-
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle		-	-	-		-	-	-	-	-	-
					Avoine		30-39	2,2 l/ha	1		6	6	6	1	1	1
LIFE SCIENTIFIC TRINEXAPAC 250 (DLU : 31-01-2026)	***250 g/l trinexapac-éthyle***	***4***	***10235P/B***	***EC***	***Orge***	***H***	***31-32***	***0,6 l/ha***	***1***	-	***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
						P	***39-32***	***0,5 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Froment	***H/P***		***0,4 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Triticale						***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Épeautre						***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Seigle						***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Avoine		***30-31***				***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
LIMITAR	250 g/l trinexapac-éthyle	4	10296P/B	EC	Orge	H	31-32	0,6 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
					Froment			0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	-	-	-		-	-	-	-	-	-
					Épeautre											
					Seigle											
					Avoine											
MEDAX MAX	5 % prohéxadione 7,5 % trinexapac-éthyle	5	10667P/B	WG	Orge	H	29-39	1 kg/ha	2 (7 jours)	-	6	6	6	1	1	1
							41-49	0,75 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
						P	29-39	0,75 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
					Froment Triticale Épeautre	H	29-39	0,75 kg/ha	2 (7 jours)		6	6	6	1	1	1
							41-49	0,5 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
						P	29-39	0,5 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
					Seigle	H	29-39	1 kg/ha	2 (7 jours)		6	6	6	1	1	1
							41-49	0,75 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
					Avoine		29-39	0,75 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
						P		0,5 kg/ha			6	6	6	1	1	1

Nom commercial	Composition	Formulation	N° autorisation	Formulation	Culture(s)		Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applic. max. (et int.)	DAR (jours)	Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
											le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
											50%	75%	90%	50%	75%	90%
MEDAX TOP	300 g/l chlorure de mépiquat 50 g/l prohéxadione	5	9840P/B	SL	Orge	H	31-32	1,5 l/ha	1	56	6	6	6	1	1	1
						P		1 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H					6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P					6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle						6	6	6	1	1	1
					Avoine						6	6	6	1	1	1
MODDUS	250 g/l trinexapac-éthyle	4	9201P/B	EC	Orge	H	31-32	0,8 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
								0,5 l/ha***			6	6	6	1	1	1
						P		0,6 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
						P	30-31	0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	31-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle						6	6	6	1	1	1
					Avoine		30-31	0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
MODDUS EVO	250 g/l trinexapac-éthyle	4	10449P/B	DC	Orge	H	31-32	0,6 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P	29-32				6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,3 l/ha			6	6	6	1	1	1
						P	30-31				6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	31-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Épeautre			0,3 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Seigle			0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Avoine		30-31	0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
MOXA	250 g/l trinexapac-éthyle	4	10234P/B	EC	Orge	H	31-32	0,6 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P	29-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
						P	30-31				6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	31-32				6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle						6	6	6	1	1	1
					Avoine		30-31				6	6	6	1	1	1
MOXA EC (DLU : 31-01-2026)	***250 g/l trinexapac-éthyle***	***4***	***10430P/B***	***EC***	***Orge***	***H***	***31-32***	***0,6 l/ha***	***1***	-	***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
						P	***29-32***	***0,5 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Froment	***H***	***31-32***				***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
						P	***30-31***				***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Triticale	***H/P***	***31-32***	***0,4 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Épeautre						***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Seigle						***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Avoine		***30-31***				***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
NEXT	250 g/l trinexapac-éthyle	4	10784P/B	EC	Orge	H	31-32	0,8 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
								0,5 l/ha***			6	6	6	1	1	1
						P	29-32	0,6 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
						P	30-31	0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	31-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle						6	6	6	1	1	1
					Avoine		30-31	0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
OPTIMUS	175 g/l trinexapac-éthyle	4	10142P/B	EC	Orge	H	31-32	0,8 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P	29-32	0,6 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,5 l/ha	1		6	6	6	1	1	1
							31-39	0,25 l/ha	2 (7 jours)		6	6	6	1	1	1
						P	30-31	0,4 l/ha	1		6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	31-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle						6	6	6	1	1	1
					Avoine		30-31	0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
PERCIVAL	5 % prohéxadione 7,5 % trinexapac-éthyle	5	10674P/B	WG	Orge	H	29-39	1 kg/ha	2 (7 jours)	-	6	6	6	1	1	1
							41-49	0,75 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
						P	29-39	0,75 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
					Froment Triticale Épeautre	H	29-39	0,75 kg/ha	2 (7 jours)		6	6	6	1	1	1
							41-49	0,5 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
						P	29-39	0,5 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
					Seigle	H	29-39	1 kg/ha	2 (7 jours)		6	6	6	1	1	1
							41-49	0,75 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
					Avoine		29-39	0,75 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
						P		0,5 kg/ha			6	6	6	1	1	1

Nom commercial	Composition	Formulation	N° autorisation	Formulation	Culture(s)		Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applic. max. (et int.)	DAR (jours)	Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
											le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
											50%	75%	90%	50%	75%	90%
PRODAX	5 % prohéxadione 7,5 % trinexapac-éthyle	5	10630P/B	WG	Orge	H	29-39	1 kg/ha	2 (7 jours)	-	6	6	6	1	1	1
							41-49	0,75 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
						P	29-39	0,75 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
					Froment Triticale Épeautre	H	29-39	0,75 kg/ha	2 (7 jours)		6	6	6	1	1	1
							41-49	0,5 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
						P	29-39	0,5 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
					Seigle	H	29-39	1 kg/ha	2 (7 jours)		6	6	6	1	1	1
							41-49	0,75 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
					Avoine		29-39	0,75 kg/ha	1		6	6	6	1	1	1
						P		0,5 kg/ha			6	6	6	1	1	1
PRODIONIS 50 OD	50 g/l prohéxadione	3	24447P/P	OD	Orge	H/P	29-39	1,5 l/ha	1*	-	6	6	6	1	1	1
					Froment						6	6	6	1	1	1
					Triticale		29-34				6	6	6	1	1	1
					Épeautre		29-39				6	6	6	1	1	1
					Seigle		31-34				6	6	6	1	1	1
					Avoine						6	6	6	1	1	1
REGULAFON 480 (DLU : 30-06-2026)	***480 g/l éthephon***	***2***	***1384P/P***	***SL***	***Orge***	***H***	***37-39***	***1,25 l/ha***	***1***	-	***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
						P		***0,8 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Froment°	***H***	***37-45***	***1,25 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Triticale						***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Épeautre°	***H/P***		***0,75 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Seigle		***39-45***	***1,5 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Avoine		-	-	-		-	-	-	-	-	-
REGULAGOLD 480	480 g/l éthephon	2	32703P/P	SL	Orge	H	41-51	1 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P	41-49	0,75 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	41-51	1 l/ha			6	6	6	1	1	1
SCITEC	250 g/l trinexapac-éthyle	4	9768P/B	EC	Orge	H	31-32	0,8 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
								0,5 l/ha***								
						P	29-32	0,6 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
						P	30-31	0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	31-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle						6	6	6	1	1	1
					Avoine		30-31	0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
STABILAN 400	400 g/l chlorméquat-chlorure	1	31249P/B	SL	Orge Froment Triticale Épeautre Seigle Avoine	H/P	20-39	1,875 l/ha	2 (7 jours)	-	6	6	6	1	1	1
							20-39	3,75 l/ha	1		6	6	6	1	1	1
							20-29 30-39	1,75 l/ha 2 l/ha	2 (7 jours)		6	6	6	1	1	1
STABILAN 750	750 g/l chlorméquat	1	9138P/B	SL	Orge	H/P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Froment	H	30-32	1 l/ha	2		6	6	6	1	1	1
						P	21-30		1		6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	30-32		2		6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle		-	-	-		-	-	-	-	-	-
					Avoine		40 cm	1,9 l/ha	1		6	6	6	1	1	1
TERPAL	305 g/l chlorure de mépiquat 155 g/l éthephon	5	9286P/B	SL	Orge	H	37-49	3 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P		2 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H/P	32-39**	3 l/ha			6	6	6	1	1	1
							37-39	2 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	32-39**	3 l/ha			6	6	6	1	1	1
							37-39	2 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Épeautre	H/P	-	-	-		-	-	-	-	-	-
					Seigle		37-49	3,5 l/ha	1		6	6	6	1	1	1
					Avoine		-	-	-		-	-	-	-	-	-
TERPLEX (DLU : 31-01-2026)	***200 g/l trinexapac-éthyle***	***4***	***10643P/B***	***EC***	***Orge***	***H***	***31-32***	***0,75 l/ha***	***1***	-	***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
						P	***29-32***				***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Froment	***H***	***31-32***	***0,625 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
						P	***30-31***	***0,5 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Triticale	***H/P***					***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Épeautre						***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Seigle			***0,625 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Avoine	***H***					***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
						P		***0,6 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***

²	Composition	Formulation	N° autorisation	Formulation	Culture(s)		Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applic. max. (et int.)	DAR (jours)	Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
											le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
											50%	75%	90%	50%	75%	90%
TRIDUS	250 g/l trinexapac-éthyle	4	10436P/B	EC	Orge	H	31-32	0,6 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P	29-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
						P	30-31				6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	31-32				6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle						6	6	6	1	1	1
					Avoine		30-31				6	6	6	1	1	1
TRIMAXX	175 g/l trinexapac-éthyle	4	10141P/B	EC	Orge	H	31-32	0,8 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P	29-32	0,6 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,5 l/ha	1		6	6	6	1	1	1
							31-39	0,25 l/ha	2/culture (7 jours)		6	6	6	1	1	1
						P	30-31	0,4 l/ha	1		6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	31-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle						6	6	6	1	1	1
					Avoine		30-31	0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
TRINEXASTAR 250	250 g/l trinexapac-éthyle	4	32701P/P ; 33445P/P	EC	Orge	H	31-32	0,8 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
								0,5 l/ha***			6	6	6	1	1	1
						P	29-32	0,6 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	31-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
						P	30-31	0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P	31-32	0,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Épeautre						6	6	6	1	1	1
					Seigle						6	6	6	1	1	1
					Avoine		30-31	0,4 l/ha			6	6	6	1	1	1
TRINEXAPAC 175 EC (DLU : 31-10-2025)	***175 g/l trinexapac-éthyle***	***4***	***1327P/P***	***EC***	***Orge***	***H***	***31-32***	***0,8 l/ha***	***1***	***-***	***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
						P	***29-32***	***0,6 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Froment	***H***	***31-32***	***0,5 l/ha***	***1***		***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
							31-39	***0,25 l/ha***	***2/culture (7 jours)***		***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
						P	***30-31***	***0,4 l/ha***	***1***		***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Triticale	***H/P***	***31-32***	***0,5 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Épeautre						***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Seigle						***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
					Avoine		***30-31***	***0,4 l/ha***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
YATZE	480 g/l éthephon	2	9833P/B	SL	Orge	H	37-39	1,25 l/ha	1	-	6	6	6	1	1	1
						P		0,8 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Froment	H	37-45	1,25 l/ha**			6	6	6	1	1	1
					Triticale	H/P					6	6	6	1	1	1
					Épeautre			0,75 l/ha**			6	6	6	1	1	1
					Seigle		39-45	1,5 l/ha			6	6	6	1	1	1
					Avoine		-	-	-		-	-	-	-	-	-
YAWL	50 g/l prohexadione	3	10984P/B	OD	Orge	H/P	29-39	1,5 l/ha	1*	-	6	6	6	1	1	1
					Froment						6	6	6	1	1	1
					Triticale		29-34				6	6	6	1	1	1
					Épeautre		29-39				6	6	6	1	1	1
					Seigle		31-34				6	6	6	1	1	1
					Avoine						6	6	6	1	1	1

FONGICIDES : EPEAUTRE – FROMENT – ORGE – SEIGLE – TRITICALE

Les différents fongicides à pulvériser, autorisés en Belgique pour lutter contre les maladies des céréales sont présentés dans les tableaux suivants :

Orge et escourgeon / Epeautre, froment, seigle et triticale / Avoine

Les fongicides appliqués par traitement des semences font l'objet de tableaux spécifiques (Traitements des semences).

Des recommandations pratiques quant à l'utilisation des fongicides figurent dans la rubrique « Lutte intégrée contre les maladies » (pages blanches ci-avant).

En fonction de la pression en maladies observée dans votre parcelle et du stade atteint par la céréale, il vous sera possible, sur base des conseils qui y sont développés :

- de décider de l'opportunité d'effectuer un traitement ;
- de choisir les produits les plus efficaces pour le réaliser.

Avertissements **CePiCOP-Actualités-Céréales**

Grâce à une collaboration entre le CARAH, CPL Végémar, CRA-W, CORDER (UCL), OPA qualité Ciney, ULiège Gx-ABT, et de services extérieurs de la DGARNE, l'évolution de la pression des maladies est suivie par le **CePiCOP** tout au long de la saison. **Ces informations sont disponibles** gratuitement (pour les agriculteurs) au travers des avertissements. Ces avertissements sont disponibles sur le site Centrespilotes.be. De plus, grâce à l'inscription sur ce site, les avertissements vous seront également communiqués par mail chaque mardi durant la saison du printemps à l'automne.

Fongicides épeautre, froments, seigle et triticale

- Les strobilurines (azoxystrobine, fluoxastrobine, pyraclostrobine, trifloxystrobine) ne fonctionnent plus sur la septoriose.
- Les « SDHI » autorisées en céréales sont des substances actives de la famille des carboxamides (bixafen, boscalid, fluxapyroxad aussi appelé Xémium, isopyrazam).

Fongicides autorisés en orge (1/3) (màj : 17-01-2025)

* En mélange avec un fongicide autorisé à autre mode d'action

** Maximum 1 application pour ce stade et cet usage mais 2 applications par culture sont autorisées (la deuxième application sera pour un autre stade et usage).

*** La dose la plus haute ne sera appliquée qu'en cas de forte infestation.

° Maximum 1 application pour ce stade et cet usage mais 2 applications par an sont autorisées (la deuxième application sera pour un autre stade et usage).

^Au printemps

^^ max. 2 applications/culture, dont max. 1 application au BBCH 30-39

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Cult.		Cible(s)									Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Orge		Piétin-verse	Oïdium	Ramulariose	Rouilles			Helminthosporiose	Rhynchosporiose	Fusariose	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemps				Brune	Jaune	Naine				50%	75%	90%	50%	75%	90%
ABRAN 250	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	33454P/B	EC	-	31-49	0,8 l/ha	2/an (14 jours)	35	x	x		Oi				Rn		Rh		10	6	6	10	5	1
						30-32		1°				Pv														
AFFIX	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10903P/B	SC	-	31-39	1l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x		Oi				Rn	He			10	6	6	10	5	1
AMISTAR	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	8898P/B	SC	-	31-39	1l/ha	2/culture	-	x	x		Oi				Rn	He			6	6	6	2	2	1
AMISTAR ERA 350 SC	Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	200 g/l azoxystrobine 150 g/l prothioconazole	36075P/B	SC	-	30-65	1l/ha	1/ culture	35	x	x		Oi				Rn	He	Rh		6	6	6	5	2	1
AMISTAR PRIME	Strobilurines (C3) Amines (G2)	150 g/l azoxystrobine 280 g/l fenpropidine	33088P/B	SE	-	30-59	1l/ha	1/ culture	-	x	x		Oi				Rn	He	Rh		40	30	20	40	30	20
ARTINA (DLU : 31-05-2026)	***Triazoles (G1)***	***90 g/l metconazole***	***10896P/B***	***EC***	***-***	***31-49***	***1 l/ha***	***1/culture***	***35***	***x***	***x***		***Oi***				***Rn***		***Rh***		***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***
ASCRA XPRO	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu) 130 g/l prothioconazole	10783P/B	EC	-	30-32	1,2 l/ha	1/culture	-	x	x	Pv									10	6	6	10	5	1
						30-61				x	x		Oi	Ra			Rn	He	Rh							
ATACERT	Phénylacétamides (gr. 06)	50 g/l cyflufénamide	1103P/P	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	x	x		Oi								6	6	6	1	1	1
ATTA-BUCO (DLU : 30-06-2025)	***Triazoles (G1)***	***250 g/l tébuconazole***	***1356P/P***	***EC***	***-***	***31 ou 45***	***1,5 l/ha***	***1/culture***	***-***	***x***	***x***		***Oi***				***Rn***	***He***	***Rh***		***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
AVIATOR XPRO	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	150 g/l prothioconazole 75 g/l bixafen	9994P/B	EC	-	31-49	1l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x		Oi	Ra			Rn	He	Rh		6	6	6	2	2	1
AZAKA	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10345P/B	SC	-	31-39	1l/ha	2/culture	-	x	x		Oi				Rn	He			6	6	6	1	1	1
AZARIUS	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	29477P/B	SC	-	31-39	1l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oi				Rn	He			6	6	6	2	2	1
AZBANY	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10640P/B	SC	-	31-39	1l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oi				Rn	He			6	6	6	1	1	1
AZOSHY	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10862P/B	SC	-	31-39	1l/ha	2/culture	-	x	x		Oi				Rn	He			6	6	6	5	2	1
AZOXYSTROBIN 250 SC (DLU : 30-06-2026)	***Strobilurines (C3)***	***250 g/l azoxystrobine***	***1400P/P***	***SC***	***-***	***31-39***	***1 l/ha***	***2/culture (14 jours)***	***-***	***x***	***x***		***Oi***				***Rn***	***He***			***6***	***6***	***6***	***2***	***2***	***1***
AZOXYSTROBIN 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	32571P/P	SC	-	31-39	1l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oi				Rn	He			6	6	6	2	2	1
BALAYA (DLU : 31-01-2025)	***Triazoles (G1) Strobilurines (C3)***	***100 g/l mefentrifluconazole 100 g/l pyraclostrobine***	***1395P/P***	***EC***	***-***	***30-69***	***1,5 l/ha***	***2/culture (14 jours)***	***35***	***x***	***x***			***Ra***			***Rn***	***He***	***Rh***		***6***	***6***	***6***	***2***	***2***	***1***
BALAYA	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l mefentrifluconazole 100 g/l pyraclostrobine	11061P/B ; 24959P/P	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x			Ra			Rn	He	Rh		6	6	6	2	2	1
BIOSOON 80 WG (DLU : 15-04-2026)	***Composés inorganiques (gr. M02)***	***80 % soufre (FU)***	***1252P/P***	***WG***	***x***	***-***	***5 kg/ha***	***-***	***-***	***x***	***x***		***Oi***								***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Cult.		Cible(s)									Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive			
										Orge		Piétin-verse	Oïdium	Ramulariose	Rouilles			Helminthosporiose	Rhynchosporiose	Fusariose	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage
										Hiver	Printemp				Brune	Jaune	Naine				50%	75%	90%	90%
BIXAZOR EXTRA	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyrame 130 g/l prothioconazole	24766P/P	EC	-	30-32 30-61	1,2 l/ha	1/culture	-	x	x	Pv	Oï	Ra			Rn	He	Rh		10	6	6	1
BOLT 250	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	33452P/B	EC	-	31-49 30-32	0,8 l/ha	2/an (14 jours) 1/°	35	x	x	Pv	Oï				Rn		Rh		10	6	6	1
CARAMBA	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	8883P/B	EC	-	31-49	1,5 l/ha	1/culture	35	x							Rn		Rh		6	6	6	1
CARAMBA 90 EC	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10922P/B	EC	-	31-49	1l/ha	1/culture	35	x	x		Oï				Rn		Rh		6	6	6	1
CELLO TRIPLE	Quinazolinones (E1) Triazoles (G1) Amines (G2)	40 g/l proquinazide 160 g/l prothioconazole 200 g/l spiroxamine	10052P/B	EC	-	30-49	1,25 l/ha	1/culture	-	x	x	Pv	Oï	Ra				He	Rh		10	6	6	1
CERATAVO PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	10676P/B	EC	-	31-45	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x			Ra			Rn	He	Rh		6	6	6	1
CHAMANE	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10218P/B	SC	-	31-39	1l/ha	2/culture	-	x	x		Oï				Rn	He			6	6	6	1
CHAMANE 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	12209P/B	SC	-	31-39	1l/ha	2/culture (7 jours)	35	x			Oï			Rj	Rn	He			6	6	6	1
											x		Oï			Rj	Rn	He			6	6	6	1
CLARO 375 SC	Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	200 g/l azoxystrobine 175 g/l prothioconazole	30761P/B	SC	-	29-37 49-59 49-51	1l/ha	2/cultures (21jours) 1/°	-	x			Oï				Rn	He	Rh		6	6	6	1
																				Fu				
CHAMANE SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10901P/B	SC	-	31-39	1l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x		Oï				Rn	He			10	6	6	1
COMET NEW	Strobilurine (C3)	200 g/l pyraclostrobine	10524P/B	EC	-	31-39	1,25l/ha*	2/culture (28 jours)	-	x	x					Rj	Rn	He			6	6	6	1
CORRIB 250	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	33455P/B	EC	-	31-49 30-32	0,8 l/ha	2/an (14 jours) 1/°	35	x	x	Pv	Oï				Rn		Rh		10	6	6	1
COSAVET	Composés inorganiques (gr. M 02)	80 % soufre (FU)	8775P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x		Oï								6	6	6	1
COSNE	Phénylacétamides (gr. 06)	50 g/l cyflufénamide	10060P/B	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	x	x		Oï								6	6	6	1
CURBATUR	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10778P/B	EC	-	30-32 31-49	0,8 l/ha	1/° 2/an	-	x	x	Pv	Oï				Rn	He	Rh		6	6	6	1
CYFLUMAX	Phénylacétamides (gr. 06)	50 g/l cyflufénamid	13939P/P	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	x	x		Oï								6	6	6	1
DELARO	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	175 g/l prothioconazole 150 g/l trifloxystrobine	9634P/B	SC	-	30-49	0,8 l/ha	2/culture	-	x	x		Oï				Rn	He	Rh		6	6	6	1
DIOPYR	Benzophénones (B6)	180 g/l pyriofénone	10953P/B	SC	-	30-49	0,5 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oï								6	6	6	1
ELATUS PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	10601P/B	EC	-	31-45	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x			Ra			Rn	He	Rh		6	6	6	1
EMPARTIS	Carboxamides (C2) Strobilurines (C3)	200 g/l boscalid 100 g/l krésoxym-méthyl	28572P/B	SC	-	30-49	1,5 l/ha	1	-	x	x							He			6	6	6	1
ERA	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	10778P/B	EC	-	31-49	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oï				Rn	He	Rh		6	6	6	1
ERA 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	36070P/B	EC	-	31-49	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oï				Rn	He	Rh		6	6	6	1
EUSKATEL	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	28412P/B	EC	-	31-49 30-32	0,8 l/ha	2/an (14 jours) 1	35	x	x	Pv	Oï				Rn		Rh		10	6	6	1
EVORA XPRO	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	100 g/l prothioconazole 100 g/l tébuconazole 75 g/l bixafen	9970P/B	EC	-	30-32 31-49	1l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	Pv	Oï	Ra				He	Rh		6	6	6	1

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Cult.	Cible(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive				
											Orge		Piétin-verse	Oïdium	Ramulariose	Rouilles					le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage	
											Hiver	Printemp				Brune	Jaune	Naine	Helminthosporiose	Rhynchosporiose	Fusariose	50%	75%	90%	50%	75%	90%
FANDANGO	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l prothioconazole 100 g/l fluoxastrobine	9458P/B	EC	-	30-32 31-49	1.25 l/ha	1** 2/culture (14 jours)	-		x x	x x	Pv	x Oï						Rn	Rh	20	10	6	20	10	5
FANDANGO PRO	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l prothioconazole 50 g/l fluoxastrobine	9723P/B	EC	-	31-32 31-49	2 l/ha 1.75 l/ha	1** 2/culture	-		x x	x x	Pv	x Oï						Rn	He Rh	20	10	6	20	10	5
FLEXITY	Benzophénones (B6)	300 g/l métrafénone	9515P/B	SC	-	31-59	0.5 l/ha	2/an (21jours)	-		x	x		Oï								6	6	6	1	1	1
FLEXURE	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	32682P/B	EC	-	30-32 31-49	1.25 l/ha	1* 2/an (14 jours)	-		x	x	Pv	x Oï						Rn	He Rh	6	6	6	5	2	1
FLOSUL	Composés inorganiques (gr. M02)	800 g/l soufre (FU)	11022P/B	SC	x	-	5 l/ha	2 (14 jours)	35		x	x		Oï								6	6	6	1	1	1
GLOBAZTAR AZT 250 SC	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	10793P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture	-		x	x		Oï						Rn	He	6	6	6	2	1	1
GLOBAZTAR SC	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	10109P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture	-		x	x		Oï						Rn	He	6	6	6	2	1	1
GLOB-PROMET	Triazoles (G1) Triazoles (G1)	90 g/l metconazole (Cis/trans 84/16) 250 g/l prothioconazole	34593P/B	EC	-	25-61	0.5 l/ha	1/culture	35		x	x								Rn	Rh	6	6	6	1	1	1
HELIX	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	9806P/B	EC	-	30-32 31-49	1.25 l/ha	1* 2/an (14 jours)	-		x x	x x	Pv	Oï						Rn	Rh	6	6	6	5	2	1
HELSINKI (DLU : 31-07-2025)	***Triazoles (G1)***	***250 g/l prothioconazole***	***11157P/B***	***EC***	***-***	***30-32*** ***31-49***	***0.8 l/ha***	***2/culture*** ***2/culture***	***-***		***x*** ***x***	***x*** ***x***	***Pv***	***Oï***						***Rn***	***He*** ***Rh***	***10***	***6***	***6***	***10***	***5***	***1***
HERMOVIT	Composés inorganiques (gr. M02)	80 % soufre (FU)	6676P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-		x	x		Oï								6	6	6	1	1	1
IM TREX (DLU : 31-10-2025)	***Carboxamides (C2)***	***62.5 g/l fluxapyroxad***	***10120P/B***	***EC***	***-***	***30-69*** ***31-32***	***2 l/ha***	***2/culture (21 jours)*** ***1***	***-***		***x*** ***x***	***x*** ***x***	***Pv***		***Ra***		***Rj***	***Rn***	***He***	***Rn***	***Rh***	***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
IM TREX EC	Carboxamides (C2)	62.5 g/l fluxapyroxad	10620P/B	EC	-	30-69 31-32	2 l/ha	2/culture (21jours) 1**	-		x x	x x	Pv		Ra		Rj	Rn	He	Rn	Rh	6	6	6	1	1	1
INNOX	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	3520P/B	EC	-	30-65	0.8 l/ha	1/culture	35		x	x			Ra					Rn	Rh	6	6	6	5	2	1
INPUT	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	9719P/B	EC	-	30-32 31-49	1.25 l/ha	2 2/an (14 jours)	-		x x	x x	Pv	Oï						Rn	Rh	6	6	6	5	2	1
INTER CYFLUFENAMIDE EW	Phénylacétamides (gr. 06)	50 g/l cyflufénamide	32532P/P	EW	-	31-59	0.5 l/ha	2	-		x	x		Oï						Rn	Rh	6	6	6	1	1	1
JOUST	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	32908P/B	EC	-	30-61	0.6 l/ha	2/culture (14-21jours)	35		x			Oï	Ra			Rn	He	Rn	Rh	20	10	6	20	10	5
KESTREL	Triazoles (G1)	160 g/l prothioconazole 80 g/l tébuconazole	10346P/B	EC	-	30-61	1 l/ha	2/culture (14 jours)	-		x	x	Pv	Oï	Ra		Rj	Rn	He	Rn	Rh Fu	10	6	6	10	5	1
KEYNOTE XPRO	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu) 130 g/l prothioconazole	10996P/B	EC	-	30-61 30-32	1.2 l/ha	1/culture	-		x x	x x	Pv	Oï	Ra			Rn	He	Rn	Rh	10	6	6	10	5	1
KUMULUS WG	Composés inorganiques (gr. M02)	80 % soufre (FU)	9185P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-		x	x		Oï								6	6	6	1	1	1
LENVYOR	Triazoles (G1)	100 g/l méfentrifluconazole	11041P/B	EC	-	30-69	1.5 l/ha	2/culture (14 jours)	35		x	x		Oï	Ra			Rn	He	Rn	Rh	6	6	6	2	2	1
LERAK	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	3269P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture (14 jours)	-		x	x		Oï				Rn	He			6	6	6	2	2	1
LIBRAX	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	45 g/l metconazole 62.5 g/l fluxapyroxad	10177P/B	EC	-	25-69	2 l/ha	1/culture	-		x	x	Pv	Oï	Ra		Rj	Rn	He	Rn	Rh	6	6	6	5	2	1

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Cult.		Cible(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Orge		Piétin-verse	Oïdium	Ramulariose	Rouilles			Helmintho sporiose	Rhynchosporiose	Fusariose	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemp				Brune	Jaune	Naine				50%	75%	90%	50%	75%	90%
LINVER 700	Composés inorganiques (gr. M02)	700 g/l soufre	3623BP/P	SC	x	30-59	6 l/ha	2 /culture (10 jours)	-	x	x		Oï								6	6	6	1	1	1
MADISON FORTE	Triazoles (G1) Amines (G2) Strobilurine (C3)	93,3 g/l prothioconazole 107 g/l spiroxamine 80 g/l trifloxystrobine	2850ZP/B	EC	-	30-61	1,5 l/ha	2/culture (21jours)	-	x	x		Oï	Ra			Rn	He	Rh		20	10	6	20	10	5
MADISON SUPER	Triazoles (G1) Strobilurine (C3)	175 g/l prothioconazole 150 g/l trifloxystrobine	3096GP/B	SC	-	30-49	0,8 l/ha	2	-	x	x		Oï				Rn	He	Rh		6	6	6	2	2	1
MAGANIC	Triazoles (G1)	125 g/l difénoconazole	3299GP/B	EC	-	39-59	1l/ha	1/culture	-	x	x			Ra			Rn	He	Rh		6	6	6	5	2	1
MAGNUM	Strobilurine (C3)	175 g/l prothioconazole 200 g/l pyraclostrobine	1108TP/B	EC	-	31-39	1,25 l/ha*	2/culture (28 jours)	-	x	x				Rj	Rn	Rn	He			6	6	6	5	2	1
MAXENTIS	Strobilurine (C3) Triazoles (G1)	200 g/l azoxystrobine 150 g/l prothioconazole	3304BP/B	SC	-	30-65	1l/ha	1/culture	35	x	x		Oï				Rn	He	Rh		6	6	6	5	2	1
METFIN	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	2854TP/B	EC	-	31-49	1,5 l/ha	1/culture	35	x							Rn		Rh		6	6	6	5	2	1
METFLAX	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	45 g/l metconazole 62,5 g/l fluxapyroxad	1293P/P	EC	-	25-69	2 l/ha	1/culture	-	x	x	Pv	Oï	Ra	Rj	Rn	Rn	He	Rh		6	6	6	5	2	1
MICROTHOL SPECIAL LIQ	Composés inorganiques (gr. M02)	825 g/l soufre (ACFU)	1092PP/B	SC	x	31-59	4,8 l/ha	2 (14 jours)	-	x	x		Oï								6	6	6	2	2	1
MIRADOR	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	1014GP/B	SC	-	31-39	1l/ha	2/culture	-	x	x		Oï				Rn	He			6	6	6	2	2	1
MIRALON	Strobilurine (C3) Carboxamides (C2)	75 g/l azoxystrobine 50 g/l fluxapyroxad	3299BP/B	EC	-	30-69	2 l/ha	2 / culture (21jours)	35	x	x		Oï	Ra			Rn	He	Rh		6	6	6	1	1	1
MIRROR	Phthalimides (electrophiles) (M04)	500 g/l folpet	1115P/B	SC	-	30-59	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	42	x	x			Ra				He	Rh		6	6	6	2	2	1
MIZONA	Strobilurines (C3) Carboxamides (C2)	200 g/l pyraclostrobine 30 g/l fluxapyroxad	1106SP/B	EC	-	30-69	1l/ha	2/culture (21jours)	35	x	x							He	Rh		6	6	6	2	2	1
NAVURA	Triazoles (G1)	100 g/l prothioconazole 50 g/l méfentrifluconazole	2840SP/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	1/culture	35	x	x			Ra			Rn	He	Rh		6	6	6	1	1	1
NIMAGIS	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	3269GP/B	SC	-	31-39	1l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oï				Rn	He			6	6	6	2	2	1
NISSODIUM	Phénylacétamides (gr. 06)	50 g/l cyflufénamide	9468P/B	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	x	x		Oï								6	6	6	1	1	1
NORIOS	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	1090TP/B	SC	-	31-39	1l/ha	2/culture (7 jours)	35	x			Oï		Rj	Rn	Rn	He			6	6	6	5	2	1
											x		Oï		Rj	Rn	Rn	He			6	6	6	1	1	1
PADELLI	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	3165DP/B	EC	-	31-49	1,25 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x		Oï				Rn	He	Rh		6	6	6	5	2	1
						30-32		2/an		x	x	Pv														
PANORAMA	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole 250 g/l prothioconazole	3112DP/B	EC	-	35-61	0,5 l/ha	1/culture	35	x	x						Rn		Rh		6	6	6	1	1	1
PATEL 250 EC	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	1098ZP/B	EC	-	30-32	0,8 l/ha	1**	-	x	x	Pv									6	6	6	5	2	1
						31-49	0,8 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oï				Rn	He	Rh							
PATTON FLEX	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	3253DP/B	EC	-	31-49	0,8 l/ha	2/an	-	x	x		Oï				Rn	He	Rh		6	6	6	2	2	1
						30-32		1*				Pv														
PECARI 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	1116SP/B	EC	-	31-49	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oï				Rn	He	Rh		6	6	6	5	2	1
PIOLI	Carboxamides (C2)	62,5 g/l fluxapyroxad	1124SP/B	EC	-	30-69	2 l/ha	2/culture (21jours)	-	x	x			Ra	Rj	Rn	Rn	He	Rh		6	6	6	1	1	1
						31-32	2 l/ha	1**	-	x	x	Pv														
PLEXEO 60	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	1072AP/B	SL	-	31-49	1,5 l/ha	1/culture	35	x							Rn		Rh		6	6	6	5	2	1
PLEXEO 90 (DLU : 31-05-2026)	***Triazoles (G1)***	***90 g/l metconazole***	***1089TP/B***	***EC***	***-***	***31-49***	***1l/ha***	***1/culture***	***35***	***x***	***x***		***Oï***			***Rn***			***Rh***		***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***
POLYVERSUM	Microorganisme	Pythium oligrandrum M1	1113SP/B	WP	x	-	0,1kg/ha	2 (14 jours)	-		x									Fu	6	6	6	1	1	1
PRIAXOR EC	Strobilurines (C3) Carboxamides (C2)	150 g/l pyraclostrobine 75 g/l fluxapyroxad	1065BP/B	EC	-	25-59	1,5 l/ha	2/culture (21jours)	-	x	x		Oï	Ra	Rj	Rn	Rn	He	Rh		30	20	10	30	20	10

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Cult.	Cible(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive				
																			le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage	
																			50%	75%	90%	50%	75%	90%
											Piétin-verse	Oïdium	Ramulariose	Rouilles			Helminthosporiose	Rhynchosporiose	Fusariose					
														Brune	Jaune	Naine								
										Hiver	P v													
										Printemp														
PRIDE	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10951P/B	EC	-	30-32	0,8 l/ha	1**	-	x														
								1°																
						31-49		2/culture (14 jours)	35	x	P v	Oï				Rn	He	Rh						
PRINCE	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	11028P/B	EC	-	30-32	0,8 l/ha	1**	-	x										6	6	6	5	1
								1°			P v													
						31-49		2/culture (14 jours)	35	x		Oï				Rn	He	Rh						
PRIORIERA 350 SC	Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	200 g/l azoxystrobine 150 g/l prothioconazole	36076P/B	SC	-	30-65	1l/ha	1/ culture	35	x	x	Oï				Rn	He	Rh	6	6	6	5	1
PROCER 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11550P/B	EC	-	31-49	0,65 l/ha	2/culture	-	x	x	Oï				Rn	He	Rh	6	6	6	5	1
PROCER XTRA	Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	140 g/l azoxystrobine 100 g/l prothioconazole	30957P/B	EC	-	31-59	1,4 l/ha	2 (21jours)	35		x						He			10	6	10	5	1
PROFIAZ 250 SC	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	11035P/B	SC	-	31-39	1l/ha	2/culture	-	x	x	Oï				Rn	He			6	6	2	2	1
PROLINE	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	9805P/B	EC	-	30-32	0,8 l/ha	1*	-	x	P v									6	6	2	2	1
						31-49		2/an		x		Oï				Rn	He	Rh						
PROMINO 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11153P/B	EC	-	31-49	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	Oï				Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1
PROMINO XTRA	Strobilurine (C3) Triazoles (G1)	140 g/l azoxystrobine 100 g/l prothioconazole	28978P/B	EC	-	31-59	1,4 l/ha	2/culture (21jours)	35	x						Rn	He	Rh	10	6	10	5	1
PROPERTY 180 SC	Benzophénones (B6)	180 g/l pyriofénone	10339P/B	SC	-	30-49	0,5 l/ha	2 /culture (14 jours)	-	x	x	Oï							6	6	6	1	1	1
PROTENDO 250 EC	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10930P/B	EC	-	30-32	0,8 l/ha	1**	-	x	P v					Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1
						31-49		2/culture (14 jours)	-	x	x	Oï												
PROTENDO 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11111P/B	EC	-	31-49	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	Oï				Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1
PROTHIO 250 EC (DLU : 30-06-2026)	***Triazoles (G1)***	***250 g/l prothioconazole***	***32694P/P***	***EC***	***-***	***30-32***	***0,8 l/ha***	***1***	***35***	***x***	***x***	***Oï***				***Rn***	***He***	***Rh***	***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***
						31-49		***2/culture (14 jours)***	***-***	***x***	***x***													
PROTIOBELCO 250 EC (DLU : 31-07-2025)	***Triazoles (G1)***	***250 g/l prothioconazole***	***25247P/P***	***EC***	***-***	***30-32***	***0,8 l/ha***	***1***	***-***	***x***	***x***	***Pv***							***6***	***6***	***6***	***5***	***1***	***1***
						31-49		***2/culture (14 jours)***	***-***	***x***	***x***	***Oï***				***Rn***	***He***	***Rh***	***10***					
PROTIOSTAR	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	11156P/B	EC	-	30-32	0,8 l/ha	3/culture	-	x	x	Pv							20	10	6	20	10	5
						31-49		3/culture (14 jours)		x	x	Oï				Rn	He	Rh						
PYLON	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	31508P/B	EC	-	30-32	0,8 l/ha	2/an	-	x	x	Pv							6	6	6	2	2	1
						31-49				x	x	Oï				Rn	He	Rh						
PYRACLO 200 (DLU : 30-06-2025)	***Strobilurine (C3)***	***200 g/l pyraclostrobine***	***1392P/P***	***EC***	***-***	***31-39***	***1,25 l/ha****	***1 (28 jours)***	***-***	***x***	***x***					***Rj***	***Rn***	***He***	***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***
PYRACLO 200	Strobilurine (C3)	200 g/l pyraclostrobine	32664P/P	EC	-	31-39	1,25 l/ha*	2/culture (28 jours)	-	x	x					Rj	Rn	He	6	6	6	5	2	1
REMOCCO 60	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	11255P/B	EC	-	31-49	1,5 l/ha	1/culture	35	x						Rn		Rh	6	6	6	5	2	1
REVYFLEX TRIO	Triazoles (G1) Benzophénones (B6) Strobilurine (C3)	66,6 g/l méfentrifluconazole 100 g/l métrafénone 80 g/l pyraclostrobine	31426P/B	EC	-	30-59	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	56	x	x	Oï	Ra			Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1
REVYSTAR GOLD	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	100 g/l méfentrifluconazole 50 g/l fluxapyroxad	11085P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x		Ra			Rn	He	Rh	6	6	6	1	1	1
REVYTREX	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	66,7 g/l fluxapyroxad 66,7 g/l fluxapyroxad	11069P/B ; 13767P/P ; 23665P/P	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x		Ra				He	Rh	6	6	6	5	2	1
REVYTREX (DLU : 15-04-2025)	***Triazoles (G1) Carboxamides (C2)***	***66,7 g/l méfentrifluconazole 66,7 g/l fluxapyroxad***	***24963P/P***	***EC***	***-***	***30-69***	***1,5 l/ha***	***2/culture (14 jours)***	***35***	***x***	***x***		***Ra***				***He***	***Rh***	***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Cult.		Cible(s)										Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Orge		Piétin-verse	Oïdium	Ramulariose	Rouilles			Helminthosporiose	Rhynchosporiose	Fusariose		le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemp				Brune	Jaune	Naine					50%	75%	90%	50%	75%	90%
RIZA EC	Triazoles (G1)	200 g/l tébuconazole	10665P/B	EC	-	31-45	1,25 l/ha	1/culture	-	x	x		Oï			Rj	Rn	He	Rh			6	6	6	5	2	1
SESTO ONE	Phthalimides (electrophiles) (M 04)	500 g/l folpet	11658P/B	SC	-	30-59	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	42	x	x			Ra				He	Rh			6	6	6	2	2	1
SILTRA XPRO	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	200 g/l prothioconazole 60 g/l bixafen	10375P/B	EC	-	31-49	1 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x		Oï	Ra			Rn	He	Rh			6	6	6	5	2	1
SILVRON XPRO	Carboxamides (C2)	100 g/l bixafen 100 g/l fluopyram (FU)	11224P/B	EC	-	30-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x						Rn	He	Rh			6	6	6	2	2	1
SIMVERIS	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10817P/B	EC	-	31-49	1 l/ha	1/culture	35	x	x		Oï				Rn		Rh			6	6	6	5	2	1
SINSTAR	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	10447P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture	-	x			Oï				Rn	He				6	6	6	2	2	1
SIRENA	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	10420P/B	SL	-	31-49	1,5 l/ha	1/culture	35	x							Rn		Rh			6	6	6	5	2	1
SKYWAY XPRO	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	100 g/l prothioconazole 100 g/l tébuconazole 75 g/l bixafen	9972P/B	EC	-	30-32 31-49	1 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	Pv					Rn	He	Rh			6	6	6	2	2	1
SLIPSTREAM	Triazoles (G1) Triazoles (G1)	90 g/l metconazole (cis/trans 84/16) 250 g/l prothioconazole	35951P/B	EC	-	25-61	0,5 l/ha	1/culture	35	x							Rn		Rh			6	6	6	1	1	1
SOLAGOLD FORTE	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	150 g/l prothioconazole 75 g/l benzovindiflupyr	12177P/P ; 29587P/P	EC	-	31-45	1 l/ha	1/culture	-	x	x			Ra			Rn	He	Rh			6	6	6	5	2	1
SORATEL	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	32284P/B	EC	-	30-65	0,8 l/ha	1/culture	35	x	x			Ra			Rn	He	Rh			6	6	6	5	2	1
STAVENTO	Phthalimides (electrophiles) (M 04)	500 g/l folpet	11114P/B	SC	-	30-59	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	42	x	x			Ra				He	Rh			6	6	6	2	2	1
TALENDO	Quinazolinones (E1)	200 g/l proquinazide	11048P/B	EC	-	25-49	0,25 l/ha	2 (14 jours)	-	x	x		Oï									6	6	6	2	2	1
TARCZA 250 EW	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	10236P/B	EW	-	31-45	1 l/ha	1/culture	-	x	x		Oï				Rn	He	Rh			6	6	6	5	2	1
TARTAROS 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	12254P/B	EC	-	31-49	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oï				Rn	He	Rh			6	6	6	5	2	1
TEBUCONAZOR 250	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	28842P/P	EW	-	31-45	1 l/ha	1/culture	-	x	x		Oï				Rn	He	Rh			6	6	6	5	2	1
TEBUCUR 250 EW	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	10172P/B	EW	-	31-45	1 l/ha	1/culture	35	x	x					Rj	Rn				Fu	6	6	6	5	2	1
	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole				61-69	1 l/ha	1/culture	35	x	x																
TEBUP HYT	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	1055P/P	EC	-	31ou 45	1 - 1,5 l/ha°	1/culture	-	x	x		Oï				Rn	He	Rh			6	6	6	1	1	1
TEBUSHA	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	10766P/B	EW	-	31-45	1 l/ha	1/culture	-	x	x		Oï				Rn	He	Rh			6	6	6	5	2	1
TEBUSIP	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	9766P/B	EC	-	31ou 45	1 - 1,5 l/ha°	1/culture	-	x	x		Oï				Rn	He	Rh			6	6	6	1	1	1
TEKO 250	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	33453P/B	EC	-	31-49 30-32	0,8 l/ha	2/an (14 jours) 1°	35	x	x	Pv	Oï				Rn		Rh			10	6	10	10	5	1
TELESCOPE	Triazoles (G1) Triazoles (G1)	100 g/l difénoconazole 54 g/l metconazole (cis/trans 84/16)	32603P/B	EC	-	31-61	0,75 l/ha	2/culture (21jours)	42	x	x							He	Rh			-	6	-	10	5	
TESANTO	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	12250P/B	EC	-	31-45	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x			Ra			Rn	He	Rh			6	6	6	5	2	1
THIOVIT JET	Composés inorganiques (gr. M 02)	80 %soufre (FU)	5700P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x		Oï									6	6	6	1	1	1

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Cult.		Cible(s)							Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive								
										Orge		Piétin-verse	Oïdium	Ramulariose	Rouilles			Helminthosporiose	Rhynchosporiose	Fusariose	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemps				Brune	Jaune	Naine				50%	75%	90%	50%	75%	90%
TUBERI	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l benzeovindiflupyr 150 g/l prothioconazole	32677P/P	EC	-	31-45	1l/ha	1/culture	-	x	x			Ra				Rn	He	Rh	6	6	6	2	5	1
TURRET 60	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	10923P/B	SL	-	31-49	1,5 l/ha	1/culture	35	x	x							Rn			6	6	6	2	5	1
TURRET 90 (DLU : 31-05-2026)	***Triazoles (G1)***	***90 g/l metconazole***	***10898P/B***	***EC***	***-***	***31-49***	***1 l/ha***	***1/culture***	***35***	***x***	***x***		***Oï***				***Rn***		***Rh***		***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***
ULTRALINE (DLU : 31-07-2025)	***Triazoles (G1)***	***250 g/l prothioconazole***	***11095P/B***	***EC***	***-***	***30-32***	***0,8 l/ha***	***1*****	***-***	***x***	***x***	***Pv***									***10***	***6***	***6***	***10***	***5***	***1***
						31-49		***2/culture (14 jours)***		***x***	***x***		***Oï***				***Rn***	***He***	***Rh***						
VALPURA XPRO	Carboxamides (C2)	125 g/l bixafen	10871P/B	EC	-	30-61	1l/ha	1/culture	56	x	x			Ra				Rn	He	Rh	6	6	6	2	2	1
VARIANO XPRO	Carboxamides (C2) Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	40 g/l bixafen 50 g/l fluoxastrobine 100 g/l prothioconazole	10327P/B	EC	-	30-61	1,5 l/ha	2/an (14 jours)	-	x			Oï	Ra				Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1
													Oï	Ra				Rn	He	Rh	6	6	6	1	1	1
VEGAS PLUS	Amines (G2)	12,5 g/l cyflufénamid 312,5 g/l spiroxamine	29866P/B	EC	-	25-29	0,48 l/ha	1	-	x	x		Oï								6	6	6	5	2	1
						30-49	0,8 l/ha			x	x		Oï								10	6	6	10	5	1
VELDIG XPRO	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu) 130 g/l prothioconazole	10960P/B	EC	-	30-32	1,2 l/ha	1/culture	-	x	x	Pv									10	6	6	10	5	1
						30-61				x	x		Oï	Ra				Rn	He	Rh						
VELOGY ERA	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	150 g/l prothioconazole 75 g/l benzovindiflupyr	10602P/B	EC	-	31-45	1l/ha	1/culture	-	x	x			Ra				Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1
VELOGY PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	28589P/B	EC	-	31-45	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x			Ra				Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1
VERBEN	Quinazolinones (E1) Triazoles (G1)	50 g/l proquinazide 200 g/l prothioconazole	11226P/B	EC	-	25-49	1l/ha	1/culture	-	x			Oï					Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1
VERTAZA	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	32689P/B	SC	-	31-39	1l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		Oï					Rn	He		6	6	6	2	2	1
VERTIFIN	Composés inorganiques (gr. M02)	700 g/l soufre (FU)	11092P/B	SC	x	30-59	6 l/ha	2/culture (10 jours)	-	x	x		Oï								6	6	6	1	1	1
VERYDOR	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	100 g/l méfentrifluconazole 50 g/l fluxapyroxad	11013P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x			Ra				Rn	He	Rh	6	6	6	1	1	1
VSM CYFLUFENAMIDE 50 EW (DLU : 30-09-2025)	***Phénylacétamides (gr. 06)***	***50 g/l cyflufénamide***	***1220P/P***	***EW***	***-***	***31-59***	***0,5 l/ha***	***-***	***-***	***x***	***x***		***Oï***								***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
VSM TEBUCO (DLU : 28-02-2026)	***Triazoles (G1)***	***250 g/l tébuconazole***	***24312P/P***	***EC***	***-***	***31***	***1,5 l/ha******	***1/culture***	***-***	***x***	***x***		***Oï***					***Rn***	***He***	***Rh***	***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
						45				***x***	***x***															
WOPROAMOXIS 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	32286P/P	SC	-	32-59	1l/ha	2 (14 jours)	-	x	x		Oï					Rn	He		6	6	6	1	1	1
XENIAL	Triazoles (G1) Benzophénones (B6) Strobilurines (C3)	66,6 g/l méfentrifluconazole 100 g/l métrafénone 80 g/l pyraclostrobine	35739P/B	EC	-	30-59	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	56	x	x		Oï	Ra				Rn	He	Rh	6	6	6	5	2	1
ZOXIS	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	10044P/B	SC	-	31-39	1l/ha	2/culture	-	x	x		Oï					Rn	He		6	6	6	1	1	1
ZOXIS 250 SC	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	10684P/B	SC	-	31-39	1l/ha	2/culture (7 jours)	35	x			Oï		Rb	Rj			He		6	6	6	5	2	1
											x		Oï		Rb	Rj			He		6	6	6	1	1	1

Fongicides autorisés en froment, seigle, triticale et épeautre (2/3) (màj : 17-01-2025)

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	fenpico	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)								Cible(s)										Zone tampon (mètres) suivant % perte rendement le long des fossés de bord de route, de drainage			
										Froment		Seigle		Triticale		Epeautre		Piétin-verse	Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Helmintosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau				le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps										50%	75%	90%	50%	75%	90%
ABRAN 250	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	3345 4P/B	EC	-	31-65 61-65 30-32 32-59 30-32	0,8 l/ha	2/an (14 jours) 1* 2/an (14 jours) 1* 1/an	35			x	x					Pv	Oï	Rb	Rj		Sf		Se		10	6	6	10	5	1
AFFIX	Sto blurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	1 1903P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x	x	x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf		Se		10	6	6	10	5	1
AMISTAR	Sto blurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	8898P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	2	2	1
AMISTAR ERA 350 SC	Sto blurines (C3) Triazoles (G1)	200 g/l azoxystrobine 150 g/l prothioconazole	3607 5P/B	SC	-	30-69 61-69 30-65 30-65 30-69	1 l/ha	1/ culture 1/ culture 1/ culture^ 1/ culture 1/ culture	35 35 35 35			x	x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	5	2	1
AMISTAR PRIME	Sto blurines (C3) Amines (G2)	150 g/l azoxystrobine 280 g/l fenpropidine	3308 8P/B	SE	-	30-59 30-59	1 l/ha	1/ culture 1/ culture	- -	x	x	x	x	x	x				Oï	Rb	Rj	He	Sf				40	30	20	30	20	10
ANGLE	Sto blurines (C3) Triazoles (G1)	125 g/l azoxystrobine 125 g/l difénoconazole	1118P/B	SC	-	30-69	1 l/ha	1	-	x	x	x	x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf				10	6	6	10	5	1
AQUINO	Picolinamides (C4)	50 g/l fenpicoxamide	1099P/B	EC	-	30-69	15 l/ha 2 l/ha	1/an	-	x	x	x	x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf				30	20	10	30	20	10
ARTINA (DLU : 31-05-2026)	*Triazoles (G1)*	*60 g/l metconazole*	*0896P/B*	*EC*	-	*31-59* *65*	*2 l/ha*	*1/culture*	*35*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*Oï*	*Rb*	*Rj*		*Sf*		*Se*		*6*	*6*	*6*	*5*	*2*	*1*
ASCRA XPRO	Quin. (E) Triazoles (G1) Amines (G2	40 g/l proquinazide 100 g/l prothioconazole 200 g/l spiroxamine	1078 3P/B	EC	-	30-32 30-61	1.5 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	Pv			Oï	Rb	Rj	He	Sf		Se	Fu	10	6	6	10	5	1
ATACERT	Phénylacétamides (gr. 06)	50 g/l cyflufénamide	1103P/P	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Oï							Fu	6	6	6	1	1	1
ATTA-BUCO (DLU : 30-06-2025)	*Triazoles (G1)*	*250 g/l tébuconazole*	*1356P/P*	*EC*	-	*31-59*	*1 l/ha*	*1/culture*	-	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*Oï*	*Rb*	*Rj*		*Sf*		*Se*		*6*	*6*	*6*	*1*	*1*	*1*
AVATOR XPRO	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	150 g/l prothioconazole 75 g/l bixafen	9994P/B	EC	-	30-32 31-59 31-65	1,25 l/ha	2/an 2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	Pv			Oï	Rb	Rj	He	Sf			Fu	6	6	6	2	2	1
AZAKA	Sto blurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	1 1345P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	1	1	1
AZARIUS	Sto blurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	2947 7P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	2	2	1
AZBANY	Sto blurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	1 1640P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	1	1	1
AZOSHY	Sto blurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	1 0862P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	5	2	1
AZOXYSTROBIN 250 SC (DLU : 30-06-2026)	*Strobilurines (C3)*	*250 g/l azoxystrobine*	*1400P/P*	*SC*	-	*32-59*	*1 l/ha*	*2/culture*	-	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*				*Oï*	*Rb*	*Rj*		*Sf*		*Se*		*6*	*6*	*6*	*2*	*2*	*1*

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	fenpico	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)																Cible(s)														Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Froment			Seigle		Triticale			Epeautre								Piétin-verse	Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Helmintho sporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau				le long des fossés de bord de route, de drainage			
										Hiver	Printemps		Hiver	Printemps	Hiver	Printemps		Hiver	Printemps																			50%	75%	90%	50%	75%	90%
AZOXYSTROBIN 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	3257P/P	SC	-	32-59	1l/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Pv	Oï	Rb	Rj		Sf				6	6	6	2	2	1	1	1	1
BALAYA	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l méfentrifluconazole 100 g/l pyraclostrobine	1106P/B ; 2495P/P	EC	-	30-69	15 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Oï	Rb	Rj		Sf	Rh			6	6	6	2	2	1	1	1	1
BALAYA (DLU : 31-02-2025)	***Triazoles (G1) Strobilurines (C3)***	***100 g/l méfentrifluconazole 100 g/l pyraclostrobine***	***1395P/P***	***EC***	***-***	***30-69***	***1,5 l/ha***	***2/culture (14 jours)***	***35***		***x***	***x***		***x***	***x***	***x***			***x***	***x***					***Oï***	***Rb***	***Rj***		***Sf***				6	6	6	2	2	1	1	1	1
BELROSE (DLU : 30-09-2026)	***Triazoles (G1)***	***125 g/l tétraconazole***	***9897P/B***	***ME***	***-***	***31-59***	***1 l/ha***	***1/an***	***-***		***x***															***Oï***	***Rb***	***Rj***		***Sf***				6	6	6	1	1	1	1	1	1
BICANTA	Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	125 g/l azoxystrobine 125 g/l difénoconazole	1089 4P/B	SC	-	30-69	1l/ha	1	-	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Oï	Rb	Rj		Sf				10	6	6	5	5	1	1	1	1
BIOSOON 80 WG (DLU : 15-04-2026)	***Composés inorganiques (gr. M02)***	***80 % soufre (FU)***	***1252P/P***	***WG***	***x***	***-***	***5 kg/ha***	***-***	***-***					***x***	***x***	***x***			***x***	***x***														6	6	6	1	1	1	1	1	1
						30-59	***6 kg/ha***	***1***	***1***		***x***	***x***																														
BIXAZOR EXTRA	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyrame 130 g/l prothioconazole	2476 6P/P	EC	-	30-32 30-61 30-61	15 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x																						6	6	6	5	5	1	1	1	1
BOLT 250	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	3345 2P/B	EC	-	31-65 61-65 30-32 32-59 30-32	0,8 l/ha	2/an (14 jours) 1* 2/an (14 jours) 1*	35	x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	Pv Pv Pv										10	6	6	5	5	1	1	1	1
BUZZ ULTRA	Triazoles (G1)	75 %tébuconazole	1054P/B	WG	-	31-59 61-69	0,33 kg/ha	1/an	-	x	x	x														Oï	Rb			Sf				6	6	6	2	2	1	1	1	1
CAPETUS EXTRA	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	2966 8P/B	EC	-	32-59 65 32-59	1l/ha	1/an	-	x	x	x		x	x	x										Oï	Rb	Rj		Sf	Rh		Se	6	6	6	2	2	1	1	1	1
CARAMBA	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	888 3P/B	EC	-	31-59 65	15 l/ha	1/culture	35	x	x	x		x	x	x										Oï	Rb	Rj		Sf			Se	6	6	6	5	5	2	1	1	1
CARAMBA 90 EC	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	1092 2P/B	EC	-	31-59 65	2 l/ha	1/culture	35	x	x	x		x	x	x										Oï	Rb	Rj		Sf	Rh		Se	6	6	6	5	5	2	1	1	1
CARPEDIEM	Phosphonates (P07)	755 g/l phosphonates de potassium	3373 3P/B	SL	-	25-59	4 l/ha	2 (23 jours)	-	x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x			Oï	Rb			Sf				6	6	6	5	5	2	1	1	1
CELLO	Triazoles (G1) Amines (G2)	100 g/l prothioconazole 100 g/l tébuconazole 250 g/l spiroxamine	9747P/B	EC	-	31-65	125 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x														Oï	Rb	Rj	Fu	Sf				6	6	6	2	2	1	1	1	1
CELLO TRIPLE	Quin. (E1) Triazoles (G1) Amines (G2)	40 g/l proquinazide 160 g/l prothioconazole 200 g/l spiroxamine	1005 2P/B	EC	-	30-49	125 l/ha	1/culture	-	x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	Pv Pv Pv		Oï	Rb	Rj	He	Sf	Rh			10	6	6	5	5	1	1	1	1

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	fenpicoxamide	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)								Cible(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive			
										Froment		Seigle		Triticale		Epeautre		Piétin-verse	Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau		le long des fossés de bord de route, de drainage	
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps										50%	75%	90%	50%	75%	90%
CERATAVO PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	10676P/B	EC	-	31-59	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x					x	x		Oï	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	5	2	1
CHAMANE	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10211P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture	-	x	x		x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	5	2	1
CHAMANE 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	11209P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (7 jours)	35	x		x	x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	5	2	1
CHAMANE SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10903P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x	x	x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf		Se		10	6	6	10	5	1
CLARO 375 SC	Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	200 g/l azoxystrobine 175 g/l prothioconazole	30763P/B	SC	-	39-49	1 l/ha	1*	-	x										Rb	Rj	He		Rh							
						30-59		2/culture (21 jours)			x		x						Oï				Sf				6	6	6	5	2	1
						61-69		1*												Rb	Rj				Se	Fu					
COMET NEW	Strobilurines (C3)	200 g/l pyraclostrobine	10524P/B	EC	-	31-59	125 l/ha*	2/culture (28 jours)	35	x	x		x	x	x	x	x			Rb	Rj						10	6	6	10	5	1
CORRIB 250	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	33455P/B	EC	-	61-65	0,8 l/ha	2/an (14 jours)	35	x	x							Fu													
						31-65		1*		x	x	x	x						Oï		Rj		Sf		Se		10	6	6	10	5	1
						30-32		2/an (14 jours)		x	x	x	x					Pv	Oï					Rh							
						32-59																									
						30-32		1/an						x	x			Pv													
COSAVET	Composés inorganiques (gr. M02)	80 % soufre (FU)	8775P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x		Oï								6	6	6	5	1	1
COSINE	Phénylacétamides (gr. 06)	50 g/l cyflufénamide	10060P/B	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	x	x	x	x						Oï								6	6	6	5	1	1
CURBATUR	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10778P/B	EC	-	31-32	0,8 l/ha	1*	-	x								Pv													
						31-65		2/an	35		x		x		x		x		Oï		Rj		Sf		Se	Fu	6	6	6	5	2	1
						32-59																									
CYFLUMAX	Phénylacétamides (gr. 06)	50 g/l cyflufénamid	11193P/P	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	x	x	x	x	x	x	x	x		Oï								6	6	6	5	1	1
DELARO	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	175 g/l prothioconazole 150 g/l trifloxystrobine	9634P/B	SC	-	31-32	1 l/ha	2*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	Pv									6	6	6	5	2	1
						31-69		2/culture											Oï	Rb	Rj		Sf			Fu						
DIOPYR	Benzophénones (B6)	180 g/l pyriofénone	10953P/B	SC	-	30-65	0,5 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x		x	x	x				Oï								6	6	6	5	1	1
ELANZA	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	233 g/l boscalid 66 g/l difénoconazole	27813P/B	SC	-	30-59	1,5 l/ha	2/culture (14 jours) ^^	-	x	x		x	x	x				Oï								6	6	6	5	2	1
ELATUS PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	10601P/B	EC	-	31-59	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x					x	x			Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	5	2	1
													x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf	Rh	Se							
EMINENT	Triazoles (G1)	125 g/l tétraconazole	9566P/B	ME	-	31-59	1 l/ha	1/an	-	x	x	x	x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	1	1	1
EMPARTIS	Carboxamides (C2) Strobilurines (C3)	200 g/l boscalid 100 g/l krésoxym-méthyl	28572P/B	SC	-	30-32	1,5 l/ha	1/culture	-							x	x	Pv									6	6	6	1	1	1
						30-49				x	x	x	x	x	x				Oï	Rb			Sf									
						30-49													Oï	Rb												
ERA	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11078P/B	EC	-	31-61	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x								Oï		Rj				Se		6	6	6	5	2	1
						32-59						x	x						Oï	Rb				Rh								
						61-65		1*		x	x															Fu							

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	fenpico	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)								Cible(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive				
										Froment		Seigle		Triticale		Epeautre		Piétin-verse	Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Helmintho sporiose	Septoriose (feuilles)	Rhyncho sporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau		le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps										50%	75%	90%	50%	75%	90%
ERA 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	36070P/B	EC	-	31-61	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x					x	x		Oï		Rj		Sf		Se		6	6	6	5	2	1
						61-65				x	x					x	x														
						32-59					x	x	x	x	x	x	x			Rb	Rj			Rh							
EUSKATEL	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	28412P/B	EC	-	61-65	0,8 l/ha	2/an (14 jours)	35	x	x						Pv		Oï		Rj		Sf		Se		10	10	10	5	5	1
						30-32		1		x	x																				
						31-65		2/an (14 jours)		x	x																					
						32-59		2/an (14 jours)				x	x							Rb				Rh							
						30-32		1						x	x												6	6	6	5	2	1
EVORA XPRO	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	100 g/l prothioconazole 100 g/l tébuconazole 75 g/l bixafen	9970P/B	EC	-	30-32	1,25 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x						Pv		Oï		Rj		Sf				6	6	6	2	2	1
						31-59						x	x							Rb											
						31-65								x	x																
FANDANGO	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l prothioconazole 100 g/l fluxastrobine	9458P/B	EC	-	31-32	1,5 l/ha	1**	-	x	x						Pv										10	10	10	5	5	5
						31-65		2/culture (14 jours)				x	x						Oï		Rj		Sf									
						32-59								x	x					Rb				Rh							
FANDANGO PRO	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l prothioconazole 50 g/l fluxastrobine	9723P/B	EC	-	31-32	2 l/ha	1**	-	x	x						Pv										10	10	10	5	5	5
						31-59		2/culture				x	x						Oï		Rj		Sf									
						31-65								x	x					Rb				Rh							
FENPICAZOL 250 EC	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l prothioconazole 50 g/l fluxastrobine	28636P/P	EC	-	30-59	1,5 l/ha 2 l/ha	1/culture	-	x	x								Oï		Rj		He				40	30	20	10	5	2
												x	x							Rb				Rh							
FENPICOSTAR 50 EC	Picolinamides (C4)	50 g/l fenpicoxamide	36230P/P	EC	-	30-69	1,5 l/ha 2 l/ha	1 an 1 an	-	x	x					x	x						Sf				30	20	10	5	2	1
							2 l/ha	1				x	x							Rb	Rj										
														x	x					Rb											
FIRUZA	Phosphonates (P07) Triazoles (G1)	735 g/l phosphonates de potassium 50 g/l prothioconazole	34529P/B	SC	-	61-69	2 l/ha	2/an 2/culture (14 jours)	-	x	x																6	6	6	1	1	1
						30-69				x	x			x	x								Sf								
FLEXITY	Benzophénones (B6)	300 g/l métrafénone	9513P/B	SC	-	31-32	0,5 l/ha	1*	-	x	x						Pv		Oï								6	6	6	1	1	1
						31-59		2/an (21jours)		x	x	x	x	x	x	x	x			Rb	Rj	He									
FLEXURE	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	32682P/B	EC	-	31-65	1,25 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x																6	6	6	2	1	1
						31-32		1*		x	x			x	x								Sf								
						31-59		2/an (14 jours)				x	x							Rb				Rh							
						31-65								x	x											Fu					
FLOSUL	Composés inorganiques (gr. M02)	800 g/l soufre (FU)	11022P/B	SC	x	-	5 l/ha	2 (14 jours)	35	x	x																6	6	6	1	1	1
GALILEO	Triazoles (G1)	125 g/l tétraconazole	28232P/B	ME	-	31-59	1 l/ha	1 an	-	x									Oï		Rj		Sf		Se		6	6	6	1	1	1
GLOBAZTAR AZT 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l trifloxystrobine	10793P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture	-	x	x			x	x				Oï	Rb	Rj		Sf				6	6	6	2	2	1
GLOBAZTAR SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10109P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture	-	x	x			x	x				Oï	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	2	2	1
GLOB-PROMET	Triazoles (G1) Triazoles (G1)	90 g/l metconazole (cis/trans 64/36) 250 g/l prothioconazole	34593P/B	EC	-	25-69	0,5 l/ha	1 culture	35	x	x					x	x			Rb	Rj		Sf				6	6	6	1	1	1
						61-69				x	x	x	x	x	x	x	x									Fu					
						25-61						x	x																		

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	fenpico	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)								Cible(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Froment		Seigle		Triticale		Épeautre		Pilotin-verse	Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Helmintho-sporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps										50%	75%	90%	50%	75%	90%
GRETEG	Triazoles (G1)	250 g/l difénoconazole	31833P/B	EC	-	30-69	0,5 l/ha	1/culture	-	x	x					x	x			Rb	Rj						-	10	5	-	10	5
HELIX	Triazoles (G1) Amines (G2)	150 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	9806P/B	EC	-	31-32 31-59 31-65	1,25 l/ha	1* 2/an (14 jours)	-	x		x	x	x				Pv		Rb			Sf He Sf			Fu Fu	6	6	6	-	5	2	1
HELSINKI (DLU : 31-07-2025)	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	11157P/B	EC	-	31-32 31-65 32-59	0,8 l/ha	2/culture	35	x		x						Pv			Rj		Sf		Se	Fu	10	6	6	10	5	1
HERMOVIT	Composés inorganiques (gr.M02)	80 % soufre (FU)	6676P/B	WG	x	-	5 kg/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x		Oï									6	6	6	1	1	1
IMTREX (DLU : 31-10-2025)	Carboxamides (C2)	62,5 g/l fluxapyroxad	10120P/B	EC	-	30-69 31-32	2 l/ha	2/culture (21 jours) 1**	-	x	x			x	x	x	x			Rb	Rj		Sf						6	6	6	1	1	1
IMTREX EC	Carboxamides (C2)	62,5 g/l fluxapyroxad	10620P/B	EC	-	30-69 31-32	2 l/ha	2/culture (21jours) 1**	-	x	x			x	x	x	x			Rb	Rj		Sf						6	6	6	1	1	1
INNOX	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	35201P/B	EC	-	30-69 30-69 30-65	0,8 l/ha	1/culture	35	x	x			x	x					Rb	Rj		Sf						6	6	6	2	5	1
INPUT	Triazoles (G1) Amines (G2)	150 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	9718P/B	EC	-	31-32 31-59 31-65	1,25 l/ha	2 2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x			Pv		Rb			Sf He Sf	Rh		Fu Fu	6	6	6	2	5	2	1
INTER CYFLUFENAMIDE	Phénylacétamides (gr. 06)	50 g/l cyflufénamide	32532P/P	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	x	x	x	x	x	x				Oï									6	6	6	1	1	1
JADE	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	10972P/B	EC	-	32-69 65	1l/ha	1/an	-	x	x					x	x			Rb			Sf		Rh				6	6	6	1	1	1
JADE (DLU : 30-06-2026)	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	13990P/P	EC	-	32-59 65	1 l/ha	1/an	-	x	x			x	x	x	x			Rb	Rj		Sf		Rh				6	6	6	1	1	1
JESSICO ONE	Picolinamides (C4)	50 g/l fenpicoxamide	28402P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha 2 l/ha	1/an	-	x	x			x	x	x	x			Rb	Rj		Sf						30	20	10	30	20	10
JOUST	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	32908P/B	EC	-	30-69	0,8 l/ha	2/culture (14-21jours)	35	x	x									Rb	Rj		Sf		Rh				20	10	6	20	10	5
KESTREL	Triazoles (G1)	150 g/l prothioconazole 80 g/l tébuconazole	10346P/B	EC	-	30-69	125 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	Pv	Oï	Rb	Rj	He	Sf	Rh		Se	Fu	10	6	6	10	5	1

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	fenpico	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)										Cible(s)										Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive le long des cours et plans d'eau				le long des fossés de bord de route, de drainage			
										Froment		Seigle		Triticale		Epeautre		Piétin-verse	Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	50%	75%	90%	50%	75%	90%
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps																	
KEYNOTE XPRO	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu) 130 g/l prothioconazole	2090996P/B	EC	-	30-32 30-61	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x x	x x							Pv	Oï	Rb	Rj		Sf		Se	Fu	10	6	1	10	5	1
KUMULUS WG	Composés inorganiques (gr. M 02)	80 %soufre (FU)	9385P/B	WG	x	- 30-59	5 kg/ha 6 kg/ha	- 1	- 1	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x		Oï									6	6	1	1	1	1
LENVYOR	Triazoles (G1)	100 g/l méfentrifluconazole	2021042P/B	EC EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x					x	x	Pv	Oï	Rb	Rj		Sf		Se	Fu	6	6	1	2	2	1
LERAK	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	2060942P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	Pv	Oï	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	1	2	2	1
LIBRAX	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	45 g/l metconazole 62,5 g/l fluxapyroxad	2101777P/B	EC EC	- EC	25-69	2 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x					Pv	Oï	Rb	Rj		Sf	Rh	Se	Fu	6	6	1	2	2	1
LINVER 700	Composés inorganiques (gr. M 02)	700 g/l soufre	2060942P/P	SC	x	30-59	6 l/ha	2/culture (10 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x		Oï									6	6	1	1	1	1
LOSKA	Triazoles (G1) Triazoles (G1)	48 g/l metconazole (cis/trans 84/16) 100 g/l prothioconazole	3041942P/B	EC	-	30-65 55-69	1 l/ha	1/culture	35	x	x	x	x			x	x			Rb			Sf			Fu	6	6	1	2	2	1
MADISON FORTE	Triazoles (G1) Amines (G2) Strobilurine (C3)	93,3 g/l prothioconazole 107 g/l spiroxamine 80 g/l trifloxystrobine	2060502P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (21 jours)	-	x	x	x	x						Oï	Rb	Rj		Sf		Se	Fu	20	10	20	10	20	5
MADISON SUPER	Triazoles (G1) Strobilurine (C3)	175 g/l prothioconazole 150 g/l trifloxystrobine	2030966P/B	SC	-	31-32 31-69	1 l/ha 1 l/ha	1 2	-	x	x	x	x	x	x	x	x	Pv	Oï	Rb	Rj		Sf		Se	Fu	6	6	1	2	2	1
MAGANIC	Triazoles (G1) Triazoles (G1)	125 g/l difénoconazole 175 g/l prothioconazole	2030996P/B	EC	-	39-69	1 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x		Oï	Rb	Rj		Sf	Rh	Se	Fu	6	6	1	2	2	1
MAGNUM	Strobilurines (C3)	200 g/l pyraclostrobine	2101087P/B	EC	-	31-59	1,25 l/ha*	2/culture (28 jours)	35	x	x	x	x	x	x	x	x		Oï	Rb	Rj		Sf				6	6	1	2	2	1
MAXENTIS	Strobilurine (C3) Triazoles (G1)	200 g/l azoxystrobine 150 g/l prothioconazole	3030948P/B	SC	-	30-69 61-69 30-65 30-69	1 l/ha	1/culture	35	x	x	x	x	x	x	x	x			Rb			Sf				6	6	1	2	2	1
METFIN	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	2085477P/B	EC	-	65 31-59	1,5 l/ha	1/culture	35	x	x			x	x					Rb	Rj		Sf		Se	Fu	6	6	1	5	2	1
METFLAX	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	45 g/l metconazole 62,5 g/l fluxapyroxad	1291P/P	EC	-	25-69	2 l/ha	1/culture	-	x	x			x	x			Pv	Oï	Rb	Rj		Sf		Se	Fu	6	6	1	5	2	1
MICROTHIOL SPECIAL LIQUID	Composés inorganiques (gr. M 02)	825 g/l soufre (ACFU)	1092929P/B	SC	x	31-59	4,8 l/ha	2 (14 jours)	-	x	x							Pv	Oï	Rb	Rj						6	6	1	2	2	1
MIRADOR	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	2010946P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	1	2	2	1
MIRALON	Strobilurines (C3) Carboxamides (C2)	75 g/l azoxystrobine 50 g/l fluxapyroxad	3029988P/B	EC	-	30-69	2 l/ha	2/culture (21 jours)	35	x	x					x	x		Oï	Rb	Rj		Sf	Rh			6	6	1	1	1	1

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	fenpico	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)								Cible(s)										Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Froment		Seigle		Triticale		Epeautre	Piétin-verse	Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Printemps										50%	75%	90%	50%	75%	90%
MIRROR	Phthalimides (gr. M04)	500 g/l folpet	1115P/B	SC	-	30-59	1,5 l/ha	2 (14 jours)	42	x	x											Sf							6	6	6			
MIZONA	Stro bilurines (C3) Carbo xamides (C2)	200 g/l pyraclo stro bine 30 g/l fluxapyroxad	1065P/B	EC	-	30-69	1 l/ha	2/culture (21 jours)	35	x				x				Oï	Rb	Rj	He	Sf				2	2	1			
NAVURA	Triazoles (G1)	50 g/l méfentrifluconazole 100 g/l prothioconazole	2840SP/B	EC	-	30-32	1,5 l/ha	1/culture	35	x	x	x	x	x	x		Pv	Oï	Rb	Rj		Sf			Fu	6	6	1	1	1	1
						61-69				x	x	x	x	x	x																
						30-69																	Rh								
NIMAGIS	Stro bilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	2690P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x			Oï	Rb	Rj		Sf			Se	6	6	1	2	2	1
NISSODIUM	Phénylacétamides (gr. 06)	50 g/l cyflufénamide	9468P/B	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	x	x	x	x	x	x			Oï								6	6	1	1	1	1
NORIOS	Stro bilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	0907P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (7 jours)	35	x		x	x	x	x			Oï	Rb	Rj		Sf	Rh			6	6	1	5	2	1
PADELLI	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	3163P/B	EC	-	31-65	1,25 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x		Pv	Oï	Rb	Rj	He	Sf			Fu	6	6	1	5	2	1
						31-32		2/an		x	x	x	x	x	x																
						31-59					x		x		x																
						31-65																									
PANORAMA	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole 250 g/l prothioconazole	3120P/B	EC	-	25-69	0,5 l/ha	1/culture	35	x	x	x	x	x	x			Oï	Rb	Rj		Sf			Fu	6	6	1	1	1	1
						61-69				x	x	x	x	x	x																
						25-61						x	x	x	x								Rh								
PATEL 250 EC	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	0982P/B	EC	-	31-32	0,8 l/ha	1**	-	x	x						Pv	Oï	Rb	Rj		Sf		Se	Fu	6	6	1	5	2	1
						31-65		2/culture (14 jours)	35		x		x		x																
						32-59												Oï					Rh								
PATTON FLEX	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	3250P/B	EC	-	31-32	0,8 l/ha	1*	-	x	x						Pv		Rb	Rj		Sf		Se	Fu	6	6	1	2	2	1
						31-65		2/an	35				x		x			Oï													
						32-59																	Rh								
PEACOQ	Picolinamides (C4)	50 g/l fenpicoxamide	1113P/B	ZC	-	30-69	1,5 l/ha 2 l/ha	1/an	-	x	x			x	x				Rb	Rj		Sf				30	20	10	30	20	10
												x	x																		
PECARI 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	1153P/B	EC	-	31-61	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x		x		x				Oï	Rb	Rj		Sf	Rh		Se	6	6	1	5	2	1
						32-59																									
						61-65																									
PIOLI	Carboxamides (C2)	62,5 g/l fluxapyroxad	1243P/B	EC	-	31-32	2 l/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x		Pv		Rb	Rj		Sf	Rh		Fu	6	6	1	1	1	1
						30-69		2/culture (21 jours)					x		x																
PLEXEO 60	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	0724P/B	SL	-	31-59	1,5 l/ha	1/culture	35	x	x								Rb	Rj		Sf		Se		6	6	1	5	2	1
						65																			Fu						
PLEXEO 90 (DLU : 31-05-2026)	***Triazoles (G1)***	***90 g/l metconazole***	***0897P/B***	***EC***	-	***31-59***	***1 l/ha***	***1/culture***	***35***	***x***	***x***								***Rb***	***Rj***		***Sf***		***Se***		6	***6***	***1***	***5***	***2***	***1***
						65						***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***						***Rh***								
																									Fu						
POLYVERSUM	Microorganisme	Pythium oligandrum M1	1139P/B	WP	x	-	0,1kg/ha	3 (14 jours)	-	x	x														Fu	6	6	1	1	1	1

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	fenpico	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)										Cible(s)										Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Froment		Seigle		Triticale		Epeautre		Piétin-verse	Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau				le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps										50%	75%	90%	50%	75%	90%
PRABHA	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	233 g/l bixafen 100 g/l prothioconazole	3361?P/B	SC	-	30-59	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x						Pv	Oi	Rb	Rj					10	6	6	1	1	1
PRIAXOR EC	Strobilurines (C3) Carboxamides (C2)	150 g/l pyraclostrobine 75 g/l fluxapyroxad	D616P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (21jours)	-	x	x	x	x			x	x		Oi	Rb	Rj	He	Sf		Se		30	20	10	10	5	2
						30-32		1**		x	x			x	x																		
PRIDE	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	0?95P/B	EC	-	31-32	0,8 l/ha	1**	-	x	x							Pv	Pv								6	6	6	5	2	1
						31-65		2/culture (14 jours)	35			x	x						Oi	Rb	Rj	He	Sf		Se	Fu						
						32-59						x	x					Pv	Oi					Rh									
PRINCE	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	0?28P/B	EC	-	31-32	0,8 l/ha	1**	-																		6	6	6	5	2	1
						31-65		2/culture (14 jours)	35	x	x								Oi	Rb	Rj	He	Sf		Se	Fu						
						32-59						x	x											Rh									
PRIORI ERA 350 SC	Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	200 g/l azoxystrobine 150 g/l prothioconazole	3607?P/B	SC	-	61-69	1 l/ha	1/culture	35	x	x															Fu	6	6	6	5	2	1
						30-69						x	x						Oi	Rb	Rj		Sf		Se							
						30-65								x	x									Rh									
						30-69										x	x																
PROCER 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	1159P/B	EC	-	31-61	0,65 l/ha	2/culture	35	x	x								Oi	Rb						Fu	6	6	6	5	2	1
						32-59						x	x										Sf		Se							
						61-65																		Rh									
PROCER XTRA	Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	140 g/l azoxystrobine 100 g/l prothioconazole	3095?P/B	EC	-	59-69	1,4 l/ha	1	44	x	x															Fu	10	6	6	5	1	1
						31-59		2 (21jours)		x	x	x	x						Oi	Rb	Rj	He	Sf		Se							
						31-52																		Rh									
PROFIAZ 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	1035P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x		Oi	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	2	1	1
PROLINE	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	9805P/B	EC	-	31-32	0,8 l/ha	1*	-	x	x							Pv									6	6	6	2	2	1
						31-65		2/an	35			x	x						Oi		Rj		Sf		Se	Fu						
						32-59								x	x									Rh									
PROMINO 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	1153P/B	EC	-	31-61	0,65 l/ha	2/culture	35	x	x								Oi	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	5	2	1
						32-59						x	x											Rh									
						61-65										x	x									Fu							
PROMINO XTRA	Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	140 g/l azoxystrobine 100 g/l prothioconazole	2897?P/B	EC	-	31-59	1,4 l/ha	2/culture (14-21jours) 1 2/culture (14-21jours)	44	x	x								Oi	Rb	Rj		Sf		Se		10	6	6	10	5	1
						59-69				x	x															Fu						
						31-59						x	x							Rb				Rh	Se								
						31-52								x	x					Rb		He		Rh	Se								
PROPERTY 100 SC	Benzophénones (B6)	100 g/l pyriofénone	1033?P/B	SC	-	30-65	0,5 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x		Oi								6	6	6	1	1	1
PROSARO	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	9515P/B	EC	-	32-59	1 l/ha	1/an	-	x	x								Oi	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	2	2	1
						65				x	x															Fu						

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	fenpico	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)														Cible(s)										Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive									
										Froment			Seigle			Triticale			Epeautre				Pietin-verse	Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau				le long des fossés de bord de route, de drainage			
										Hiver	Printemps		Hiver	Printemps		Hiver	Printemps		Hiver	Printemps													50%	75%	90%		50%	75%	90%	
PROTENDO 250 EC	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10930P/B	EC	-	31-32 31-65 32-59	0,8 l/ha	1** 2/culture (14 jours)	-	x						x	x		x	x			Pv		Oï	Rj		Sf		Se	Fu	6	6	6		1	2	5	
PROTENDO 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11112P/B	EC	-	31-61 32-59 61-65	0,65 l/ha	2/culture (14 jours) 1**	35	x						x	x		x	x					Oï Oï	Rb Rj		Sf		Se		6	6	6		1	2	5	
PROTENDO EXTRA	Triazoles (G1) Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	11123P/B	EC	-	32-59 65 32-59 65 32-59 65	1l/ha	1/an	-	x			x	x		x	x		x	x					Oï Oï	Rb Rj		Sf Sf		Se Se	Fu Fu	6	6	6		1	2	5	
PROTHIO 250 EC (DLU : 30-06-2026)	***Triazoles (G1)***	***250 g/l prothioconazole***	***2694P/P***	***EC***	-	***31-65*** ***31-32*** ***32-59***	***0,8 l/ha***	***2/culture (14 jours)*** ***1°*** ***2/culture (14 jours)***	***35*** - ***35***	***x*** ***x***				***x***	***x***									***Oï***	***Rj***		***Sf***	***Rh***		***Se Fu***	***6*** ***6*** ***6***	***6*** ***6*** ***6***	***6*** ***6*** ***6***		***1*** ***2*** ***5***	***2*** ***5*** ***10***	***5*** ***10*** ***20***	
PROTIOBELCO 250 EC (DLU : 31-07-2025)	***Triazoles (G1)***	***250 g/l prothioconazole***	***5247P/P***	***EC***	-	***31-65*** ***31-32*** ***32-59***	***0,8 l/ha***	***2/culture*** ***2/culture (14 jours)***	- ***35***	***x*** ***x***				***x***	***x***									***Oï***	***Rj***		***Sf***	***Rh***		***Se Fu***	***6*** ***6***	***6*** ***6***	***6*** ***6***		***1*** ***5***	***2*** ***10***	***5*** ***20***	
PROTIOSTAR	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	11116P/B	EC	-	31-32 32-59 31-61 59-61	0,8 l/ha	3/culture	35	x			x	x		x	x						Pv	Oï	Rj		Sf			Fu	6	10	20		5	10	20	
PYGMALION	Phosphonates (P07)	755 g/l phosphonates de potassium	29013P/B	SL	-	25-59	4 l/ha	2 (23 jours)	-	x			x	x		x	x														6	6	6		2	5	10	
PYLON	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	31508P/B	EC	-	31-32 31-65 32-59	0,8 l/ha	2/an	- 35	x						x	x						Pv		Oï	Rj		Sf		Se	Fu	6	6	6		2	5	10	
PYRACLO 200 (DLU : 30-06-2025)	***Strobilurines (C3)***	***200 g/l pyraclostrobine***	***1392P/P***	***EC***	-	***31-59***	***1,25 l/ha****	***2/culture (28 jours)***	***35***	***x***	***x***					***x***	***x***		***x***	***x***						***Rb***	***Rj***						***6***	***6***	***6***		***2***	***5***	***10***	
PYRACLO 200	Strobilurine (C3)	200 g/l pyraclostrobine	32664P/P	EC	-	31-59	1,25 l/ha	2/culture (28 jours)	35	x	x					x	x		x	x						Rb	Rj						6	6	6		1	2	5	
QUADRIS GOLD	Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	125 g/l azoxystrobine 125 g/l difénoconazole	10900P/B	SC	-	30-69	1l/ha	1	-	x	x					x	x		x	x						Rb	Rj		Sf				10	6	10		1	5	10	
QUESTAR	Picolinamides (C4)	50 g/l fenpicoxamide	11076P/B	EC	-	30-69	15 l/ha 2 l/ha	1/an	-	x	x		x	x		x	x		x	x						Rb	Rj		Sf				30	20	30		10	20	30	
REMOCCO 60	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	12255P/B	EC	-	31-59 65	15 l/ha	1/culture	35	x	x					x	x									Rb	Rj		Sf		Se	Fu	6	6	6		1	2	5	

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	fenpico	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)								Cible(s)									Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive				
										Froment		Seigle		Triticale		Epeautre		Pleiin-verse	Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage	
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps										50%	75%	90%	50%	75%	90%
REVYFLEX TRIO	Triazoles (G1) Benzophénones (B6) Strobilurines (C3)	66,6 g/l méfentrifluconazole 100 g/l métrafénone 80 g/l pyraclostrobine	3142 6P/B	EC	-	30-32	1,5 l/ha	2/culture	-	x	x					x	x	Pv	Oi	Rb	Rj		Sf				6	6	6	5	2	1
						30-59		2/culture (14 jours)	56			x	x									He										
REVYSTAR GOLD	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	100 g/l méfentrifluconazole 50 g/l fluxapyroxad	10085P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x			x	x	x	x		Oi	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	1	1	1
												x	x											Rh							
REVYTREX	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	66,7 g/l méfentrifluconazole 66,7 g/l fluxapyroxad	10089P/B ; 13769P/P ; 24963P/P ; 29665P/P	EC	-	30-69	1,125 l/ha 1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x			x	x	x	x		Oi	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	5	2	1
												x	x											Rh							
REVYTREX (DLU : 15-04-2025)	*Triazoles (G1)* *Carboxamides (C2)*	*66,7 g/l méfentrifluconazole* *66,7 g/l fluxapyroxad*	*24963 P/P*	*EC*	*-*	*30-69*	*1,125 l/ha* *1,5 l/ha*	*2/culture (14 jours)*	*35*	*x*	*x*			*x*	*x*	*x*	*x*		*Oi*	*Rb*	*Rj*		*Sf*		*Se*		*6*	*6*	*6*	*5*	*2*	*1*
												x	*x*											*Rh*							
RIVIOR (DLU : 30-09-2026)	*Triazoles (G1)*	*125 g/l tétraconazole*	*11156P/B*	*ME*	*-*	*31-59*	*1 l/ha*	*1/an*	*-*	*x*									*Oi*	*Rb*	*Rj*		*Sf*		*Se*		*6*	*6*	*6*	*1*	*1*	*1*
RIZA EC	Triazoles (G1)	200 g/l tébuconazole	10665P/B	EC	-	30-59	1,25 l/ha	1/culture	-	x	x		x	x					Oi	Rb	Rj				Se		6	6	6	5	2	1
SAKURA	Triazoles (G1)	167 g/l bromuconazole 117 g/l tébuconazole	10683P/B	EC	-	30-69	1,2 l/ha	1/culture	-	x	x		x	x	x	x	x		Oi	Rb			Sf			Fu	6	6	6	1	1	1
SESTO ONE	Phthalimides (gr. M04)	500 g/l folpet	11588P/B	SC	-	30-59	1,5 l/ha	2 (14 jours)	42	x	x			x	x	x	x	Pv									6	6	6	2	2	1
SILTRA XPRO	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	200 g/l prothioconazole 60 g/l bixafen	10375P/B	EC	-	30-32	1l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x		x	x	x	x	x		Oi	Rb				Rh			6	6	6	5	2	1
						31-59																	Fu								
						31-65																										
SILVRON XPRO	Carboxamides (C2)	100 g/l bixafen 100 g/l fluopyram (FU)	12224P/B	EC	-	30-61	1,25 l/ha	1/culture	-	x	x		x	x	x	x	x			Rb				Rh			6	6	6	2	2	1
SIMVERIS	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10817P/B	EC	-	31-59	1l/ha	1/culture	35	x	x		x	x	x	x	x		Oi	Rb			Sf		Se		6	6	6	5	2	1
						65				x	x															Fu						
SINSTAR	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10441P/B	SC	-	32-59	1l/ha	2/culture	-	x									Oi	Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	2	2	1
SIRENA	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	10420P/B	SL	-	31-59	1,5 l/ha	1/culture	35	x				x		x				Rb	Rj		Sf		Se		6	6	6	5	2	1
						65				x																Fu						
SKYWAY XPRO	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	100 g/l prothioconazole 100 g/l tébuconazole 75 g/l bixafen	9972P/B	EC	-	30-32	1,25 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x			x	x	x	x	Pv									6	6	6	2	2	1
						31-59						x	x						Oi	Rb				Rh								
						31-65								x	x	x	x				Rj	He	Sf			Fu						
SLIPSTREAM	Triazoles (G1) Triazoles (G1)	90 g/l metconazole (cis/trans 84/16) 250 g/l prothioconazole	35595P/B	EC	-	61-69	0,5 l/ha	1/culture	35	x	x	x	x	x	x	x	x	Fu									6	6	6	1	1	1
						25-69				x	x	x	x							Rb	Rj		Sf								
						25-61						x	x	x	x	x	x							Rh							

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	fenpico	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)								Cible(s)									Pliétin-verse	Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive			
										Froment		Seigle		Triticale		Epeautre		Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose		le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Printemps	Hiver														
																												50%	75%	90%	90%
SMARAGD	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	10029P/B	EC	-	32-59	1 l/ha	1/an	-	x	x					x	x	Oï	Rb	Rj		Sf		Se			6	6	1	1
						65				x	x	x	x	x	x	x	x								Fu					
SOLAGOLD FORTE	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	150 g/l prothioconazole 75 g/l benzovindiflupyr	12777P/P ; 29358T/P	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x					x	x	Oï	Rb	Rj		Sf	Rh		Fu		5	6	1	1
										x	x	x	x			x	x													
SOLEIL	Triazoles (G1)	167 g/l bromuconazole 107 g/l tébuconazole	10369P/B	EC	-	30-69	1,2 l/ha	1/culture	-	x	x			x	x	x	x	Oï	Rb	Rj		Sf	Rh	Se	Fu		1	6	1	1
SORATEL	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	32284P/B	EC	-	30-69	0,8 l/ha	1/culture	35	x	x					x	x	Oï	Rb	Rj		Sf		Se	Fu		5	6	1	1
						30-65				x	x	x	x			x	x													
						30-69								x	x															
STAVENTO	Phthalimides (gr. M 04)	500 g/l folpet	11114P/B	SC	-	30-59	1,5 l/ha	2 (14 jours)	42	x	x																2	6	2	1
TALENDO	Quinazolinones (E1)	200 g/l proquinazide	11048P/B	EC	-	25-65	0,25 l/ha	2 (14 jours)	-	x	x					x	x	Oï									2	6	2	1
						25-49						x	x	x	x			Oï												
TARCZA 250 EW	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	10236P/B	EW	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x			x	x			Oï	Rb	Rj		Sf		Se			5	6	1	1
TARTAROS 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11254P/B	EC	-	31-61	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x							Oï									5	6	1	1
						61-65		2/culture (14 jours)				x	x																	
						32-59																								
TEBUCONAZOR 250	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	28842P/P	EW	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x			x	x			Oï	Rb	Rj		Sf		Se			5	6	1	1
TEBUCUR 250 EW	Triazoles (G1)	251g/l tébuconazole	10172P/B	EW	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x					x	x		Rb	Rj					Fu		5	6	1	1
						61-69						x	x	x	x															
TEBUPHYT	Triazoles (G1)	254 g/l tébuconazole	10155P/P	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x			x	x	x	x	Oï	Rb	Rj		Sf		Se			1	6	1	1
TEBUSHA	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	10766P/B	EW	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x			x	x	x	x	Oï	Rb	Rj		Sf		Se			5	6	1	1
TEBUSIP	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	9766P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x			x	x	x	x	Oï	Rb	Rj		Sf		Se			1	6	1	1
TEKO 250	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	33453P/B	EC	-	31-65	0,8 l/ha	2/an (14 jours)	35	x	x							Oï		Rj		Sf		Se			10	6	5	1
						30-32		1*											Pv											
						61-65		2/an (14 jours)		x	x	x	x																	
						32-59																			Fu					
						30-32		1/an										Oï					Rh				5	6	2	1
TELESCOPE	Triazoles (G1) Triazoles (G1)	100 g/l diféconazole 54 g/l metconazole (cis/trans 84/16)	32601P/B	EC	-	31-61	0,75 l/ha	2/culture (21 jours)	42	x	x			x	x	x	x			Rj		Sf					-	10	6	5
						61		1				x	x												Fu					
TESANTO	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	11250P/B	EC	-	31-59	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x					x	x		Rb	Rj		Sf	Rh	Se			6	6	2	1

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	fenpico	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)												Cible(s)												Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive									
										Froment		Seigle		Triticale		Epeautre																		le long des cours et plans d'eau				le long des fossés de bord de route, de drainage			
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Piétin-verse	Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose						50%	75%	90%	50%	75%	90%			
TETRACONAZOL 125 (DLU : 30-06-2026)	Triazoles (G1)	125 g/l tétraconazole	24564 P/P	ME	-	31-59	1 l/ha	1/an	-	x									Oï	Rb	Rj		Sf		Se						6	6	6	10	10	10			
TETRACONAZOL 125	Triazoles (G1)	125 g/l tétraconazole	36489P/P	ME	-	31-59	1l/ha	1/an	-	x	x	x	x						Oï	Rb	Rj		Sf		Se						6	6	6	10	10	10	1	1	1
THIOVIT JET	Composés inorganiques (gr. M02)	80 % soufre (FU)	5700P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x	x	x						Oï												6	6	6	10	10	10	1	1	1
TUBERI	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l benzovindiflupyr 150 g/l prothioconazole	32677P/P	EC	-	31-59	1l/ha	1/culture	-										Oï	Rb	Rj		Sf		Se		Fu				6	6	6	10	10	10	1	2	1
TURRET 60	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	10923P/B	SL	-	31-59	15 l/ha	1/culture	35										Oï	Rb	Rj		Sf		Se		Fu				6	6	6	10	10	10	1	2	1
						65																																			
TURRET 90 (DLU : 31-05-2026)	*Triazoles (G1)*	*90 g/l metconazole*	*0898P/B*	*EC*	*-*	*31-59*	*1l/ha*	*1/culture*	*35*					*x*	*x*	*x*	*x*		*Oï*	*Rb*	*Rj*		*Sf*		*Se*						*6*	*6*	*6*	*10*	*10*	*10*	*1*	*2*	*1*
						65								*x*	*x*	*x*	*x*			*Rb*				*Rh*																
ULTRALINE (DLU : 31-07-2025)	*Triazoles (G1)*	*250 g/l prothioconazole*	*10095P/B*	*EC*	*-*	*31-32*	*0,8 l/ha*	*1*** *2 circulations (14 jours)*	*-*	*x*								*Pv*																						
						31-65				*x*									*Oï*		*Rj*				*Se*		*Fu*				*10*	*6*	*6*	*20*	*20*	*20*	*1*	*5*	*1*
						32-59			*35*			*x*	*x*										Sf			*Rh*													
UNIVOQ	Triazoles (G1)	50 g/l fenpicoxamid 100 g/l prothioconazole	11179P/B	EC	-	30-59	15 l/ha 2 l/ha	1/culture	-	x	x			x	x	x	x		Oï	Rb	Rj	He			Se	Fu					40	30	20	40	30	20			
																				Rb	Rj				Rh	Fu					6	6	6	10	6	6			
VALPURA XPRO	Carboxamides (C2)	125 g/l bixafen	10873P/B	EC	-	30-69	1l/ha	1/culture	35	x	x			x	x	x	x		Oï	Rb	Rj		Sf								6	6	6	10	10	10	2	2	1
VARIANO XPRO	Carboxamides (C2) Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	40 g/l bixafen 50 g/l fluoxastrobine 100 g/l prothioconazole	10327P/B	EC	-	30-61	175 l/ha	2/an (14 jours)	-	x									Oï												6	6	6	10	10	10	1	2	1
						30-69				x		x		x	x	x	x			Rb										6	6	6	10	10	10	1	2	1
VEGAS PLUS	Amines (G2)	12,5 g/l cyflufénamid 312,5 g/l spiroxamine	29866P/B	EC	-	30-55	0,8 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x						Oï												6	6	6	10	10	10	1	1	1
						25-29	0,48 l/ha			x	x	x	x																											
						30-49	0,8 l/ha			x	x	x	x						Oï												6	6	6	10	10	10	1	1	1
VELDIG XPRO	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu) 130 g/l prothioconazole	10960P/B	EC	-	30-32	15 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x					Pv																						
						30-61													Oï	Rb	Rj	He	Sf		Se	Fu					10	6	6	20	20	20	1	5	1
																				Rb	Rj				Rh													
																						He	Sf			Fu												
VELOGY ERA	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	150 g/l prothioconazole 75 g/l benzovindiflupyr	10602P/B	EC	-	31-59	1l/ha	1/culture	-	x	x															Se	Fu				6	6	6	10	10	10	1	2	1
																				Rb	Rj				Rh													
																							Sf		Se													
VELOGY PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	28569P/B	EC	-	31-45	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x								Oï	Rb	Rj		Sf		Se						6	6	6	10	10	10	1	2	1
						31-59																																	

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	fenpico	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)								Cible(s)									Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive				
										Froment		Seigle		Triticale		Épeautre		Piétin-verse	Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau				le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps										50%	75%	90%	50%	75%	90%
VERBEN	Transduction du signal (E1) Triazoles (G1)	50 g/l proquinazide 200 g/l prothioconazole	1226P/B	EC	-	25-32 25-65 25-49 61-65	1 l/ha	1 culture	-	x	x		x	x	x	x	x	PV	Oï	Rb	Rj	He	Sf		Rh			6	6	2	5	6	1
VERTAZA	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	32689P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x					x	x		Oï	Rb	Rj		Sf			Se		6	6	2	2	2	1
VERTIPIN	Composés inorganiques (gr. M02)	700 g/l soufre (FU)	1092P/B	SC	x	30-59	6 l/ha	2/culture (10 jours)	-	x				x	x	x	x		Oï			He	Sf					6	6	1	1	1	1
VERYDOR	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	100 g/l méfentrifluconazole 50 g/l fluxapyroxad	1103P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x		x	x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf		Rh	Se		6	6	1	1	1	1
VIRID 250 EC	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	30762P/B	EC	-	31-65 31-32 32-59	0,8 l/ha	2/culture (21 à 24 jours) 1	35 -	x	x							Pv	Oï									6	6	2	5	6	1
								2/culture (21 à 28 jours)	35			x							Oï					Rh									
VSM CYFLUFENAMID E 50 EW (DLU : 30-09-2025)	*Phénylacétamides (gr*	*50 g/l cyflufénamide*	*1220P/P*	*EW*	*-*	*31-59*	*0,5 l/ha*	*2*	*-*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*		*Oï*									*6*	*6*	*6*	*1*	*1*	*1*
VSM TEBUCO (DLU : 28-02-2026)	*Triazoles (G1)*	*250 g/l tébuconazole*	*4312P/P*	*EC*	*-*	*31-59*	*1 l/ha*	*1/culture*	*-*	*x*	*x*			*x*	*x*	*x*	*x*		*Oï*	*Rb*	*Rj*		*Sf*			*Se*		*6*	*6*	*6*	*1*	*1*	*1*
WOPRO AMOXIS 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	32286P/P	SC	-	32-59	1 l/ha	2 (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf			Se		6	6	1	1	1	1
XENIAL	Triazoles (G1) Benzophénones (B6) Strobilurines (C3)	66,6 g/l méfentrifluconazole 100 g/l métrafénone 80 g/l pyraclostrobine	35739P/B	EC	-	30-32	1,5 l/ha	1	-	x	x							Pv										6	6	2	5	6	1
						30-59		2/culture (14 jours)	56	x	x					x	x		Oï	Rb	Rj	He	Sf		Rh								
ZOXIS	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10044P/B	SC	-	31-59	1 l/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x				Oï	Rb	Rj		Sf			Se		6	6	1	1	1	1
ZOXIS 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10684P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (7j/ours)	35		x	x	x	x	x				Oï	Rb	Rj				Rh			6	6	1	1	1	1

Fongicides autorisés en avoine (3/3) (màj : 17-01-2025)

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Cult.	Cible(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
																			le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Avoine	Pietin-verse	Oïdium	Rouilles			Helmintho-sporiose	Fusariose	Rhyncho-sporiose						
										Printemps / Hiver			Brune	Jaune	Couronnée des graminées				50%	75%	90%	50%	75%	90%
AMISTAR PRIME	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	250 g/l prothioconazole 125 g/l azoxystrobine	3345 4P/B	EC	-	30-59	1 l/ha	1	-	x		Oï							40	30	20	40	30	20
ANGLE	Triazoles (G1)	125 g/l difénoconazole	1139 P/B	SC	-	30-51	1 l/ha	1	-	x				Rj				Rh	10	6	6	10	5	1
ARTINA (DLU : 31-05-2026)	***Triazoles (G1)***	***90 g/l metconazole***	***10896P/B***	***EC***	-	***31-59***	***1 l/ha***	***1/culture***	***35***	***x***	***x***				***Rc***				***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***
ASCRA XPRO	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu) 130 g/l prothioconazole	10783P/B	EC	-	30-61	1.2 l/ha	1/culture	-	x	x	Oï			Rc				10	6	6	10	5	1
AVIATOR XPRO	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l bixafen 150 g/l prothioconazole	9994P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	Oï			Rc				6	6	6	2	2	1
AZBANY	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10640P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	Oï			Rc				6	6	6	1	1	1
BALAYA	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l mefentrifluconazole 100 g/l pyraclostrobine	11063P/B ; 24959P/P	EC	-	30-69	1.5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x	Oï			Rc				6	6	6	2	2	1
BALAYA (DLU : 31-01-2025)	***Triazoles (G1) Strobilurines (C3)***	***100 g/l mefentrifluconazole 100 g/l pyraclostrobine***	***11395P/P***	***EC***	-	***30-69***	***1,5 l/ha***	***2/culture (14 jours)***	***35***	***x***	***x***	***Oï***			***Rc***				***6***	***6***	***6***	***2***	***2***	***1***
BICANTA	Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	125 g/l azoxystrobine 125 g/l difénoconazole	10894P/B	SC	-	30-69	1 l/ha	1	-	x	x			Rb	Rj			Rh	10	6	6	10	5	1
BIOSOON 80 WG (DLU : 15-04-2026)	***Composés inorganiques (gr. M02)***	***80% soufre (FU)***	***12522P/P***	***WG***	***x***	-	***5 kg/ha***	-	-	***x***	***x***	***Oï***							***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
BIXAZOR EXTRA	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyrame 130 g/l prothioconazole	24766P/P	EC	-	30-61	1.2 l/ha	1/culture	-	x	x	Oï			Rc				10	6	6	10	5	1
CAPETUS EXTRA	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	29668P/B	EC	-	32-59	1 l/ha	1 an	-	x		Oï			Rc				6	6	6	2	2	1
CARAMBA 90 EC	Triazoles (G1)	90 g/l métconazole	10922P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x				Rc				6	6	6	5	2	1
CELLO	Triazoles (G1) Amines (G2) Triazoles (G1)	300 g/l tébuconazole 250 g/l spiro xamine 100 g/l prothioconazole	9747P/B	EC	-	31-59	1.25 l/ha	2/culture	-	x	x	Oï			Rc				6	6	6	2	2	1
CERATAVOP LUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	10676P/B	EC	-	31-59	0,75 l/ha	3/culture	-	x	x				Rc				6	6	6	5	2	1
COMET NEW	Strobilurines (C3)	200 g/l pyraclostrobine	10524P/B	EC	-	31-59	1.25 l/ha*	2 (28 jours)	35	x	x				Rc				6	6	6	5	2	1
COSAVET	Composés inorganiques (gr. M02)	80% soufre (FU)	8775P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x	Oï							6	6	6	1	1	1
DELARO	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	175 g/l prothioconazole 150 g/l trifloxystrobine	9634P/B	SC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x	Oï			Rc				6	6	6	2	2	1
DIOPYR	Benzophénones (B6)	380 g/l pyriofénone	10953P/B	SC	-	30-49	0,5 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	Oï							6	6	6	1	1	1
ELATUS PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	10603P/B	EC	-	31-59	0,75 l/ha	3/culture	-	x	x				Rc				6	6	6	5	2	1
ERA 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	3607 0P/B	EC	-	31-59	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x	Oï			Rc				6	6	6	5	2	1
EVORA XPRO	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l bixafen 100 g/l prothioconazole 100 g/l tebuconazole	9970P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	Oï			Rc				6	6	6	2	2	1
FANDANGO PRO	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l prothioconazole 50 g/l fluoxastrobine	9723P/B	EC	-	31-59	2 l/ha	2/culture	-	x	x	Oï			Rc				20	10	6	20	10	5
FLEXURE	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiro xamine	32682P/B	EC	-	31-32 31-59	1.25 l/ha	1* 2/an (14 jours)	-	x	x	P v			Rc				6	6	6	5	2	1
FLOSUL	Composés inorganiques (gr. M02)	800 g/l soufre (FU)	11222P/B	SC	x	-	5 l/ha	2 (14 jours)	35	x	x	Oï							6	6	6	1	1	1
GLOB-P ROMET	Triazoles (G1) Triazoles (G1)	90 g/l metconazole (cis/trans 84/16) 250 g/l prothioconazole	34593P/B	EC	-	61-69	0,5 l/ha	3/culture	35	x	x					Fu			6	6	6	1	1	1
HELIX	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiro xamine	9806P/B	EC	-	31-59 31-32	1.25 l/ha	2/an (14 jours) 1*	-	x x	x x	Oï			Rc				6	6	6	5	2	1
HERMOVIT	Composés inorganiques (gr. M02)	80% soufre (FU)	6678P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x	Oï							6	6	6	1	1	1

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH		Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Cult.		Cible(s)						Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
											Avoine		Piétin-verse	Oïdium	Rouilles			Helmintho-sporiose	Fusariose	Rhyncho-sporiose	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
											Hiver	Printemps			Brune	Jaune	Couronne des graminées				50%	75%	90%	50%	75%	90%
IMTREX (DLU : 31-10-2025)	***Carboxamides (C2)***	***62,5 g/l fluxapyroxad***	***1020P/B***	***EC***	***-***	***30-69***	***31-32***	***2 l/ha***	***2/culture (21 jours) 1*****	***-***	***x***	***x***	***Pv***				***Rc***				***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
IMTREX EC	Carboxamides (C2)	62,5 g/l fluxapyroxad	1062 0P/B	EC	-	30-69	31-32	2 l/ha	2/culture (21jours) 1**	-	x	x	Pv				Rc				6	6	6	1	1	1
INPUT	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	9739P/B	EC	-	31-59	31-32	1,25 l/ha	2/an (14 jours) 2	-	x	x	Pv	Oï			Rc				6	6	6	5	2	1
JADE	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	1097 2P/B	EC	-	32-59		1 l/ha	1/an	-	x	x		Oï			Rc				6	6	6	1	1	1
JADE (DLU : 30-06-2026)	***Triazoles (G1)***	***125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole***	***1390P/P***	***EC***	***-***	***32-59***		***1 l/ha***	***1/an***	***-***	***x***	***x***		***Oï***			***Rc***				***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
JOUST	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	32908P/B	EC	-	30-61		0,6 l/ha	2/culture (14-21 jours)	35	x	x					Rc				20	10	6	20	10	5
KESTREL	Triazoles (G1)	160 g/l prothioconazole 80 g/l tébuconazole	1034 6P/B	EC	-	30-61		1,25 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	Pv	Oï			Rc		Fu		10	6	6	10	5	1
KEYNOTE XPRO	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu) 130 g/l prothioconazole	1099 6P/B	EC	-	30-61		1,2 l/ha	1/culture	-	x	x		Oï			Rc				10	6	6	10	5	1
KUMULUS WG	Composés inorganiques (gr. M02)	80% soufre (FU)	9185P/B	WG	x	-		5 kg/ha	-	-	x	x		Oï							6	6	6	1	1	1
LENNYOR	Triazoles (G1)	100 g/l mefentrifluconazole	1014 7P/B	EC	-	30-69		1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x		Oï			Rc				6	6	6	2	2	1
LINVER 700	Composés inorganiques (gr. M02)	700 g/l soufre	3621 8P/P	SC	x	30-59		6 l/ha	2/culture (10 jours)	-	x	x		Oï							6	6	6	1	1	1
MADISON SUPER	Triazoles (G1) Strobilurine (C3)	175 g/l prothioconazole 150 g/l trifloxystrobine	3096 6P/B	SC	-	31-59		1 l/ha	1	35	x	x		Oï			Rc				6	6	6	2	2	1
MAGNUM	Strobilurines (C3)	200 g/l pyraclostrobine	1087 P/B	EC	-	31-59		1,25 l/ha*	2/culture (28 jours)	35	x	x					Rc				6	6	6	5	2	1
MIRALON	Strobilurines (C3) Carbo.	75 g/l azoxystrobine 50 g/l fluxapyroxad	3299 8P/B	EC	-	30-69		2 l/ha	2/culture (21 jours)	35	x	x		Oï			Rc				6	6	6	1	1	1
PADELLI	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	3161 P/B	EC	-	31-32	31-59	1,25 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	Pv	Oï			Rc				6	6	6	5	2	1
PANORAMA	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole 250 g/l prothioconazole	3122 0P/B	EC	-	61-69		0,5 l/ha	1/culture	35	x	x							Fu		6	6	6	1	1	1
PATEL 250 EC	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	1098 2P/B	EC	-	30-32	31-49	0,8 l/ha	1** 2/culture (14 jours)	-	x	x	Pv	Oï				He		Rh	6	6	6	5	2	1
PECARI 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	1065 3P/B	EC	-	31-59		0,65 l/ha	2/culture	35	x	x		Oï			Rc				6	6	6	5	2	1
PIOLI	Carboxamides (C2)	62,5 g/l fluxapyroxad	1224 3P/B	EC	-	31-32	30-69	2 l/ha	2/culture 21jours	-	x	x	Pv				Rc				6	6	6	1	1	1
PLEXEO 90 (DLU : 31-05-2026)	***Triazoles (G1)***	***90 g/l metconazole***	***1089 7P/B***	***EC***	***-***	***31-59***		***1 l/ha***	***1/culture***	***35***	***x***	***x***					***Rc***				***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***
PRIAXOR EC	Strobilurines (C3) Carboxamides (C2)	150 g/l pyraclostrobine 75 g/l fluxapyroxad	1061 6P/B	EC	-	30-59	30-32	1,5 l/ha	2/culture (21jours) 1**	-	x	x	Pv	Oï			Rc				30	20	10	30	20	10
PROPERTY 180 SC	Benzophénones (B6)	180 g/l pyriofénone	1033 9P/B	SC	-	30-49		0,5 l/ha	2 /culture (14 jours)	-	x	x		Oï							6	6	6	1	1	1
PROSARO	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	965 P/B	EC	-	32-59		1 l/ha	1/an	-	x	x		Oï			Rc				6	6	6	2	2	1
PROTENDO 250 EC	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	1093 0P/B	EC	-	30-32	31-49	0,8 l/ha	1 2/culture (14 jours)	-	x	x	Pv							Rh	6	6	6	5	2	1
PROTENDO 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	1113 P/B	EC	-	31-59		0,65 l/ha	2/culture	-	x	x		Oï			Rc				6	6	6	5	2	1
PROTENDO EXTRA	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	1223 P/B	EC	-	32-59		1 l/ha	1/an	-	x	x		Oï			Rc				6	6	6	2	2	1

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Cult.		Cible(s)							Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Avoine		Piétin-verse	Oïdium	Rouilles			Helminthosporiose	Fusariose	Rhynchosporiose	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemps			Brune	Jaune	Couronnée des graminées				50%	75%	90%	50%	75%	90%
PYRACLO 200 (DLU : 30-06-2025)	***Strobilurines (C3)***	***200 g/l pyraclostrobine***	***1392P/P***	***EC***	***-***	***31-59***	***1,25 l/ha***	***2/ culture (28 jours)***	***-***	***x***	***x***		***Oï***			***Rc***				***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***
PYRACLO 200	Strobilurine (C3)	200 g/l pyraclostrobine	32664P/P	EC	-	31-59	1,25 l/ha	2/culture (28 jours)	35	x	x					Rc				6	6	6	5	2	1
QUADRIS GOLD	Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	225 g/l azoxystrobine 225 g/l difénoconazole	10900P/B	SC	-	30-51	1 l/ha	1	35	x	x			Rb	Rj				Rh	10	6	6	10	5	1
REVYFLEX TRIO	Triazoles (G1) Benzophénones (B6) Strobilurines (C3)	66,6 g/l mefentrifluconazole 100 g/l métrafénone 80 g/l pyraclostrobine	31426P/B	EC	-	30-59	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	56	x	x		Oï			Rc				6	6	6	5	2	1
REVYSTAR GOLD	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	50g fluxapyroxad 100 g/l mefentrifluconazole	11085P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x		Oï			Rc				6	6	6	1	1	1
REVYTREX	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	66,7 g/l fluxapyroxad 66,7 g/l mefentrifluconazole	10889P/B ; 13768P/P ; 29665P/P	EC	-	30-69	1,25 l/ha	2 (14 jours)	35	x	x		Oï							6	6	6	5	2	1
REVYTREX (DLU : 15-04-2025)	***Carboxamides (C2) Triazoles (G1)***	***66,7 g/l fluxapyroxad 66,7 g/l mefentrifluconazole***	***24963P/P***	***EC***	***-***	***30-69***	***1,25 l/ha***	***2 (14 jours)***	***35***	***x***	***x***		***Oï***							***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***
RIZA EC	Triazoles (G1)	200 g/l tébuconazole	10665P/B	EC	-	31-45	1,25 l/ha	1/culture	-	x	x		Oï			Rc				6	6	6	5	2	1
SILTRA XPRO	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	60 g/l bixafen 200 g/l prothioconazole	10375P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	2/an	-	x	x		Oï			Rc				6	6	6	5	2	1
SILVRON XPRO	Carboxamides (C2)	100 g/l bixafen 100 g/l fluorpyram (FU)	12224P/B	EC	-	30-59	1,25 l/ha	1/culture	-	x	x					Rc				6	6	6	2	2	1
SIM VERIS	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10817P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x					Rc				6	6	6	5	2	1
SKYWAY XPRO	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l bixafen 100 g/l prothioconazole 100 g/l tébuconazole	9972P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x		Oï			Rc				6	6	6	2	2	1
SLIPSTREAM	Triazoles (G1) Triazoles (G1)	90 g/l metconazole (cis/trans 84/16) 250 g/l prothioconazole	35595P/B	EC	-	61-69	0,5 l/ha	1/culture	35	x	x								Fu	6	6	6	1	1	1
SMARAGD	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	11029P/B	EC	-	32-59	1 l/ha	1 an	-	x	x		Oï			Rc				6	6	6	1	1	1
SOLAGOLD FORTE	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l benzovindiflupyr 150 g/l prothioconazole	12779P/P ; 29587P/P	EC	-	31-59	1 l/ha	1 an	-	x	x					Rc				6	6	6	5	2	1
TALENDO	Quinazolinones (E3)	200 g/l proquinazide	11044P/B	EC	-	25-49	0,25 l/ha	2 (14 jours)	-	x	x		Oï							6	6	6	2	2	1
TEBUCUR 250 EW	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	11372P/B	EW	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x					Rc				6	6	6	5	2	1
TESANTO	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	11250P/B	EC	-	31-45	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x					Rc				6	6	6	5	2	1
THIOVIT JET	Composés inorganiques (gr. M 02)	800 g/l soufre (FU)	5700P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x		Oï							6	6	6	1	1	1
TUBERI	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l benzovindiflupyr 150 g/l prothioconazole	32677P/P	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x					Rc				6	6	6	5	2	1
TURRET 90 (DLU : 31-05-2026)	***Triazoles (G1)***	***90 g/l metconazole***	***10898P/B***	***EC***	***-***	***31-59***	***1 l/ha***	***1/culture***	***35***	***x***	***x***					***Rc***				***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***
VALPURA XPRO	Carboxamides (C2)	125 g/l bixafen	10877P/B	EC	-	30-61	1 l/ha	1	56	x	x					Rc				6	6	6	2	2	1
VEGAS PLUS	Amines (G2)	212,5 g/l cyflufénamid 312,5 g/l spiroxamine	29866P/B	EC	-	25-29 30-49	0,48 l/ha 0,8 l/ha	1/culture	-	x x	x x		Oï Oï							6	6	6	5 10	2 5	1 1
VELDIG XPRO	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu) 130 g/l prothioconazole	10960P/B	EC	-	30-61	1,2 l/ha	1/culture	-	x	x		Oï			Rc				10	6	6	10	5	1
VELOGY ERA	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l benzovindiflupyr 150 g/l prothioconazole	10602P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x					Rc				6	6	6	5	2	1
VELOGY PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	28589P/B	EC	-	31-59	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x					Rc				6	6	6	5	2	1
VERBEN	Triazoles (G1)	50 g/l proquinazide 200 g/l prothioconazole	12226P/B	EC	-	25-49	1 l/ha	1/culture	-	x	x		Oï							6	6	6	5	2	1
VERTIPIN	Composés inorganiques (gr. M 02)	700 g/l soufre (FU)	10092P/B	SC	x	30-59	6 l/ha	2/culture (10 jours)	-	x	x		Oï							6	6	6	1	1	1
VERYDOR	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	50g fluxapyroxad 100 g/l mefentrifluconazole	11019P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x		Oï			Rc				6	6	6	1	1	1
WOPROAM OXIS 250	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	32236P/P	SC	-	32-59	1 l/ha	2 (14 jours)	-	x	x		Oï			Rc				6	6	6	1	1	1
XENIAL	Triazoles (G1) Benzophénones (B6) Strobilurines (C3)	66,6 g/l mefentrifluconazole 100 g/l métrafénone 80 g/l pyraclostrobine	35739P/B	EC	-	30-59	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	56	x	x		Oï			Rc				6	6	6	5	2	1

Insecticides

Insecticides (1/2) - Pucerons d'hiver (màj : 17-01-2025)

* Le nombre d'application maximum correspond à celui autorisé pour le stade et l'usage correspondant au tableau. Pour ces produits, un maximum de 2 applications est cependant autorisé sur l'année/la culture s'il s'agit d'usages différents.

** Le nombre d'application maximum correspond à celui autorisé pour le stade et l'usage correspondant au tableau. Pour le seigle, 2 applications sont autorisées, tandis que 1 application est autorisée pour les autres cultures. Pour ces produits, un maximum de 2 applications est cependant autorisé sur l'année/la culture s'il s'agit d'usages différents.

*** Retrait des usages plein air uniquement

° Usage autorisé uniquement en automne

1. Pyréthrinoïdes ; 2. Carbamates ; 3. Carbamates + pyréthrinoïdes ; 4. Néonicotinoïdes ; 5. Flonicamide

Nom commercial	Composition	Mode d'action	N° autorisation	Formulation	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)														Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
									Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine		le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
									Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	50%	75%	90%	50%	75%	90%
ACETACLEAN 200 SL	200 g/L acétamipride	4	35915P/P	SL	30-69	150 ml/ha	1/culture	28		x											-	-	10	-	-	10
					12-29	130 ml/ha	1/culture	-	x		x		x				x				-	-	10	-	-	10
AFINTO	50% flonicamide	5	11146P/B	WG	39-75	160 g/ha	2 (21 jours)	28			x										6	6	6	1	1	1
					39-77	140 g/ha	1	-	x	x			x	x			x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
AKAPULKO 100 CS	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	1237P/P	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			6	6	6	2	2	1
					09-30	50 ml/ha	1												x	x	6	6	6	2	2	1
					61-77	50 ml/ha	1	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
ALAKAZAM 500 WG	500 g/kg flonicamide	5	29564P/B	WG	39-75	160 g/ha	2 (21 jours)	28			x										6	6	6	1	1	1
					39-77	140 g/ha	1	-	x	x			x	x			x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
APHICAR 100 EW	100 g/l cypermethrine	1	11251P/B	EW	-	250 ml/ha	1/culture	21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	10	-	-	10
CARNADINE	200 g/l acétamipride	4	34040P/B	SL	30-69	150 ml/ha	1/culture	28		x											-	-	10	-	-	10
					12-29	130 ml/ha	1/culture		x		x		x				x				-	-	10	-	-	10
CYPELCO	500 g/l cypermethrine	1	1198P/P	EC	09-30	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
					51-59	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
CYPERB	500 g/l cypermethrine	1	10357P/B	EC	09-30	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
					51-59	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
CYPERSTAR	200 g/l cypermethrine	1	9727P/B	EC	09-30	100 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
					51-59	100 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
CYTHRIN MAX	500 g/l cypermethrine	1	10106P/B	EC	09-30	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
					51-59	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
DECIS 15 EW	15 g/l deltamethrine	1	10646P/B	EW	12-30	420 ml/ha	1/culture*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
					51-59	420 ml/ha	1/culture*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
DECIS EC 2,5	25 g/l deltamethrine	1	7172P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an (7 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
					51-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
DELTA-GLOB 25 EC	25 g/l deltamethrine	1	11237P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an (7 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
					51-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
DELTAPHAR	25 g/l deltamethrine	1	10354P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
					51-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
DEMETRINA 25 EC	25 g/l deltamethrine	1	10943P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
					51-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
EVURE	240 g/l tau-fluvalinate	1	10728P/B	EW	-	200 ml/ha	2/an°	-	x		x		x		x		x		x		6	6	6	5	2	1
					≥61	150 ml/ha	1	42			x	x	x	x	x	x					6	6	6	5	2	1
FLONICASTAR	500 g/kg flonicamide	5	28847P/P	WG	39-75	160 g/ha	2 (21 jours)	28			x										6	6	6	1	1	1
					39-77	140 g/ha	1	-	x	x			x	x			x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
FLONIGOLD 500	500 g/kg flonicamide	5	32675P/P	WG	39-75	160 g/ha	2 (21 jours)	28			x										6	6	6	1	1	1
					39-77	140 g/ha	1	-										x			6	6	6	1	1	1
FLUVELCO 240	240 g/l tau-fluvalinate	1	30901P/P	EW	≥61	150 ml/ha	1	42			x	x	x	x	x	x					6	6	6	5	2	1
					30-59	200 ml/ha	2/an	-	x		x		x		x		x		x		6	6	6	5	2	1
HINODE	500 g/kg flonicamide	5	10955P/B	WG	39-75	160 g/ha	2 (21 jours)	28			x										6	6	6	1	1	1
					39-77	140 g/ha	1	-	x	x			x	x			x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
INSECTINE	500 g/l cypermethrine	1	1331P/P	EC	09-30	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
					51-59	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
KARATE ZEON	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	1P/B ; 1067	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			6	6	6	2	2	1
					09-30	50 ml/ha	1/an*	-											x	x	6	6	6	2	2	1
					61-77	50 ml/ha	1/an*	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
KARIS 100 CS (DLU : 27-10-2025)	***100 g/l lambda-cyhalothrine***	***1***	***10028P/B***	***CS***	***09-30***	***50 ml/ha***	***2/culture***	***-***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	6	6	6	2	2	1
					61-77	***50 ml/ha***	***1/an****	***30***			***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	6	6	6	2	2	1
KENDO	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	29009P/B	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			6	6	6	2	2	1
					09-30	50 ml/ha	1/an*	-											x	x	6	6	6	2	2	1
					61-77	50 ml/ha	1/an*	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
KORADO 100 CS (DLU : 27-10-2025)	***100 g/l lambda-cyhalothrine***	***1***	***10377P/B***	***CS***	***09-30***	***50 ml/ha***	***2/culture***	***-***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	6	6	6	2	2	1
					61-77	***50 ml/ha***	***1/an****	***30***			***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	6	6	6	2	2	1

Nom commercial	Composition	Mode d'action	N° autorisation	Formulation	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)														Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
									Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine		le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
									Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	50%	75%	90%	50%	75%	90%
KUSTI	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	29010P/B	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			6	6	6	2	2	1
					09-30	50 ml/ha	1/an*	-											x	x	6	6	6	2	2	1
					61-77	50 ml/ha	1/an*	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
LAMBDA 50 EC (DLU : 29-05-2026)	***50 g/l lambda-cyhalothrine***	***1***	***9749P/B***	***EC***	***09-30***	***100 ml/ha***	***2/culture***	-	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	6	6	6	2	2	1
					61-77	***100 ml/ha***	***1/an****	***30***			***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	6	6	6	2	2	1
MARKATE 50 EC	50 g/l lambda-cyhalothrine	1	10888P/B	EC	09-30	100 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
					61-77	100 ml/ha	1/an*	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
MAVRIK	240 g/l tau-fluvalinate	1	7535P/B	EW	-	200 ml/ha	2/an°	-	x		x		x		x		x		x		6	6	6	5	2	1
					≥61	150 ml/ha	1	42			x	x	x	x	x	x					6	6	6	1	2	1
MEZENE	25 g/l deltamethrine	1	10367P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
					51-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
NEXIDE (DLU : 30-09-2026)	***60 g/l gamma-cyhalothrine***	***1***	***10110P/B***	***CS***	***09-30***	***75 ml/ha***	***2/culture***	-	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***10***	***6***	***6***	***10***	***5***	***1***
					61-77	***75 ml/ha***	***2/culture***	***30***			***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***10***	***6***	***6***	***10***	***5***	***1***
NINJA	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	9571P/B	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			6	6	6	2	2	1
					09-30	50 ml/ha	1/an*	-											x	x	6	6	6	2	2	1
					61-77	50 ml/ha	1/an*	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
PATRIOT PROTECH	15 g/l deltamethrine	1	10717P/B	EW	12-30	420 ml/ha	1/culture*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
					51-59	420 ml/ha	1/culture*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
PIRIMOR	50 % pirimicarbe	2	6640P/B	WG	-	250 g/ha	2	35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
PIRIMOR (DLU : 31-10-2025)	***50 % pirimicarbe***	***2***	***1337P/P***	***WG***	-	***250 g/ha***	***2***	***35***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	6	6	6	1	1	1
POLECI	25 g/l deltamethrine	1	10304P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
					51-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
POLUX	25 g/l deltamethrine	1	32052P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an (7 jours)	-	x	x	x	x							x	x	6	6	6	2	2	1
					51-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x							x	x	6	6	6	2	2	1
RAVANE 50	50 g/l lambda-cyhalothrine	1	9647P/B	EC	09-30	100 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
					61-77	100 ml/ha	1/an*	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SCATTO	25 g/l deltamethrine	1	30220P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
					51-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SHERPA 100 EW	100 g/l cypermethrine	1	11002P/B	EW	-	250 ml/ha	1	21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	10	-	-	10
SHERPA 200 EC	200 g/l cypermethrine	1	8968P/B	EC	09-30	100 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
					51-59	100 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
SHOORI	100 g/l flonicamide	5	33289P/B	OD	39-75	50 ml/ha	1	28			x	x	x	x	x	x	x	x			6	6	6	1	1	1
SPARROW (DLU : 03-08-2025)	***100 g/l lambda-cyhalothrine***	***1***	***11079P/B***	***CS***	***09-30***	***50 ml/ha***	***2/culture***	-	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***6***	***6***	***6***	***2***	***2***	***1***
					61-77	***50 ml/ha***	***2/culture***	***30***									***x***	***x***			***6***	***6***	***6***	***2***	***2***	***1***
					61-77	***50 ml/ha***	***1/an****	***30***			***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***			***x***	***x***	***6***	***6***	***6***	***2***	***2***	***1***
SPARVIERO (DLU : 03-08-2025)	***100 g/l lambda-cyhalothrine***	***1***	***10179P/B ; 1336P/P***	***CS***	***09-30***	***50 ml/ha***	***2/culture***	-	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	*6*	*6*	*6*	*2*	*2*	*1*
					61-77	***50 ml/ha***	***2/culture***	***30***									***x***	***x***			*6*	*6*	*6*	*2*	*2*	*1*
					61-77	***50 ml/ha***	***1/an****	***30***			***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***			***x***	***x***	*6*	*6*	*6*	*2*	*2*	*1*
SPLENDOUR	25 g/l deltamethrine	1	10466P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
					51-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SPLIT	15 g/l deltamethrine	1	10718P/B	EW	12-30	420 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
					51-59	420 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SUMI ALPHA	25 g/l esfenvalerate	1	8241P/B	EC	09-30	200 ml/ha	1/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
					51-59	200 ml/ha	1/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
TEPPEKI	500 g/l flonicamide	5	6P/B ; 2929	WG	39-77	140 g/ha	1	-	x	x			x	x			x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
					39-75	160 g/ha	2 (21 jours)	28			x										6	6	6	1	1	1
VELMERI 500 WG	500 g/kg flonicamide	5	34100P/B	WG	39-77	140 g/ha	1	-	x	x			x	x			x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
					39-75	160 g/ha	2 (21 jours)	28			x										6	6	6	1	1	1
VSM PIRIMICARB (DLU : 31-10-2025)	***50 % pirimicarbe***	***2***	***1368P/P***	***WG***	-	***250 g/ha***	***2***	***35***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***

Insecticides (2/2) - Cécidomyies (màj : 17-01-2025)																												
Nom commercial	Composition	Mode d'action	N° autorisation	Formulation	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)														Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
									Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine		le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
									Hive	Print	Hive	Print	Hive	Print	Hive	Print	Hive	Print	Hive	Print	50%	75%	90%	50%	75%	90%
AKAPULKO 100 CS	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	1237P/P	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
DECIS 15 EW	15 g/l deltamethrine	1	10646P/B	EW	30-59	420 ml/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
DECIS EC 2,5	25 g/l deltamethrine	1	7172P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (7 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
DELTA-GLOB 25 EC	25 g/l deltamethrine	1	11237P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (7 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
DELTAPHAR	25 g/l deltamethrine	1	10354P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
DEMETRINA 25 EC	25 g/l deltamethrine	1	10943P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
EVURE	240 g/l tau-fluvalinate	1	10728P/B	EW	30-59	200 ml/ha	2/an (10 jours)	-	x		x	x	x	x	x	x	x		x		6	6	6	5	2	1
FLUVELCO 240	240 g/l tau-fluvalinate	1	30901P/P	EW	30-59	200 ml/ha	2/an (10 jours)	-	x		x	x	x	x	x	x	x		x		6	6	6	5	2	1
KARATE ZEON	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	9231P/B ; 1067P/P	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
KARIS 100 CS (DLU : 27-10-2025)	***100 g/l lambda-cyhalothrine***	***1***	***10028P/B***	***CS***	***30-59***	***50 ml/ha***	***2/culture***	***-***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***6***	***6***	***6***	***2***	***2***	***1***
KENDO	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	29009P/B	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
KORADO 100 CS (DLU : 27-10-2025)	***100 g/l lambda-cyhalothrine***	***1***	***10377P/B***	***CS***	***30-59***	***50 ml/ha***	***2/culture***	***-***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***6***	***6***	***6***	***2***	***2***	***1***
KUSTI	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	29010P/B	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
LAMBDA 50 EC (DLU : 29-05-2026)	***50 g/l lambda-cyhalothrine***	***1***	***9749P/B***	***EC***	***30-59***	***100 ml/ha***	***2/culture***	***-***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***6***	***6***	***6***	***2***	***2***	***1***
MARKATE 50 EC	50 g/l lambda-cyhalothrine	1	10888P/B	EC	30-59	100 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
MAVRIK	240 g/l tau-fluvalinate	1	7535P/B	EW	30-59	200 ml/ha	2/an (10 jours)	-	x		x	x	x	x	x	x	x		x		6	6	6	5	2	1
MEZENE	25 g/l deltamethrine	1	10367P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
NEXIDE (DLU : 30-09-2026)	***60 g/l gamma-cyhalothrine***	***1***	***10110P/B***	***CS***	***09-30***	***75 ml/ha***	***2/culture***	***-***	x	x											***10***	***6***	***6***	***10***	***5***	***1***
				CS	***30-59***	***75 ml/ha***	***2/culture***	***-***	x	x	***x***	***x***	x	x	***x***	***x***	x	x	***x***	***x***	***10***	***6***	***6***	***10***	***5***	***1***
				CS	***61-77***	***75 ml/ha***	***2/culture***	***30***			***x***	***x***									***10***	***6***	***6***	***10***	***5***	***1***
NINJA	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	9571P/B	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
PATRIOT PROTECH	15 g/l deltamethrine	1	10717P/B	EW	30-59	420 ml/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
POLECI	25 g/l deltamethrine	1	10304P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
POLUX	25 g/l deltamethrine	1	32052P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (7 jours)	-	x	x	x	x							x	x	6	6	6	2	2	1
RAVANE 50	50 g/l lambda-cyhalothrine	1	9647P/B	EC	30-59	100 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SCATTO	25 g/l deltamethrine	1	30220P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SPARROW (DLU : 03-08-2025)	***100 g/l lambda-cyhalothrine***	***1***	***11079P/B***	***CS***	***30-59***	***50 ml/ha***	***2/culture***	***-***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***6***	***6***	***6***	***2***	***2***	***1***
SPARVIERO (DLU : 03-08-2025)	***100 g/l lambda-cyhalothrine***	***1***	***10179P/B;***	***CS***	***30-59***	***50 ml/ha***	***2/culture***	***-***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***6***	***6***	***6***	***2***	***2***	***1***
SPLENDOUR	25 g/l deltamethrine	1	10466P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SPLIT	15 g/l deltamethrine	1	10718P/B	EW	30-59	420 ml/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1

PPP autorisés en blé dur, engrain/petit épeautre, amidonnier et blé poulard/barbu (Herbicides - Agents anti-moussants - Régulateurs de croissance) – (màj : 17-01-2025)

Ga = Graminées annuelles ; Da = Dicotylées annuelles ; Dv = Dicotylées vivaces ; Fa = Folle avoine ; Gg = Gaillet grateron ; Jv = Jouet du vent ; Pa = Pâturin annuel Rg = Ray-Gras ; Vc = Vulpin des champs

*Produit autorisé en toutes cultures ; **Dosage maximum 3,6 kg de glyphosate/ha/an ; ***Dosage maximum 0,48 kg de triclopyr/ha/an ; ¶ Mode de pénétration racinaire (R) et/ou foliaire (F) ; °En mélange avec une huile de colza estérifiée 1 Inhibition de l'acetyl-coenzyme A carboxylase ; 2. Inhibition de l'acetolactase synthase ; 4. Imitateur de l'auxine ; 9. Inhibition de l'enolpyruvyl shikimate phosphate synthase ; pp. Phytoprotecteur ;
°°En mélange avec un adjuvant à base d'huile de colza esterifée ou triglycéride éthoxylé 10 OE à la dose de 0,8 l/ha
°°°En mélange avec un adjuvant à base d'huile de colza esterifée ou triglycéride éthoxylé 10 OE à la dose de 1l/ha

Nom commercial	Composition	Mode d'action	N° autorisation	Formulation	AB	Mode de pénétration*	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)				Cible(s)				Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
											Blé dur		Céréales anciennes		Graminées		Dicotylées		le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
											Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Annuelles	Vivaces	Annuelles	Vivaces	50%	75%	90%	50%	75%	90%
Régulateurs de croissance																								
BELCOCEL 400	400 g/l chlorméquat-chlorure	rc	31252P/B	SL	-	-	30-32	1,875 l/ha	2 (7 jours)	-	x								6	6	6	1	1	1
							21-30		1			x												
BELCOCEL 750	750 g/l chlorméquat-chlorure	rc	7384P/B	SL	-	-	30-32	1 l/ha	2	-	x		x						6	6	6	1	1	1
							21-30		1			x		x										
CCC 750	750 g/l chlorméquat-chlorure	rc	10675P/B	SL	-	-	30-32	1 l/ha	2	-	x		x						6	6	6	1	1	1
							21-30		1			x		x										
CYCOFIX 750	750 g/l chlorméquat-chlorure	rc	8800P/B	SL	-	-	30-32	1 l/ha	2	-	x		x						6	6	6	1	1	1
							21-30		1			x		x										
MEDAX MAX	50 g/kg prohexadione-calcium 75 g/kg trinexapac-éthyle	rc	10667P/B	WG	-	-	29-39	0,3-0,75 kg/ha	2/culture (7 jours)	-	x	x	x	x					6	6	6	1	1	1
							41-49	0,75 kg/ha	2/culture	-	x		x											
MEDAX TOP	300 g/l chlorure de mépiquat 50 g/l prohéxadione	rc rc	9840P/B	SC	-	-	31-32	1 l/ha	1	56	x		x						6	6	6	1	1	1
MÉPIPRAX 350	300 g/l chlorure de mépiquat 50 g/l prohexadione-calcium	rc rc	36188P/P	SC	-	-	31-32	1 l/ha	1	56	x		x		Verse				6	6	6	1	1	1
PERCIVAL	50 g/kg prohexadione-calcium 75 g/kg trinexapac-éthyle	rc rc	10674P/B	WG	-	-	29-39	0,3-0,75 kg/ha	2/culture (7 jours)	-	x	x	x	x					6	6	6	1	1	1
							41-49	0,75 kg/ha	1	-	x		x											
PRODAX	50 g/kg prohexadione-calcium 75 g/kg trinexapac-éthyle	rc rc	10630P/B	WG	-	-	29-39	0,3-0,75 kg/ha	2/culture (7 jours)	-	x	x	x	x					6	6	6	1	1	1
							41-49	0,75 kg/ha	1	-	x		x											
STABILAN 400	400 g/l chlorméquat-chlorure	rc	31249P/B	SL	-	-	20-39	1,875 l/ha	2 (7 jours)	-	x	x							6	6	6	1	1	1
							20-39	3,75 l/ha	1		x	x												
							20-29 30-39	1,75 l/ha 2 l/ha	2 (7 jours)		x	x												
STABILAN 750	750 g/l chlorméquat-chlorure	rc	9138P/B	SL	-	-	30-32	1 l/ha	2	-	x		x						6	6	6	1	1	1
							21-30		1			x		x										
Anti-mousse																								
ANTI-SCHUIM/ANTI-MOUSSE (DLU : 01-05-2025)	***200 g/l diméthylpolysiloxane***	***am***	***10118P/B***	***EW***	***x***	-	-	***1,4 ml/100 l bouillie***	-	-	***x***	***x***	***x***	***x***	-				***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
CASS'MOUSSE	294 g/l diméthylpolysiloxane	am	9736P/B	EW	-	-	-	1,4 ml/100 l bouillie	-	-	x	x	x	x					6	6	6	1	1	1
Herbicides																								
ABUTO	200 g/kg metsulfuron-méthyle	2	31885P/B	WG	-	R/F	20-39	25 g/ha	1/an	-	x						Da	Dv	6	6	6	1	1	1
							13-39	30 g/ha				x					Da	Dv						
ALLIE	20% metsulfuron-methyle	2	9450P/B	SG	-	R/F	12-39	0,03kg/ha	1	-	x		x				Da	Dv	6	6	6	1	1	1
							21-39					x		x										
AXEO	12,5 g/l cloquintocet-méxyl 50 g/l pinoxaden	pp 1	9603P/B	EC	-	-	13-31	0,9 l/ha	1	-	x	x	x	x	Vc Fa Jv				6	6	6	1	1	1
							13-31	1,2 l/ha			x		x		Vc Rg									
AXIAL	12,5 g/l cloquintocet-méxyl 50 g/l pinoxaden	pp 1	9602P/B	EC	-	-	13-31	0,9 l/ha	1	-	x	x	x	x	Vc Fa Jv				6	6	6	1	1	1
							13-31	1,2 l/ha			x		x		Vc Rg									
BIATHLON DUO (DLU : 30-06-2025)	***5,4 % florasulame 71,4 % tritosulfuron***	***2 2***	***10263P/B***	***WG***	-	***F***	***13-39***	***0,07kg/ha***	***1/culture***	-		***x***		***x***				***Gg***	***Dv***	-	***6***	***6***	-	***1***	***1***
							13-32	***0,04 kg/ha***		-		***x***		***x***				***Da***						
							21-32	***0,04 kg/ha***		-	***x***		***x***					***Da***						
							21-39	***0,07 kg/ha***		-	***x***		***x***					***Gg***	***Dv***					
BRODAL	500 g/l diflufénican	12	35305P/B	SC	-	F	10-13	0,1 l/ha	1/culture	-	x						Da	Dv	10	6	6	10	5	1
							Pré-émergence				x						Da		10	6	6	10	5	1
CAPRI DUO°°	7,08 % cloquintocet-méxyl 7,08 % pyroxsulame 1,42 % florasulame	pp 2 2	9900P/B	WG	-	F	21-31	0,265 kg/ha	1/culture	-	x		x		Vc Pa Jv	Rg			6	6	6	1	1	1
								0,210 kg/ha			x		x				Da							
								0,140 kg/ha				x		x	Jv		Da							
CAPRI FORTE	37,5 g/kg florasulam 52,1 g/kg halauxifène-méthyle 187,5 g/kg pyroxsulam 266 g/kg cloquintocet-acide (Phytoprotecteur)	pp	28801P/B	WG	-	-	12-32	0,1 kg/ha	1	-	x				Vc Pa Jv	Rg	Da		-	-	20	-	-	20
CLYDE COMBI	1 g/l florasulame 100 g/l fluroxypyr	2 4	11102P/B	SE	-	F	21-31	1,2 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x			Da	Gg	6	6	6	5	2	1

Nom commercial	Composition	Mode d'action	N° autorisation	Formulation	AB	Mode de pénétration*	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)				Cible(s)				Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
											Blé dur		Céréales anciennes		Graminées		Dicotylées		le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
											Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Annuelles	Vivaces	Annuelles	Vivaces	50%	75%	90%	50%	75%	90%
DALTRICE	6 g/kg iodosulfuron-méthyl-Na 30 g/kg mésosulfuron-méthyl 90 g/kg méfenpyr-diéthyle	2 2 pp	32844P/B	WG	-	R/F	21-32	0,3 kg/ha 0,4 kg/ha**** 0,5 kg/ha***** 0,3 kg/ha 0,4 kg/ha**** 0,5 kg/ha*****	1/culture	-	x x x x x x	x x 	 	 	Ga Ga Ga 	 	 Da Da Da	 	-	-	6	-	-	1
FINY	200 g/kg metsulfuron-méthyle	2	9482P/B	SG	-	R/F	12-39	0,03 kg/ha	1	-	x	x	x	x			Da	Dv	-	-	6	-	-	1
FLAME DUO	104 g/kg florasulam 250 g/kg tribenuron-méthyle	2	10956P/B	SG	-	F	23-39	60 g/ha	1	-	x	x	x	x			Da		-	-	6	-	-	1
INCELO**	47 g/kg mésosulfuron-méthyle 112,5 g/kg méfenpyr-diéthyl 15,8 g/kg thiencarbazone-	2 pp 2	11211P/B	WG	-	F	13-32 21-32	0,2 kg/ha 0,33 ka/ha	1	-	x x	 	 	 	Pa Jv Vc Fa	 Rg	 Da	 	6 -	6 6	6 6	2 -	2 2	1 1
MANHATTAN	69,5 g/kg halauxifène-méthyle 250 g/kg pyroxsulam 354 g/kg cloquintocet-acide	4 2 pp	28074P/B	WG	-	-	12-32	0,075 kg/ha	1	-	x				Vc Pa Jv	Rg	Da		-	-	10	-	-	10
MANHATTAN FORTE	37,5 g/kg florasulam 52,1 g/kg halauxifène-méthyle 187,5 g/kg pyroxsulam 266 g/kg cloquintocet-acide	2 4 2 pp	30264P/B	WG	-	-	12-32	0,1 kg/ha	1	-	x				Vc Pa Jv	Rg	Da		-	-	20	-	-	20
MATTERA	6.25 g/l halauxifen-methyle 5 g/l florasulame 6 g/l cloquintocet-methyle	4 2 pp	10657P/B	OD	-	F	13-32	0.75 l/ha	1/an	50 50	x x	x x					Ga Ga	Gg Gg	-	-	6	-	-	1
MESIOFIS PRO	2 g/l iodosulfuron-méthyle-Na 30 g/l méfenpyr-diéthyle	2 pp 2	1215P/P	OD	-	R/F	21-31	0,9 l/ha 1,5 l/ha	1/culture	-	x x	x 	x x	x 	Jv Vc Pa	 Rg	Da 	 	6 -	6 6	6 6	1 -	1 2	1 1
MESIOFIS PRO (DLU : 30-06-2026)	***2 g/l iodosulfuron-méthyle-Na 30 g/l méfenpyr-diéthyle***	***2 P P 2***	***1307P/P***	***OD***	***-***	***R/F***	***21-31***	***0,9 l/ha 1,5 l/ha***	***1/culture***	***-***	***x x***	***x x***	***x x***	***x x***	***Jv Vc Pa***	*** Rg***	***Da ***	*** ***	***6 -***	***6 6***	***6 6***	***1 -***	***1 2***	***1 1***
MESIOFIS SUPER WG	6 g/kg iodosulfuron-méthyle-Na 30 g/kg mésosulfuron-méthyle 90 g/kg méfenpyr-diéthyle	2 2 pp	33104P/P	WG	-	R/F	21-32	0,3 kg/ha 0,4 kg/ha**** 0,5 kg/ha***** 0,3 kg/ha 0,4 kg/ha**** 0,5 kg/ha*****	1/culture	-	x x x x x x	X X 	 	 	Ga Ga Ga 	 	 Da Da Da	 	-	-	6	-	-	1
METRO SG	200 g/kg metsulfuron-méthyle	2	10143P/B	SG	-	R/F	12-39 21-39	0,03 kg/ha	1	-	x	 x	x 	 x	 	 	Da Da	Dv Dv	6	6	6	5	2	1
NAVIGATE	400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	11240P/B	SC	-	R/F	00-09	0,6 l/ha	1/culture	-	x				Ga		Da		10	6	6	10	5	1
NUCLEUS	400 g/l flufénacet 200 g/l diflufénican	15 12	11212P/B	SC	-	R/F	00-09	0,6 l/ha	1/culture	-	x				Ga		Da		10	6	6	10	5	1
OBELISK	6 g/kg iodosulfuron-méthyle-Na 30 g/kg mésosulfuron-méthyle	2 2 pp	31875P/B	WG	-	R/F	21-32	0,3 kg/ha 0,4 kg/ha**** 0,5 kg/ha*****	1	-	x x x	x 	 	 	Ga Ga Ga	 	Da Da Da	 	-	-	6	-	-	1
PYROXSTAR DUO	70,8 g/kg cloquintocet-méxyl 14,2 g/kg florasulame 70,8 g/kg pyroxsulam	pp 2 2	28610P/P	WG	-	R/F	21-31	0,265 kg/ha***** 0,21 kg/ha***** 0,14 kg/ha*****	1	-	x x	 	x x	 	Vc Pa Jv Jv	Rg 	 Da Da	 	6	6	6	1	1	1
QUIRINUS	240 g/l flufénacet 50 g/l picolinafène	15	10605P/B	SC	-	-	10-29 Pré-émergence	0,5 l/ha 0,625 l/ha	1	-	x x	 	x x	 	Ga Vc Jv Ga Vc Jv	 	Da Da	 	6	6	6	5	2	1
RENITAR	6.25 g/l halauxifen-methyle 5 g/l florasulame 6 g/l cloquintocet-methyle	4 2 pp	10656P/B	OD	-	F	13-32 33-45	0.75 l/ha 1 l/ha	1/an	50	x x	x x	 	 	 	 	Da 	Gg Gg	-	-	6	-	-	1
SIGMA FLEX	4,5 % mésosulfuron-méthyle 6,75 % propoxycarbazone-Na 9 % mefenpyr-diéthyle	2 2 pp	10623P/B	WG	-	F	21-31	0,2 kg/ha 0,33 kg/ha	1/culture	-	x x	 x 	 	 	Vc Pa Jv Vc Pa Jv Fa	 Rg	Da Da 	 	10	6	6	10	5	1
SIGMA MAXX	2 g/l iodosulfuron-méthyle-Na 30 g/l méfenpyr-diéthyle	2 pp 2	10409P/B	OD	-	R/F	21-31	0,9 l/ha 1,5 l/ha	1/culture	-	x x	x x	x 	x 	Jv Vc Pa	 Rg	Da 	 	6 -	6 6	6 6	1 -	1 2	1 1
SIGMA PLUS**	5 % amidosulfuron 3 % mésosulfuron-méthyle 1 % iodosulfuron-méthyle-Na 9 % mefenpyr-diéthyle	1 2 2 pp	10410P/B	WG	-	R/F	21-31	0,3 kg/ha 0,5 kg/ha	1/culture	-	x x	 x 	 	 	 Vc Jv Vc Pa Jv	 Rg	 Da 	 	- -	- -	10 10	- -	- -	10 10
SIGMA STAR**	0,9 % iodosulfuron-méthyle-Na 4,5 % mésosulfuron-méthyle 2,25 % thiencarbazone-méthyle	2 2 2 pp	10636P/B	WG	-	R/F	21-32	0,2 kg/ha 0,33 kg/ha	1/culture	-	x x	x 	 	 	Vc Jv Vc Pa Jv	 Rg	Da 	 	6 -	6 6	6 6	1 -	1 1	1 1
SIGMA SUPRA**	5 % amidosulfuron 3 % mésosulfuron-méthyle 1 % iodosulfuron-méthyle-NA 9 % méfenpyre-diéthyle	1 2 2 pp	10693P/B	WG	-	R/F	21-31	0,5 kg/ha	1/culture	-	x 	 x 	 	 	Vc Pa Jv Vc Jv	Rg 	Da Da	 	-	-	10 6	-	-	10 1
TERCERO DUO	104 g/kg florasulam 250 g/kg tribenuron-méthyle	2 2	35992P/P	SG	-	F	23-39	0,06 kg/ha	1	-	x	x	x	x			Da		-	-	6	-	-	1
ZEPPOS	6 g/kg iodosulfuron-méthyle-NA 30 g/kg mésosulfuron-méthyle	2 2 pp	31633P/B	WG	-	R/F	21-32	0,3 kg/ha 0,4 kg/ha**** 0,5 kg/ha*****	1	-	x x x	x 	 	 	Ga Ga Ga	 	Da Da Da	 	-	-	6	-	-	1
ZYPAR	5 g/l florasulam 6,25 g/l halauxifène-méthyle 6 g/l cloquintocet-mexyl	2 4 pp	10655P/B	OD	-	F	13-32 33-45 11-29	0,75 l/ha 1 l/ha 0,75 l/ha	1/an	50	x x x	x x 	 	 	 	 	Da Da	Gg Gg Gg	-	-	6	-	-	1

PPP autorisés en blé dur, engrain/petit épeautre, amidonnier et blé poulard/barbu (Fongicides - Trait. semences - Insecticides - Molluscicides) – (màj : 17-01-2025)

Céréales "anciennes" = engrain/petit épeautre, amidonnier et blé poulard/barbu

Ca = Carie commune ; Fu = Fusariose ; He = Helminthosporiose ; Oi = Oïdium ; Pv = piétin-verse ; Rb = Rouille brune ; Rj = Rouille jaune ; Se = Septoriose de l'épi ; Sf = Septoriose des feuilles

Pu = pucerons ; Cé = cécidomyies

* Pas autorisé en engrain/petit épeautre

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'applic. BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)				Cible(s)							Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Blé dur		Céréales anciennes		Fonte de semis	Pied-de-verse	Oïdium	Rouille brune	Helminthosporiose	Septoriose	Carie commune	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps								50%	75%	90%	50%	75%	90%
Fongicides																										
AMISTAR PRIME	Strobilurines (C3) Amines (G2)	250 g/l azoxystrobine 080 ml fenpropidine	3308P/B	SE	-	30-59	1l/ha	1/ culture	-	x	x	x*	x*			Oi	Rb Rj	He	Sf		40	30	20	40	30	20
AQUINO	Picolinamides (C4)	50 g/l fenpicoxamide	11099P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	1/an	-	x							Rb Rj		Sf		30	20	10	30	20	10
ARTINA (DLU : 31-05-2026)	***Triazoles (G1)***	***90 g/l metconazole***	***10896P/B***	***EC***	-	***31-59***	***1 l/ha***	***1/culture***	***35***	***x***	***x***	***x***	***x***			***Oi***	***Rb***		***Sf Se***		***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***
										x	***x***	***x***								***Fu***						
ATTA-BUCO (DLU : 30-06-2025)	***Triazoles (G1)***	***250 g/l tébuconazole***	***1356P/P***	***EC***	-	***31-59***	***1 l/ha***	***1/culture***	-	***x***	***x***					***Oi***	***Rb Rj***		***Se Sf***		***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
BALAYA	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l méfentrifluconazole 100 g/l pyraclostrobine	11061P/B - 24959P/P	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x					Oi	Rb Rj		Sf		6	6	6	2	2	1
BALAYA (DLU : 31-05-2025)	***Triazoles (G1) Strobilurines (C3)***	***100 g/l méfentrifluconazole 100 g/l pyraclostrobine***	***1395P/P***	***EC***	-	***30-69***	***1,5 l/ha***	***2/culture (14 jours)***	***35***	***x***	***x***					***Oi***	***Rb Rj***		***Sf***		***6***	***6***	***6***	***2***	***2***	***1***
BIOSOON 80 WG (DLU : 15-04-2026)	-	***800 g/kg soufre***	***1252P/P***	***WG***	***x***	***30-59***	***6 kg/ha***	-	-	***x***	***x***								***Sf***		***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
CARAMBA 90 EC	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10922P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x	x	x			Oi	Rb Rj		Sf Se		6	6	6	5	2	1
					-	65				x	x	x	x							Fu						
CARPEDIEM	Phosphanates (P07)	755 g/l phosphanates de potassium	33713P/B	SL	-	25-59	4 l/ha	2 (23 jours)	-	x	x								Sf		6	6	6	5	2	1
CERATAVO PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	10676P/B	EC	-	31-59	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x				Rb Rj		Sf Se		6	6	6	5	2	1
ELATUS PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	10601P/B	EC	-	31-59	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x				Rb Rj		Sf Se		6	6	6	5	2	1
ERA 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	36070P/B	EC	-	30-36	1S l/ha	2/culture (14-21jours)	35	x	x					Oi	Rb Rj		Sf		6	6	6	5	2	1
EVORA XPRO	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l bixafen 100 g/l prothioconazole 100 g/l téuconazole	9970P/B	EC	-	31-65	1,25 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x			Oi	Rb Rj	He	Sf	Fu	6	6	6	2	2	1
						30-32				x	x	x	x		Pv											
FENPICAZOL 150 EC	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l prothioconazole 50 g/l fenpicoxamide	28636P/P	EC	-	30-59	1,5 l/ha	1/culture	-	x	x								Sf		40	30	20	40	30	20
							2 l/ha			x	x					Oi	Rb Rj	He	Se	Fu						
FENPICOSTAR S	Picolinamides (C4)	50 g/l fenpicoxamide	36230P/P	EC	-	30-69	1S l/ha	1/an	-	x									Sf		30	20	10	30	20	10
							2 l/ha	1/an		x							Rb Rj									
FLEXURE	Triazoles (G1) Spirocétalamines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	32682P/B	EC	-	31-65	1,25 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x			Oi	Rb Rj	He	Sf	Fu	6	6	6	5	2	1
						31-32		1*		x	x	x	x		Pv											
FLOSUL	-	800 g/l soufre	11022P/B	SC	x	-	5 l/ha	2 (14 jours)	35	x	x					Oi					6	6	6	1	1	1
GRETEG	Triazoles (G1)	250 g/l diféconazole	31613P/B	EC	-	30-69	0,5 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x				Rb Rj		Sf		-	10	6	-	10	5
HELIX	Triazoles (G1) Spirocétalamines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	9806P/B	EC	-	31-32	1,25 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x		Pv											
						31-65				x	x	x	x			Oi	Rb Rj	He	Sf	Fu	6	6	6	5	2	1
INPUT	Triazoles (G1) Spirocétalamines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	9719P/B	EC	-	31-32	1,25 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x		Pv											
						31-65				x	x	x	x			Oi	Rb Rj	He	Sf	Fu	6	6	6	5	2	1
JESSICO ONE	Picolinamides (C4)	50 g/l fenpicoxamide	28402P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	1/an	-	x									Sf		30	20	10	30	20	10
							2 l/ha			x							Rb Rj									
JOUST	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	32908P/B	EC	-	30-69	0,8 l/ha	2/culture (14-21 jours)	35	x	x					Oi					20	10	6	20	10	5
KUMULUS WG	-	800 g/kg soufre	9185P/B	WG	x	30-59	6 kg/ha	-	-	x	x								Sf		6	6	6	1	1	1
LENYYOR	Triazoles (G1)	100 g/l méfentrifluconazole	11041P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x					Oi	Rb Rj		Sf		6	6	6	2	2	1
LIBRAX	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	62.5 g/l fluxapyroxad 45 g/l metconazole (c/t 84/16)	10177P/B			25-69	2 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x		Pv	Oi	Rb Rj	He	Sf Se	Fu	6	6	6	5	2	1
LOSKA	Triazoles (G1) Triazoles (G1)	48 g/l metconazole (cis/trans 64/36) 100 g/l prothioconazole	34142P/B	EC	-	30-65	1l/ha	1/culture	35	x	x						Rb		Sf		6	6	6	5	2	1
						55-69				x										Fu						
MADISON FORTE	Triazoles (G1) Spirocétalamines (G2) Strobilurine (C3)	93,3 g/l prothioconazole 107 g/l spiroxamine 80 g/l trifloxystrobine	28502P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (21 jours)	-	x	x	x	x			Oi	Rb Rj	He	Sf SE	Fu	20	10	6	20	10	5
METFLAX	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	45 g/l metconazole 62.5 g/l fluxapyroxad	1291P/P	EC	-	25-69	2 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x		Pv	Oi	Rb Rj	He	Sf Se	Fu	6	6	6	5	2	1
MIRALON	Strobilurines (C3) Carboxamides (C2)	75 g/l azoxystrobine 50 g/l fluxapyroxad	3298P/B	EC	-	30-69	2 l/ha	2/culture (21 jours)	35	x	x					Oi	Rb Rj	He	Sf		6	6	6	1	1	1
MIZONA	Strobilurines (C3) Carboxamides (C2)	200 g/l pyraclostrobine 30 g/l fluxapyroxad	11065P/B	EC	-	30-69	1 l/ha	2/culture (21 jours)	35	x							Rb		Sf		6	6	6	2	2	1
NAVURA	Triazoles (G1)	50 g/l méfentrifluconazole 100 g/l prothioconazole	28405P/B	EC	-	30-32	1,5 l/ha	1/culture	-	x	x				Pv											
						30-69			35	x	x					Oi	Rb Rj	He	Sf		6	6	6	1	1	1
						61-69				x	x									Fu						
PADELLI	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	31610P/B	EC	-	31-65	1,25 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x					Oi	Rb Rj	He	Sf	Fu	6	6	6	5	2	1
						31-32		2/an		x	x				Pv											
PATEL 250 EC	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10982P/B	EC	-	31-32	0,8 l/ha	1**	-	x		x			Pv											
						31-65	0,8 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x		x				Oi	Rj		Sf Se	Fu	6	6	6	5	2	1
PEACOQ	Picolinamides (C4)	50 g/l fenpicoxamide	11118P/B	ZC	-	30-36	1,5 l/ha	1/an	-	x									Sf		30	20	10	30	20	10
							2 l/ha			x							Rb Rj									
PECARI 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11163P/B	EC	-	31-61	0,65 l/ha	2/culture	-	x	x	x	x			Oi	Rj		Se x		6	6	6	5	2	1
						61-65				x	x	x	x							Fu						
PLEXEO 90 (DLU : 31-05-2026)	***Triazoles (G1)***	***90 g/l metconazole***	***10897P/B***	***EC***	-	***31-59***	***1 l/ha***	***1/culture***	***35***	***x***	***x***	***x***	***x***			***Oi***	***Rb***		***Sf Se***		***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***
						65				***x***	***x***	***x***	***x***							***Fu***						
PROCER XTRA	Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	140 g/l azoxystrobine 100 g/l prothioconazole	30957P/B	EC	-	31-59	1,4 l/ha	2 (21 jours)	44	x	x						Rb Rj	He	Sf Se		10	6	6	10	5	1
						59-69		1		x	x									Fu						
PROMINO XTRA	Triazolinthione (G1) Triazoles (G1)	140 g/l azoxystrobine 100 g/l prothioconazole	28978P/B	EC	-	59-69	1,4 l/ha	1	44	x	x								Sf Se	Fu	10	6	6	10	5	1
						31-59				x	x						Rb Rj	He								

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'applic. BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)				Cible(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Blé dur		Céréales anciennes		Fontes de semis	Piétin-verse	Oïdium	Rouilles	Helminosporiose	Septoriose	Carie commune	Fusariose	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps									50%	75%	90%	50%	75%	90%
PROSARO	Triazolinthione (G1) Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tebuconazole	9515P/B	EC	-	32-59	1 l/ha	1/culture	-	x						Oï	Rb Rj		Sf Se			6	6	6	2	2	1
											x					Oï	Rb Rj		Sf Se								
						65				x											Fu						
											x										Fu						
PROTENDO 250 E	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10930P/B	EC	-	31-32	0,8 l/ha	1**	-	x		x		Pv								6	6	6	5	2	1
						31-65	0,8 l/ha	2/culture (14 jours)		x		x				Oï	Rj		Sf Se		Fu						
PROTENDO 300 E	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11111P/B	EC	-	31-61	0,65 l/ha	2/culture	-	x	x	x	x			Oï	Rj		Se Sf			6	6	6	5	2	1
						61-65				x	x	x	x								Fu						
PROTENDO EXTR	Triazolinthione (G1) Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tebuconazole	11231P/B	EC	-	32-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x					Oï	Rb Rj		Sf Se			6	6	6	2	2	1
						65				x	x										Fu	6	6	6	2	2	1
PYGMALION	Phosphanates (P07)	755 g/l phosphanates de potassium	29013P/B	SL	-	25-59	4 l/ha	2 (23 jours)	-	x	x								Sf			6	6	6	5	2	1
QUESTAR	Picolinamides (C4)	50 g/l fenpicoxamide	11076P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha 2 l/ha	1/an	-	x									Sf			30	20	10	30	20	10
										x	x						Rb Rj										
REVYFLEX TRIO	Triazoles (G1) Benzophénones (B6) Strobilurines (C3)	66,6 g/l méfentrifluconazole 100 g/l métrafénone 80 g/l pyraclostrobine	33426P/B	EC	-	30-32	1,5 l/ha	2/culture	-	x	x			Pv								6	6	6	5	2	1
						30-59		2/culture (9jours)	56	x	x					Oï	Rb Rj	He	Sf			6	6	6	5	2	1
REVYSTAR GOLD	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	50 g/l fluxapyroxad 100 g/l méfentrifluconazole	11085P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x					Oï	Rb Rj		Sf			6	6	6	1	1	1
REVYTREX	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	66.7 g/l fluxapyroxad 66.7 g/l méfentrifluconazole	11089P/B ; 1376P/P ; 29665P/P	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x						Rb Rj		Sf			6	6	6	5	2	1
REVYTREX (DLU : 15-04-2025)	***Carboxamides (C2) Triazoles (G1)***	***66.7 g/l fluxapyroxad 66.7 g/l méfentrifluconazole***	***24963P/P***	***EC***	***-***	***30-69***	***1,5 l/ha***	***2/culture (14 jours)***	***35***	***x***	***x***						***Rb Rj***		***Sf***			***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***
SIMVERIS	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10817P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x	x	x			Oï	Rb Rj		Sf Se			6	6	6	5	2	1
						65				x	x	x	x								Fu	6	6	6	5	2	1
SKYWAY XPRO	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l bixafen 100 g/l prothioconazole 100 g/l téuconazole	9972P/B	EC	-	31-65	1,25 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x			Oï	Rb Rj	He	Sf		Fu	6	6	6	2	2	1
						30-32				x	x	x	x	Pv													
SOLAGOLD FORT	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l benzovindiflupyr 150 g/l prothioconazole	1277P/P ; 29587P/P	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x				Rb Rj		Sf Se		Fu	6	6	6	5	2	1
TEBUPHYT	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	1055P/P	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x					Oï	Rb Rj		Sf Se			6	6	6	1	1	1
TEBUSIP	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	9766P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x					Oï	Rb Rj		Sf Se			6	6	6	1	1	1
TESANTO	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	11250P/B	EC	-	31-59	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x				Rb Rj		Sf Se			6	6	6	5	2	1
TUBERI	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l benzovindiflupyr 150 g/l prothioconazole	32677P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x				Rb Rj		Sf Se		Fu	6	6	6	5	2	1
TURRET 90 (DLU : 31-05-2026)	***Triazoles (G1)***	***90 g/l metconazole***	***10898P/B***	***EC***	***-***	***31-59***	***1 l/ha***	***1/culture***	***35***	***x***	***x***	***x***	***x***			***Oï***	***Rb Rj***		***Sf Se***			***6***	***6***	***6***	***5***	***2***	***1***
						65				***x***	***x***	***x***	***x***								***Fu***						
UNIVOQ	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l prothioconazole 50 g/l fenpicoxamide	11179P/B	EC	-	30-59	1,5 l/ha 2 l/ha	1/culture	-	x	x								Sf			40	30	20	40	30	20
										x	x					Oï	Rb Rj	He	Se		Fu						
VEGAS PLUS	Spiroketal-amines (G2)	12,5 g/l cyflufénamid 312,5 g/l spiroxamine	29866P/B	EC	-	25-29	0,48 l/ha	1/culture	-	x	x					Oï						6	6	6	5	2	1
						30-55	0,8 l/ha			x	x					Oï						10	6	6	10	5	1
VELOGY ERA	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l benzovindiflupyr 150 g/l prothioconazole	10602P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x				Rb Rj		Sf Se		Fu	6	6	6	5	2	1
VELOGY PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzovindiflupyr	28589P/B	EC	-	31-59	0,75 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x				Rb Rj		Sf Se			6	6	6	5	2	1
VERBEN	Quinazolinone (E1) Triazoles (G1)	50 g/l proquinazide 200 g/l prothioconazole	11226P/B	EC	-	25-65	1 l/ha	1/culture	-	x	x					Oï	Rb Rj	He	Sf			6	6	6	5	2	1
						25-32				x	x			Pv													
						61-65				x	x										Fu						
VERYDOR	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	50 g/l fluxapyroxad 100 g/l méfentrifluconazole	11101P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x					Oï	Rb Rj		Sf			6	6	6	1	1	1
VSM TEBUCO (DLU : 28-02-2026)	***Triazoles (G1)***	***250 g/l tébuconazole***	***24312P/P***	***EC***	***-***	***31-59***	***1 l/ha***	***1/culture***	***-***	***x***	***x***					***Oï***	***Rb Rj***		***Sf Se***			***6***	***6***	***6***	***1***	***1***	***1***
XENIAL	Triazoles (G1) Benzophénones (B6) Strobilurines (C3)	66,6 g/l méfentrifluconazole 100 g/l métrafénone 80 g/l pyraclostrobine	35739P/B	EC	-	30-32	1,5 l/ha	1	-	x	x			Pv								6	6	6	5	2	1
						30-59		2/culture (14 jours)	56	x	x					Oï	Rb Rj	He	Sf			6	6	6	5	2	1
Traitement de semences																											
CELEST	Phenylpyrrole (E2)	25 g/l fludioxonyl	9269P/B	FS	-	-	200 ml/100kg	-	-	x	x	x	x						Sf	Ca	Fu	6	6	6	1	1	1
Molluscicides																											
DERREX	-	3% phosphate de fer	9904P/B	RB	x	-	7 kg/ha	4/an	-	x	x	x	x									6	6	6	1	1	1
DERREX HIGH PERFORMANCE	-	3% phosphate de fer	10959P/B	RB	x	-	7 kg/ha	4/an	-	x	x	x	x									6	6	6	1	1	1
FERREX RB	-	2,5% phosphate de fer	10939P/B	RB	x	-	6 kg/ha	5	-	x	x	x	x									6	6	6	1	1	1
FIRESCALE	-	37 g/kg phosphate de fer	11244P/B	RB	x	-	7 kg/ha	4/an (7 jours)	-	x	x	x	x									6	6	6	1	1	1
IRONCLAD	-	37 g/kg phosphate de fer	11090P/B ; 35134P/P	RB	x	-	7 kg/ha	4/an (7 jours)	-	x	x	x	x									6	6	6	1	1	1
IRONMAX PRO	-	2,4% phosphate de fer	10721P/B	RB	x	-	7 kg/ha	4/an (7 jours)	-	x	x	x	x									6	6	6	1	1	1
NEU 1181 M	-	3% phosphate de fer	9724P/B	RB	x	-	7 kg/ha	4/an	-	x	x	x	x									6	6	6	1	1	1
NEU 1187 M	-	41,6 g/kg phosphate de fer	30110P/B	RB	x	-	5 kg/ha	4/an (7 jours)	-	x	x	x	x									6	6	6	1	1	1
SLUGGO PRO	-	41,6 g/kg phosphate de fer	33739P/B	RB	x	-	5 kg/ha	4 (7 jours)	-	x	x	x	x									6	6	6	1	1	1
SLUXX	-	3% phosphate de fer	9722P/B ; 1262P/P	RB	x	-	7 kg/ha	4/an	-	x	x	x	x									6	6	6	1	1	1
VITROL PRO	-	24 g/kg pyrophosphate de fer	30612P/B	RB	x	-	7 kg/ha	6 (14 jours)	-	x	x	x	x									6	6	6	1	1	1
Insecticides																											
AFINTO	Pyridines (29)	50% flonicamide	11146P/B	WG	-	39-75	0,16 kg/ha	2 (21 jours)	28	x		x		Pu								6	6	6	1	1	1
EVURE	Pyréthrines (1)	240 g/l tau-fluvalinate	10728P/B	EW	-	≥61	0,15 l/ha	1	42	x	x	x	x	Pu								6	6	6	5	2	1
						Automne	0,2 l/ha	2	-	x		x		Pu													
						30-59		2 (10 jours)		x	x	x	x	Cé													
FLONICASTAR	Pyridines (29)	500 g/kg flonicamide	28847P/P	WG	-	39-75	0,16 kg/ha	2 (21 jours)	28	x		x		Pu								6	6	6	1	1	1
FLUVELCO 240	Pyréthrines (1)	240 g/l tau-fluvalinate	30901P/P	EW	-	≥61	0,15 l/ha	1	42	x	x	x	x	Pu								6	6	6	5	2	1
						Automne	0,2 l/ha	2	-	x		x		Pu													
						30-59		2 (10 jours)		x	x	x	x	Cé													
HINODE	Pyridines (29)	50 % flonicamide	10955P/B	WG	-	39-75	0,16 kg/ha	2 (21 jours)	28	x		x		Pu								6	6	6	1	1	1
MAVRIK	Pyréthrines (1)	240 g/l tau-fluvalinate	7535P/B	EW	-	≥61	0,15 l/ha	1	42	x	x	x	x	Pu								6	6	6	5	2	1
						Automne	0,2 l/ha	2	-	x		x		Pu													
								2 (10 jours)		x	x	x	x	Cé													
TEPPEKI	Pyridines (29)	50 % flonicamide	9526P/B ; 29297P/P	WG	-	39-75	0,16 kg/ha	2 (21 jours)	28	x		x		Pu								6	6	6	1	1	1