

Table des matières

1°) Stades repères

Pages 2 à 4

[repères végétatifs (2) ; échelles phénologiques (3 à 4)]

2°) Liste des produits phytosanitaires autorisés en céréales

Réalisé en collaboration par le **CePiCOP** et le **Comité régional PHYTO** avec les données disponibles sur le Phytoweb en date du 07/02/2022 et l'expertise du **CRA-W** dans le domaine ;

Vos remarques sont les bienvenues : 081/62 21 39 ou cepiscop@centrespilotes.be

Ces inventaires sont mis à jour régulièrement et consultable sur <https://centrespilotes.be/cp/cepiscop/>

!! Lire attentivement l'étiquette du produit avant toute utilisation !!

Liste des PPP retirés

Page 5

Herbicides

Pages 6 à 19

[Liste des PPP retirés en 2021 (5) ; Liste herbicides (6) ; Comment utiliser ces listes (7) ; Anti-moussant + additif + mouillant (8) ; Sensibilité des adventices (9) ; Mode d'action des substances actives (10) ; Composition des produits (11) ; Herbicides de pré-semis à pré-émergence (12-13) ; Herbicides levée à début tallage (14-17) ; Herbicides tallage à gonflement gaine (18-25) ; Sensibilité variétale au chlortoluron (26)]

Antiverses

Pages 27 à 31

Fongicides

Pages 32 à 50

[Introduction (32) ; orge, escourgeon (33 à 37) ; froment, seigle, triticales et épeautre (38 à 50) ; avoine (49-50)]

Traitements des semences

Page 51

Insecticides

Pages 52 à 54

[contre pucerons d'hiver (52) ; contre pucerons d'été (53) ; contre cécidomyies (54)]

Molluscicides

Page 55

PPP autorisés autres céréales

Pages 56 à 57

Outil agronomique et de traçabilité

Le CePiCOP édite et diffuse un **carnet de champ (format de poche)** pour collationner les interventions menées dans chaque parcelle de l'exploitation. Il constitue un outil dans le cadre de la traçabilité. Dans le contexte de l'auto-contrôle, il est adapté et peut servir de « fiche parcellaire ». Une nouvelle version sera normalement éditée pour le mois d'août 2022.

3°) Fiche culture

Pages 58 à 63

[fiche culture épeautre (58) triticales (59) seigle (60) avoine de printemps (61) froment de printemps et alternatif (62) orge de printemps (63)]

4°) Travaux

Page 64


PRINCIPAUX STADES REPERES DE LA VEGETATION EN CEREALES

(A)	(B)	(C)	Brève description	Dates approximatives de la réalisation des stades en région limoneuse			
				Froment d'hiver	Escourgeon et orge d'hiver	Froment de printemps et avoine	Orge de printemps
21	E	2	<u>Début tallage</u> : début de l'apparition des tiges secondaires ou talles.	Fin d'hiver - début mars	Avant et pendant l'hiver	Fonction de la date de semis et des conditions	
26	F	3	<u>Plein tallage</u> : plante étalée. Formation de nombreuses talles.	15-30 mars	01-10 mars		
30	G	4	<u>Fin tallage</u> : la tige maîtresse se redresse, les talles commencent à se redresser. <u>Redressement</u> : talles dressés. Début d'allongement.	10-15 avril	20-25 mars	Particulières de la saison.	
30	H	5	<u>Epi à 1 cm</u> : fin redressement. Tout début du 1 ^{er} nœud.	20 avril	5-10 avril		
31	I	6	<u>Premier nœud</u> : se forme au ras du sol. Décelabe au toucher.	5-10 mai	20-25 avril	15-20 mai	15-20 mai
32	J	7	<u>Deuxième nœud</u> : apparition du 2 ^{ème} nœud sur la tige principale.	12-15 mai	1-5 mai	Fin mai	20-25 mai
37	K	8	<u>Apparition de la dernière feuille</u> : encore enroulée. Tige enflée au niveau de l'épi.	20-25 mai	6-10 mai	Début juin	1-10 juin
39	L	9	<u>Ligule visible</u> : ligule (oreillette) développée. Début de l'apparition des barbes pour l'escourgeon.	25 mai 1 juin	15 mai	-	-
50	N	10,1	<u>Epi émerge</u> : le sommet de l'épi sort de sa gaine.	Début juin	20-25 mai	10-15 juin	15-20 juin
58	O	10,5	<u>Epi dégagé</u> : épi complètement dégagé de sa gaine.	10-15 juin	Début juin	-	-

(A) : Echelle selon Zadoks

(B) : Echelle selon Keller et Baggiolini



(C) : Echelle selon Feekes et Large



	Levée	Une feuille	Deux feuilles	Trois feuilles
BBCH	09	11	12	13
Zadoks	10	11	12	13
Keller et Baggioloni	A	B	C	D
Feekes et Large	1	1	1	1



	Début tallage	Plein tallage	Fin tallage
BBCH	21	22 à 28	29
Zadoks	21	26	30
Keller et Baggioloni	E	F	H
Feekes et Large	2	3	4



	Redressement	Premier nœud
BBCH	30	31
Zadoks	30	31
Keller et Baggioloni	H	I
Feekes et Large	5	6

4 Stades repères



	Deuxième nœud	Apparition de la dernière feuille
BBCH	32	37
Zadoks	32	37
Keller et Baggioloni	J	K
Feekes et Large	7	8



	Ligule visible	Gaine éclatée	Emergence de l'épi
BBCH	39	47	51
Zadoks	39	45	50
Keller et Baggioloni	L	M	N
Feekes et Large	9	10	10.1



	Epi dégagé	Début floraison
BBCH	59	61
Zadoks	58	60
Keller et Baggioloni	O	P
Feekes et Large	10.5	10.5.1

Liste des PPP retirés en 2021(*)

* : Les produits à base de mancozèbe retirés le 04-01-2022 ont également été ajouté ci-dessous

Nom commercial	N° d'autorisation	Fonction	Date de retrait
AGRO-MANCOZEB 80 WP	8841P/B	Fongicide	04/01/2022
ATTA-FLEX	1259P/P	Fongicide	30/04/2021
AVADEX 480	7785P/B	Herbicide	30/06/2021
AVTAR 75 WG	10865P/B	Fongicide	04/01/2022
BULLDOCK 25 EC	9835P/B	Insecticide	30/04/2021
BUTTRESS	9819P/B	Herbicide	31/07/2021
CLOPYREX 100 SL	1238P/P	Herbicide	30/04/2021
COMET	9605P/B	Fongicide	30/09/2021
CORBEL	7313P/B	Fongicide	31/10/2021
CUADRO 250 EC	10571P/B	Régulateur de croissance	31/08/2021
CYFLUFENABEL	1108P/P	Fongicide	31/03/2021
DEQUIMAN MZ WG	8606P/B	Fongicide	04/01/2022
DIEGO	1348P/P	Herbicide	24/06/2021
DITHANE WG	8055P/B	Fongicide	04/01/2022
FANATYL	1127P/P	Fongicide	19/10/2021
FLONICABEL	1109P/P	Insecticide	30/06/2021
FURY 100 EW	8476P/B	Insecticide	31/08/2021
INDOFIL M-45	9036P/B	Fongicide	04/01/2022
INTER DIFLUFENICAN 500 SC	967P/P	Herbicide	30/06/2021
INTER THIOFANAAT	1242P/P	Fongicide	19/10/2021
LAMBADA	1174P/P	Insecticide	31/12/2021
MANCOPLUS 75 WG	9621P/B	Fongicide	04/01/2022
MANFIL 75 WG	9478P/B	Fongicide	04/01/2022
MASTANA SC	9110P/B	Fongicide	04/01/2022
MAXADEN	1362P/P	Herbicide	31/12/2021
METEOR 369 SL	8559P/B	Régulateur de croissance	30/06/2021
MINUET	9636P/B	Insecticide	31/08/2021
MONDIUM	9718P/B	Régulateur de croissance	30/06/2021
PENNCOZEB	7512P/B	Fongicide	04/01/2022
PENNCOZEB WG	7949P/B	Fongicide	04/01/2022
PROZEB	8864P/B	Fongicide	04/01/2022
PROZEB EXTRA 75 WG	10215P/B	Fongicide	04/01/2022
PUMAS EW	8986P/B	Herbicide	31/12/2021
SPOUTNIK	9113P/B	Fongicide	04/01/2022
TEKKEN	10596P/B	Herbicide	31/12/2021
TOPSIN M 500 SC	7057P/B	Fongicide	19/10/2021
TOPSIN M 70 WG	8666P/B	Fongicide	19/10/2021
TRIDEX WG	10228P/B	Fongicide	04/01/2022
TRIDEX WP	10226P/B	Fongicide	04/01/2022
TRIMANOC WG	10823P/B	Fongicide	04/01/2022

Liste herbicides

Attention : La liste des produits phytopharmaceutiques autorisés en Belgique pour les cultures de céréales peut évoluer au cours du temps. Seules les informations reprises sur le site web www.phytoweb.be sont les sources de référence des produits phytopharmaceutiques autorisés en Belgique. Il est donc nécessaire de consulter ce site.

Le Comité régional PHYTO ne peut en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dégâts, directs ou indirects, pouvant survenir suite à l'application des données fournies dans ces listes, à une attitude inadéquate ou à une négligence.

Pour toute question relative à cette liste, veuillez nous contacter via crphyto@uclouvain.be ou au 010/47 37 54. Plus d'infos sur la législation des produits phytopharmaceutiques en Wallonie sur notre site internet de l'asbl CORDER : www.corder.be/fr/crphyto.

Légende symbole des listes :

Ga = Graminées annuelles ; Da = Dicotylées annuelles ; Dv = Dicotylées vivaces

Cb = Capselle bourse à pasteur ; Ch = Chardons ; Cd = Chiendent ; Co = Composées ; Cr = Crucifères ; Cq = Coquelicot ; Fa = Folle avoine ; Gg = Gaillardet ; Jv = Jouet du vent ; La = Lamier ; Mc = Matricaire camomille ; Mo = Mouron des oiseaux ; Pa = Pâturin annuel ; Vc = Vulpin des champs ; Ve = Véronique ; Vi = Violette

* La dose maximum varie selon le type de sols et la culture.

** En mélange avec une huile de colza estérifiée ou une autre huile minérale.

*** En mélange avec un engrais azoté liquide, un mouillant ou un autre herbicide, la dose autorisée doit être diminuée de moitié.

° Avec action phytoprotectrice

°° Les mélanges avec d'autres herbicides, huiles ou surfactants pourraient réduire l'efficacité du produit ou augmenter sa phytotoxicité.

°°° Le produit ne peut pas être mélangé avec des urées substituées.

† Mode de pénétration racinaire (R) et/ou foliaire (F)

†† Tenir compte de la sensibilité variétale. Pour les produits à base de clopyralide, ne pas les appliquer entre la mi-octobre et la mi-mars (protection des eaux souterraines).
Un délai d'attente avant la culture suivante est parfois obligatoire.

††† Pour les céréales d'hiver, buses anti-dérive de minimum 90%. Uniquement pour lutter contre les vulpins des champs et jouets du vent. Entre le 1er septembre et le 1er mars, utilisation interdite si des légumes, fruits ou aromates encore à récolter sont présents sur les parcelles adjacentes. Utilisation interdite en Flandre occidentale, à l'exception de la région agricole des polders.

Légende mode d'action :

1. Inhibition de l'acetyl-coenzyme A carboxylase
2. Inhibition de l'acétolactase synthase
3. Inhibition de l'assemblage des microtubules
4. Imitateur de l'auxine
5. Inhibition de la photosynthèse PS II - Serine 264
6. Inhibition de la photosynthèse PS II - Histidine 215
12. Inhibition de la biosynthèse des caroténoïdes
14. Inhibition de la protoporphyrinogène oxidase
15. Inhibition de la biosynthèse des longues chaînes d'acides gras
23. Inhibition de l'organisation des microtubules
32. Inhibition de la solanesyl diphosphate synthase

Comment utiliser ces listes ?

Afin de faciliter l'alternance des modes d'action pour éviter l'apparition de résistances, les produits sont classés par substance active et/ou famille chimique, et ensuite par ordre alphabétique.

Les produits retirés du marché sont en gras-italique et leur date limite d'utilisation est inscrite entre parenthèses.

Les cases vides correspondent à des usages qui ne sont pas autorisés.

Plusieurs abréviations sont utilisées. En voici la signification :

- Colonne formulation :

CS : Suspension de capsules	RB : Appât prêt à l'emploi
DC : Concentré dispersable	SC : Suspension concentrée
EC : Concentré émulsionnable	SE : Suspo-émulsion
ES : Émulsion pour traitement de semences	SG : Granulés solubles dans l'eau
EW : Émulsion aqueuse	SL : Concentré soluble
FS : Suspension concentrée pour traitement des semences	WG : Granulés à disperser dans l'eau
GR : Granulé	WP : Poudre mouillable
ME : Micro-émulsion	ZC : Suspension de capsules + suspension concentrée
OD : Dispersion huileuse	

- Colonne AB : Autorisé en agriculture biologique (mentionné par une croix)
- Colonne cultures : H : céréale d'hiver / P : céréale de printemps
- Colonne stade d'application BBCH : La signification des stades BBCH peut être consultée dans les pages « Stades repères 2 » à « Stades repères 6 ».
- Colonne nombre d'applications maximum :
 - /an : nombre d'applications sur une même terre pendant une année quoiqu'elle porte comme cultures
 - /culture : nombre d'applications par culture
- Colonne DAR : délai avant récolte

Voici les différentes listes de PPP autorisés en date du 07/02/2022 :

- **Agents anti-moussants, mouillants, phytoprotecteurs et additifs**
- **Herbicides** (pré-émergence, levée-début tallage et tallage-dernière feuille)
- **Régulateurs de croissance/antiverges**
- **Fongicides**
- **Traitements fongicides/insecticides de semences**
- **Insecticides** (contre pucerons d'hiver/été et cécidomyies)
- **Molluscicides**
- **NOUVEAU : Blé dur, engrain/petit épeautre, amidonnier et blé poulard/barbu**

L'ensemble de ces tableaux sont mis à jour régulièrement et consultable sur le site <https://centrespilotes.be/cp/cepipoc/>. Vous pouvez également nous communiquer vos remarques ou question au 0499/63.99.00 ou à l'adresse suivante : rb.cepipoc@centrespilotes.be

De plus, des questions à propos de la législation sur les produits phytopharmaceutiques en Wallonie ?

Consultez notre nouveau site internet www.corder.be/crphyto ou contactez-nous au 010/47.37.54 ou via l'adresse mail crphyto@uclouvain.be.

Agents anti-moussants, mouillants, phytoprotecteurs d'herbicides et additifs

*Respecter un délai avant récolte de 7 jours																												
Nom commercial	Composition	N° autorisation	Formulation	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications max.	AB	Mélange	Culture(s)												Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive							
									Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine		Interculture		le long des fossés de bord de route, de plans d'eau drainage		50%	75%	90%	50%
									Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver				
Additifs																												
ACTIROB B	812 g/l huile de colza estérifiée	866SP/B	EC	Post-ém.	1 l/ha	2	-	Herbicide anti-graminées	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1					
CANTOR	790 g/l triglycérade éthoxyle 10OE	9881P/B	EC	Post-ém.	0,15 l/100 l pour 150 l/ha	-	-	Herbicide ALS (HRAC B)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1					
GAON	636,3 g/l huile de colza estérifiée	9629P/B	EW	Post-ém.	1 l pour 150 l/ha	1*	-	Herbicide	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	1	1					
MERO	733 g/l huile de colza estérifiée	9871P/B	EC	Post-ém.	1 l/ha	2	-	Herbicide anti-graminées	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1					
NATOL	812 g/l huile de colza estérifiée	9298P/B	EC	Post-ém.	1 l/ha	2	-	Herbicide anti-graminées	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1					
PROTEX-OIL 850 g/l (31-12-2022)	850 g/l huile paraffinique	7887P/B	EC	-	5 l/ha	-	-	Herbicide										x	6	6	1	1	1					
TIPO	842 g/l huile de colza estérifiée	9447P/B	EC	Post-ém.	1 l/ha	-	-	Herbicide	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1					
VEGETOP	812 g/l huile de colza estérifiée	9294P/B	EC	Post-ém.	1 l/ha	2	-	Herbicide anti-graminées	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1					
ZARADO	636,3 g/l huile de colza estérifiée	10242P/B	EW	Post-ém.	1 l pour 150 l/ha	1*	-	Herbicide	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	1	1					
Agents anti-moussants																												
ANTI-SCHUIM/ANTI-MOUSSE	200 g/l diméthylpolysiloxane	10118P/B	EW	-	1,4 ml/100 l bouillie	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1					
CASS'MOUSSE	294 g/l diméthylpolysiloxane	9736P/B					-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1					
Eliciteurs																												
ESTIM	12,5 g/l COS-OGA	11162P/B	SL	-	2 l/ha	5	X	-					x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1					
Mouillants																												
TRS 2	600 g/l huile de tournesol	10054P/B	EC	Post-ém.	0,5 l/ha pour 150 l/ha	-	-	Herbicide		x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1					
Phytoprotecteurs d'herbicides																												
AZ500	500 g/l isoxaben	7573P/B	SC	01-13	0,2 l/ha	1/an	-	Herbicide anti-dicot. ann.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	5	2	1					
INTER ISOXABEN 500		1100P/P					-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	5	2	1					
VSM ISOXABEN		1372P/P					-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	5	2	1					

Herbicides

SENSIBILITE DES PRINCIPALES ADVENTICES AUX HERBICIDES LES PLUS UTILISES

Produits	N° du produit	FOLLE AVOINE	JOUEUR DU VENT	PATURIN (1)	VULPIN	ALCHEMILLE	CAPSELLE BOURSE A PASTEUR	CHENOPODE BLANC	CHRYSAANTHEME DES MOISSONS	COQUELICOT	FUMETERRE	GAILLET GRATTERON	LAMIER POURPRE	MATRICARE CAMOMILLE	MOURONS DES OISEAUX	PENSEE SAUVAGE	RENONCULE	RENOUEE FAUX LISERON	RENOUEE DES OISEAUX	RENOUEE PERSIC. OU LAPATHIF.	SENE MOUTARDE DES CHAMPS	SENECON	TABOURET DES CHAMPS	VERONIQUE DE PERSE	VERONIQUE FEUILLE DE LIERRE	CHARDON DES CHAMPS	LATERON DES CHAMPS
Lutte contre les GRAMINEES																											
AVADEX FACTOR	7	AS	S	S	S	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
AXIAL et AXEO	8	S	S	S	S	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
PUMA S EW et FOXTROT	30 et 68	S	AS	(1)	S	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Lutte contre les GRAMINEES et les DICOTYLEES ANNUELLES																											
ARCHIPEL STAR	4	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
ATTRIBUT	5	AS	S	AS	S	R	S	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	S	R	S	R	R	R	
CAPRI	17	S	S	S	S	AR	S			R	R	AS	R	AS	S	S	S	AS	S	S	S	S	S	S	AS	AS	
CAPRI DUO	18	S	S	S	S	AR	S			R	R	S	R	S	S	S	S	AS	S	S	S	S	S	S	AS	S	
CAPRI TWIN et BROADWAY	19	S	S	S	S	AR	S			S	R	R	S	S	S	S	S	AS	S	S	S	S	S	S	AS	S	
chlortoluron	55	AS	AS	S	R	AS	AS	AS	AS	S	R	R	AR	S	AS	R	AS	AS	AR	AR	AS	S	S	R	R	R	
DEFI et autres produits	25	AR	S	S	S	S	S	R	AR	S	AS	S	AR	S	AS	S	AR	AR	AR	AR	AR	R	S	S	S	R	
flufenacet	10, 27 et 31		S	S	S						R	AR		AS	AS								R	AR	R		
GORDIUM STAR	32	AR	S	S	R	AS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	AS	AS	AS	S	S	S	S	S	S	
HEROLD SC et autres produits	35		S	S	S	S	S	S	S	S	S	AS	S	AS	S	S	S	AS	AS	AS	S	S	S	S	S	R	
HUSSAR ULTRA	36	AR	S	S	R	AS	S	S	S	S	AS	S	AS	S	S	AS	S	AS	AS	AS	S	S	S	S	AS	S	
JURA	37	AR	S	S	S	S	S	S	AS	AR	S	AS	S	AR	S	AS	S	AS	AS	AS	AS	S	S	S	S	R	
KALENKO	38	S	S	S	S	S	S	S	S	AS	AS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	AS	S	S	AS	AS	
LIBERATOR et GIDDO	40	S	S	S	S	S	S	S	S	S	AS	S	AS	S	S	S	S	AS	AS	AS	S	S	S	S	S	R	
MALIBU	41	AR	S	S	S	S	S	S	S	S	S	AS	S	AS	S	S	S	AS	AS	AS	S	AS	S	S	S	R	
MATENO DUO	42	AR	AS	AS	R	AS	S	S	AS	S	S	S	AR	S	S	S	S	AS	AS	AS	S	S	S	S	S	R	
MERKUR SC	46	AR	S	S	S	S	S	S	S	S	S	AS	S	AS	S	S	S	AS	AS	AS	S	S	S	S	S	R	
MONITOR	47	AS	S	S	AR	AS	S	AS	AS	R	AS	S	R	S	S	R	S	AS	AS	AS	S	R	S	R	R	R	
OTHELLO	51	S	S	S	S	AS	S	AS	S	AS	AR	AS	S	S	S	S	S	AS	S	AS	S	AS	S	S	AS	AS	
PONTOS	64		S	S	S	S	S	S	S	S	S	AS	S	AS	S	S	S	S	AS	AS	S	S	S	S	S	R	
QUIRINUS	69		S	S	S	S	S	S	S	S	S	AS	S	AS	S	S	S	AS	AS	AS	S	S	S	S	S	R	
REXADE TRIO	70	AS	S	R	AS	AR	S	S	S	S	S	S	S	S	S	AS	S	S	AS	S	S	AS	S	S	AR	S	
SIGMA FLEX	72	S	S	S	S	AS	S	AS	AS	AR	R	AR	AR	AR	AS	AR	AR	AS	AS	AS	S	R	S	AR	R	AR	
SIGMA MAXX	73	S	S	S	S	AS	S	AS	AS	AS	AR	AR	AS	AS	S	AS	AS	AS	AS	AS	S	AR	S	AR	AR	AS	
SIGMA PLUS et SIGMA SUPRA	74	S	S	S	S	S	S	S	S	S	AS	S	S	S	S	AS	S	AS	S	AS	S	AS	S	AS	AR	AS	
SIGMA STAR	75	S	S	S	S	S	S	S	S	S	AS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
TRINITY	81	AS	AS	AS	S	AS	S	S	AS	S	AS	AR	S	S	S	S	S	AS	AS	S	AS	S	S	S	S	R	
Lutte contre les DICOTYLEES ANNUELLES																											
2,4-D	82	R	R	R	R	R	AS	S	R	AS	AR	R	AS	R	AR	AR	AS	R	R	R	S	AS	S	R	R	AS	
ALLIE et autres produits	1 et 62	R	AR	R	R	AS	S	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	AS	AS	AS	S	S	S	AS	R	S	
ALLIE EXPRESS	2	R	R	R	R	S	S	S	S	S	AS	S	S	S	S	S	S	AS	AS	AS	S	S	S	S	AS	S	
ALLIE STAR et BOUDHA	3 et 15	R	AR	R	R	AS	S	S	S	S	AS	AR	S	S	S	AS	S	AS	AS	S	S	S	S	AS	S	S	
AURORA 40 WG	6	R	R	R	R	R	S	S	R	S	AR	S	S	R	R	AS	R	R	R	R	S	R	AR	S	AS	R	
AZ 500	9	R	R	R	R	S	S	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	AS	S	AS	S	S	S	S	S	R	
BEFLEX	11	R	AS	R	R	S	S	S	S	AS	S	S	S	S	S	S	S	AR	S	AS	S	S	S	S	AR		
BIATHLON	12	R	R	R	R	AS	S	S	S	AS	S	S	S	S	S	AR	S	AS	AS	AS	S	S	S	S	S	AS	
BIATHLON DUO	13	R	R	R	R	S	S	S	S	AS	S	S	S	S	S	AR	S	S	AS	AS	S	S	S	S	S	AS	
CAMEO et autres produits	16 et 63	R	R	R	R	AS	S	S	AR	S	AS	AR	S	S	S	AS	S	AS	AR	S	S	S	S	AS	R	S	
CHEKKER	20	R	AR	AR	R	AS	S	AS	AS	AS	AR	S	AS	S	S	AR	AS	AS	AS	AS	S	AS	S	AR	AR	AS	
CONNEX et HARMONY M	23 et 34	R	AR	AR	R	S	S	S	S	S	S	AR	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	AS	AR	S	
CROUPIER OD	24	R	R	R	R	AS	S	S	S	S	R	S	S	S	S	AS	S	S	AS	AS	S	S	S	AS	AR	S	
diflufenican	50 et 57	AR	AR	R	R	AS	S	AS	AS	AR	S	AR	S	S	S	AS	S	AS	AS	AS	AS	S	S	S	AR	R	
DUPLOSAN et DUPLOSAN KV-P	26	R	R	R	R	R	AS	S	R	S	R	S	R	R	S	R	S	R	AR	AR	S	R	S	AR	AR	AR	
FLAME DUO	28	R	R	R	R	S	S	S	AS	S	AS	S	S	S	S	AS	S	S	AS	S	S	S	S	S	R	S	
fluroxypyr	58, 59 et 77	R	R	R	R	R	R	R	R	R	S	AR	R	S	S	R	S	AS	AS	AR	R	S	AR	AR	R	R	
FOX 480 SC	29	R	R	R	R	AS	R	R	AS	AR	R	S	S	S	S	S	S	AR	S	AS	S	AS	AR	S	S		
GRATIL	33	R	R	R	R	R	AS	R	R	AR	R	S	R	AS	R	R	R	AR	AR	R	S	R	R	R	R	R	
MATRIGON et autres produits	43, 44, 45 et 22	R	R	R	R	R	R	R	S	R	R	R	R	S	R	R	R	AR	AR	R	R	S	R	R	R	S	
mcpa	60	R	R	R	R	R	AS	S	R	AS	R	R	R	R	R	R	S	R	R	R	S	AS	S	AR	AR	AS	
OMNERA LQM	49	R	R	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	AS	AR	S	
PILOTI	52	R	R	R	R	AS	S	S	S	S	AS	AR	S	S	S	AS	S	AS	AS	AS	S	S	S	AS	AR	S	
PIXARO EC et autres produits	53	R	R	R	R	AR	AS	S	R	AS	S	S	S	R	S	R	S	S	AR	AS	R	R	AR	AR	R	R	
pendimethaline	48 et 78	AR	AS	AR	AR	AS	S	S	R	S	AS	AR	S	AR	S	S	S	AS	AS	S	AS	R	S	S	S	R	
PLATFORM S	54	R	R	R	R	R	S	S	R	S	AS	S	S	R	AS	S	AS	AS	AS	AS	S	AS	S	S	S	R	
PRIMSTAR et autres produits	39, 65 et 76	R	R	R	R	S	S	R	AS	S	R	S	AS	S	S	R	S	S	AR	AR	S	AS	S	R	R	AS	
PRIMUS et autres produits	66	R	R	R	R	S	S	R	AS	AS	R	S	S	S	S	R	S	S	AS	AS	S	S	S	R	R	AS	
PRIMUS PERFECT	67	R	R	R	R	S	S	R	S	AS	R	S	R	S	S	R	S	S	AS	AS	S	S	S	R	R	S	
SARACEN DELTA	71	AR	AR	R	R	S	S	AS	AS	AS	S	S	S	S	S	AS	S	S	AS	AS	S	AS	S	AS	AR	AS	
TREVISTAR	79	R	R	R	R	S	AR	S	S	AS	S	AS	S	S	S	R	S	S	AS	S	S	S	AR	AR	S	S	
TREZAC	80	R	R	R	R	AS	S	S	S	S	S	S	R	AS	S	AR	AS	AS	AS	AR	R	R	AR	AR	R	AS	
ZYPAR et autres produits	83	R	R	R	R	AR	S	S	AS	S	S	S	S	S	S	R	S	S	AR	AR	S	AS	S	AR	AR	R	
Lutte contre les DICOTYLEES ANNUELLES et VIVACES																											
BOFIX	14	R	R	R	R	R	S	S	S	S	S	S	AR	AS	S	R	S	S	S	S	S	S	S	AR	AR	S	
dichlorprop-p + MCPA + mecoprop-p	56	R	R	R	R	R	S	S	R	S	S	S	AS	AR	S	R	S	AS	AS	AS	S	AS	S	AS	AS	S	
mcpa + 2,4-D	21 et 61	R	R	R	R	R	AS	S	R	AS	R	R	R	R	R	R	S	R	R	R	S	AS	S	AR	AR	S	

S= sensible AS= Assez sensible AR= assez résistant R= résistant

(1) fenoxaprop + safener. Paturin commun: S; Paturin annuel: R

MODE D'ACTION ET FAMILLE CHIMIQUE DES SUBSTANCES ACTIVES

Modes d'action	Familles chimiques	Substances actives	Mode de pénétration	Produits
1 Inhibiteurs de l' ACCase	Aryloxyphenoxypropionates	fenoxaprop	foliaire	30, 68
	Phénylpyrazolines	pinoxaden	foliaire	8
2 Inhibiteurs de l'ALS	Sulfonylurées	amidosulfuron	foliaire	20, 33, 74
		iodosulfuron	foliaire	4, 20, 32, 36, 38, 51, 73, 74, 75
		mesosulfuron	foliaire	4, 38, 51, 72, 73, 74, 75
		metosulfuron	foliaire	1, 2, 3, 15, 23, 24, 34, 49, 52, 62
		sulfosulfuron	racinaire et foliaire	47
		thifensulfuron	foliaire	23, 34, 49
		tribenuron	foliaire	3, 15, 16, 28, 63
		tritosulfuron	foliaire	12, 13
	Triazolinones	propoxycarbazone	racinaire	5, 72
		thiacarbazone	racinaire et foliaire	4, 32, 75
	Triazolopyrimidines	florasulam	foliaire	15, 18, 19, 28, 39, 65, 66, 67, 70, 71, 76, 79, 83
3 Inhibiteurs de l'assemblage des microtubules		pyroxulam	foliaire	17, 18, 19, 70
4 Phytohormones	Dinitroanilines	pendimethaline	racinaire	41, 46, 48, 78, 81
	Acides phenoxy-carboxyliques	2,4-D	foliaire	21, 61, 82
		dichlorprop-p	foliaire	56
		MCPA	foliaire	14, 21, 56, 60, 61
		mecoprop-p	foliaire	26, 54, 56
	Acides pyridine-carboxyliques	aminopyralide	foliaire	80
		clopyralide	foliaire	14, 22, 43, 44, 45, 67, 79
		fluroxypyr	foliaire	14, 24, 39, 49, 53, 58, 59, 65, 76, 77, 79
	Arylpicolinates	halauxifen	foliaire	53, 70, 80, 83
5 Inhibiteurs de la photosynthèse	Urées	chlortoluron	racinaire	55, 81
12 Inhibiteurs de la biosynthèse des caroténoïdes	Phényl ethers	befluthamide	racinaire et foliaire	11
		diflufenican	racinaire et foliaire	35, 37, 38, 40, 42, 46, 50, 51, 52, 57, 71, 81
		picolinatén	foliaire	64, 69
14 Inhibiteurs de la PPO	Diphenylethers	bifenox	foliaire	29
	Triazolinones	carfentrazone	foliaire	2, 6, 54
15 Inhibiteurs de la biosynthèse des lipides	Oxyacetamides	flufenacet	racinaire	10, 27, 31, 35, 40, 41, 46, 64, 69
	Thiocarbamates	prosulfocarbe	racinaire	25, 37
		triallate	racinaire	7
29 Inhibiteurs de la biosynthèse de cellulose	Benzamides	isoxaben	racinaire	9
32 Inhibiteurs de la biosynthèse des caroténoïdes	Diphenylethers	acifluorfen	racinaire	42

COMPOSITION DES PRODUITS

	Noms commerciaux	Substances actives	Composition	Mode d'action	Voir produit N°
1	ALLIE et autres produits	metsulfuron	SG: 20%	2	62
2	ALLIE EXPRESS	carfentrazone + metsulfuron	WG: 40 + 10 %	14 + 2	
3	ALLIE STAR	tribenuron + metsulfuron	SG: 22,2 + 11,1 %	2 + 2	15
4	ARCHIPEL STAR	mesosulfuron + iodosulfuron + thiencazone + safener	WG: 4,5 + 4,5 + 3,75 + 13,5%	2 + 2 + 2	75
5	ATTRIBUT	propoxycarbazone	SG: 70%	2	
6	AURORA 40 WG	carfentrazone	WG: 40%	14	
7	AVADEX FACTOR	triallate	CS: 450 g/L	15	
8	AXIAL et AXEO	pinoxaden + safener	EC: 50 + 12,5 g/L	1	
9	AZ 500	isoxaben	SC: 500 g/L	29	
10	BATTLE et autres produits	flufenacet	SC: 500 g/L	15	27, 31
11	BEFLEX et GOUPI	befluthamide	SC: 500 g/L	12	
12	BIATHLON	tritosulfuron	WG: 71,4 %	2	
13	BIATHLON DUO	tritosulfuron + florasulam	WG: 71,4 + 5,4 %	2 + 2	
14	BOFIX	mcpa + fluroxypyr + clopyralide	EW: 200 + 40 + 20 g/L	4 + 4 + 4	
15	BOUDHA	tribenuron + metsulfuron	WG: 25 + 25 %	2 + 2	3
16	CAMEO et ASSYNT	tribenuron	SG: 50%	2	63
17	CAPRI	pyroxusulam + safener	WG: 7,5 + 7,5 %	2	
18	CAPRI DUO	pyroxusulam + florasulam + safener	WG: 7,1 + 1,5 + 7,1%	2 + 2	19
19	CAPRI TWIN et BROADWAY	pyroxusulam + florasulam + safener	WG: 6,8 + 2,3 + 6,8 %	2 + 2	18
20	CHEKKER	amidosulfuron + iodosulfuron + safener	WG: 12,5 + 1,25 + 12,5 %	2 + 2	
21	CIRAN	mcpa + 2,4-D	SL: 315 + 360 g/L	4 + 4	61
22	CLAP	clopyralide	SL: 300 g/L	4	43, 44, 45
23	CONNEX et RACING EXTRA	thifensulfuron + metsulfuron	WG: 68,2 + 6,8	2 + 2	34
24	CROUPIER OD	fluroxypyr + metsulfuron	OD: 225 + 9 g/L	4 + 2	
25	DEFI et autres produits	prosulfocarbe	EC: 800 g/L	15	
26	DUPLOSAN et DUPLOSAN KV-P	mecoprop-p	SL: 600 g/L	4	
27	FENCE	flufenacet	SC: 480 g/L	15	10, 31
28	FLAME DUO	tribenuron + florasulam	SG: 25 + 10%	2 + 2	
29	FOX 480 SC	bifenox	SC: 480 g/L	14	
30	FOXTROT	fenoxaprop + safener	EW: 69 + 35 g/L	1	68
31	GLOSSET 600 SC et GLOSSET SC	flufenacet	SC: 600 g/L	15	10, 27
32	GORDIUM STAR	iodosulfuron + thiencazone + safener	WG: 3,3 + 2,5 + 15	2 + 2	
33	GRATIL	amidosulfuron	WG: 75%	2	
34	HARMONY M	thifensulfuron + metsulfuron	SG: 40 + 4 %	2 + 2	23
35	HEROLD SC et autres produits	flufenacet + diflufenican	SC: 400 + 200 g/L	15 + 12	40
36	HUSSAR ULTRA	iodosulfuron + safener	OD: 100 + 300 g/L	2	
37	JURA	prosulfocarbe + diflufenican	EC: 667 + 14 g/L	15 + 12	
38	KALENKOA	diflufenican + mesosulfuron + iodosulfuron + safener	OD: 120 + 9 + 7,5 + 27 g/L	12 + 2 + 2	51
39	KART et autres produits	fluroxypyr + florasulam	SE: 100 + 1 g/L	4 + 2	65, 76
40	LIBERATOR et GIDDO	flufenacet + diflufenican	SC: 400 + 100 g/L	15 + 12	35
41	MALIBU	pendimethaline + flufenacet	EC: 300 + 60 g/L	3 + 15	
42	MATENO DUO	acifluorfen + diflufenican	SC: 500 + 100 g/L	32 + 12	
43	MATRIGON et autres produits	clopyralide	SL: 100 g/L	4	23, 44, 45
44	MATRIGON 600 et CLIOPHAR 600 SL	clopyralide	SL: 600 g/L	4	23, 43, 45
45	MATRIGON SG	clopyralide	SG: 72%	4	23, 43, 44
46	MERKUR SC	pendimethaline + flufenacet + diflufenican	SC: 333 + 80 + 20 g/L	3 + 15 + 12	
47	MONITOR	sulfosulfuron	WG: 80%	2	
48	MOST MICRO et RAMPAR	pendimethaline	CS: 365 g/L	3	78
49	OMNERA LQM	fluroxypyr + thifensulfuron + metsulfuron	OD: 135 + 30 + 5 g/L	4 + 2 + 2	
50	OSSETIA et autres produits	diflufenican	WG: 50%	12	57
51	OTHELLO	diflufenican + mesosulfuron + iodosulfuron + safener	OD: 50 + 7,5 + 2,5 + 22,5 g/L	12 + 2 + 2	38
52	PILOTI	diflufenican + metsulfuron	WG: 60 + 6 %	12 + 2	
53	PIXARO EC et autres produits	fluroxypyr + halauxifen + safener	EC: 280 + 12 + 12	4 + 4	
54	PLATFORM S	mecoprop-p + carfentrazone	SG: 60 + 1,5 %	4 + 14	
55	Plusieurs produits	chlortoluron	SC: 500 g/L	5	
56	Plusieurs produits	dichlorprop-p + mcpa + mecoprop-p	SL: 310 + 160 + 130 g/L	4 + 4 + 4	
57	Plusieurs produits	diflufenican	SC: 500 g/L	12	50
58	Plusieurs produits	fluroxypyr	EC: 180 g/L	4	59, 77
59	Plusieurs produits	fluroxypyr	EC: 200 g/L	4	58, 77
60	Plusieurs produits	mcpa	SL: 750 g/L	4	
61	Plusieurs produits	mcpa + 2,4-D	SL: 345 + 345 g/L	4 + 4	21
62	Plusieurs produits	metsulfuron	WG: 20%	2	1
63	Plusieurs produits	tribenuron	WG: 75%	2	16
64	PONTOS	flufenacet + picolinafen	SC: 240 + 100 g/L	15 + 12	69
65	PRIMSTAR et autres produits	fluroxypyr + florasulam	SE: 100 + 2,5 g/L	4 + 2	39, 76
66	PRIMUS et autres produits	florasulam	SC: 50 g/L	2	
67	PRIMUS PERFECT	clopyralide + florasulam	SC: 300 + 25 g/L	4 + 2	
68	PUMA S EW	fenoxaprop + safener	EW: 69 + 19 g/L	1	30
69	QUIRINUS	flufenacet + picolinafen	SC: 240 + 50 g/L	15 + 12	64
70	REXADE TRIO	pyroxusulam + florasulam + halauxifen + safener	WG: 24 + 10 + 10 + 21%	2 + 2 + 4	
71	SARACEN DELTA	diflufenican + florasulam	SC: 500 + 50 g/L	12 + 2	
72	SIGMA FLEX	propoxycarbazone + mesosulfuron + safener	WG: 6,75 + 4,5 + 9%	2 + 2	
73	SIGMA MAXX	mesosulfuron + iodosulfuron + safener	OD: 10 + 2 + 30 g/L	2 + 2	
74	SIGMA PLUS et SIGMA SUPRA	amidosulfuron + mesosulfuron + iodosulfuron + safener	WG: 5 + 3 + 1 + 9%	2 + 2 + 2	
75	SIGMA STAR	mesosulfuron + thiencazone + iodosulfuron + safener	WG: 4,5 + 2,25 + 0,9 + 13,5%	2 + 2 + 2	4
76	SPITFIRE	fluroxypyr + florasulam	SE: 100 + 5 g/L	4 + 2	39, 65
77	STARANE FORTE	fluroxypyr	EC: 333 g/L	4	58, 59
78	STOMP AQUA	pendimethaline	CS: 455 g/L	3	48
79	TREVISTAR	fluroxypyr + clopyralide + florasulam	EC: 144 + 80 + 2,5 g/L	4 + 4 + 2	
80	TREZAC	halauxifen + aminopyralide + safener	EC: 21 + 25 + 30 g/L	4 + 4	
81	TRINITY	pendimethaline + chlortoluron + diflufenican	SC: 300 + 250 + 40 g/L	3 + 5 + 12	
82	U-46-D-500	2,4-D	SL: 500 g/L	4	
83	ZYPAR et autres produits	halauxifen + florasulam + safener	OD: 6 + 5 + 6 g/L	4 + 2	

Herbicides (1/3) - Pré-semis à pré-émergence (BBCH00-08)																													
Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration ^a	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications (et intervalle)	Culture(s)								Cible(s)		Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive									
										Froment				Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine		Graminées annuelles	Dicotylées	le long des cours et plans d'eau		le long des fossés de bord de route, de drainage			
										Hiver		Printemps		Hiver		Printemps		Hiver		Printemps									
										Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver										
AAKO CHLORTOLURON 500 SC ^{¶¶}	500 g/l chlortoluron	5	55	9549P/B	SC	R	01-08	3 l/ha*	1/an	x	x	x					Ga	Da	6	6	2	2	1	90%	75%	50%	90%		
ADÉLFO	800 g/l prosulfocarbe ^{¶¶¶¶}	15	25	10351P/B	EC	R	01-08	5 l/ha ^{***}	1/culture	x		x	x				Ga	Da	6	6	6	5	2	1				1	
ARNOLD	400 g/l flufenacet 200 g/l diflufenican	15 12	35	10877P/B 1351P/P	SC	R/F	00-08	0,6 l/ha	1/culture	x	x	x					Ga	Da	30	20	10	30	20	10	10				
AVADEX FACTOR	450 g/l triallate	15	7	10947P/B	CS	R	Pré-semis 01-08	3,6 l/ha	1/culture	x	x						Ga		-	-	20	-	-	20					
BATTLE	500 g/l flufenacet	15	10	10886P/B	SC	R	00-08	0,5 l/ha	1	x	x						Ga		-	-	10	-	-	10					
BEFLEX	500 g/l béflubutamide	12	11	10124P/B	SC	R/F	01-08	0,4 l/ha	1	x	x	x					Da		30	20	10	30	20	10					
CARPATUS	400 g/l flufenacet 200 g/l diflufenican	15 12	35	11084P/B	SC	R/F	00-07	0,6 l/ha	1/culture	x	x	x					Ga	Da	6	6	6	5	2	1					
CHLORTOLURON 500 SC ^{¶¶}	500 g/l chlortoluron	5	55	7980P/B	SC	R	01-08	3 l/ha*	1/an	x	x	x					Ga	Da	6	6	6	2	2	1					
CHLORTOLURON 500 SC ^{¶¶}	500 g/l chlortoluron	5	55	1311P/P	SC	R	01-08	3 l/ha*	1/an	x	x	x					Ga	Da	10	6	6	10	5	1					
DEFI	800 g/l prosulfocarbe ^{¶¶¶¶}	15	25	7864P/B	EC	R	00-08	5 l/ha ^{***}	1/culture	x	x	x	x				Ga	Da	6	6	6	1	1	1					
DIFLANIL 500 SC	500 g/l diflufenican	12	57	9408P/B	SC	R/F	01-08	0,375 l/ha	1/an	x	x	x					Da		10	6	6	10	5	1					
DIFLI	500 g/l diflufenican	12	57	10934P/B	SC	R/F	01-08	0,375 l/ha	1	x	x	x	x				Da		6	6	6	2	2	1					
FIDOX	800 g/l prosulfocarbe ^{¶¶¶¶}	15	25	10515P/B	EC	R	01-08	5 l/ha ^{***}	1/culture	x	x	x	x				Ga	Da	6	6	6	5	2	1					
FIDOX EC	800 g/l prosulfocarbe ^{¶¶¶¶}	15	25	9680P/B	EC	R	01-08	5 l/ha ^{***}	1/culture	x	x	x	x				Ga	Da	6	6	6	5	2	1					
FLUENT 500 SC	500 g/l flufenacet	15	10	10988P/B 1352P/P	SC	R	00-08	0,4 l/ha	1	x	x	x					Ga		6	6	6	5	2	1					
FLUPICOS 340 SC	240 g/l flufenacet 100 g/l picolinafén	15 12	64	1408P/P	SC	R/F	00-09	1 l/ha	1	x	x						Ga		10	6	6	10	5	1					
GIDDO	400 g/l flufenacet 100 g/l diflufenican	15 12	40	10806P/B	SC	R/F	00-08	0,6 l/ha	1/culture	x	x						Ga	Da	6	6	6	5	2	1					
GLOSSET SC	600 g/l flufenacet	15	31	11009P/B	SC	R	00-07	0,2 l/ha	1/culture								Ga		6	6	6	5	2	1					
GOUPIL	500 g/l béflubutamide	12	11	11071P/B	SC	R/F	01-08	0,4 l/ha	1	x	x						Da		30	20	10	30	20	10					
JURA	667 g/l prosulfocarbe 14 g/l diflufenican	15 12	37	10633P/B	EC	R/F	01-08	4 l/ha ^{***}	1/culture	x	x						Ga	Da	30	20	10	30	20	10					
LENTIPUR 500 SC ^{¶¶}	500 g/l chlortoluron	5	55	8875P/B	SC	R	01-08	3 l/ha*	1/an	x	x	x					Ga	Da	10	6	6	10	5	1					
LIBERATOR	400 g/l flufenacet 100 g/l diflufenican	5	40	9681P/B	SC	R/F	00-08	0,6 l/ha	1/culture	x	x						Ga	Da	6	6	6	5	2	1					
MALIBU	300 g/l pendiméthaline 60 g/l flufenacet	3 15	41	9316P/B	EC	R	00-09	2,5 l/ha	1/an	x	x						Ga	Da	10	6	6	10	5	1					
MATENO DUO	500 g/l acionifène 100 g/l diflufenican	32 12	42	11094P/B 1409P/P	SC	R/F	00-07	0,7 l/ha 0,35 l/ha	1/culture		x						Jv Pa	Da Pa	20 10	6	20	10	5	5					
										x							Da Pa	Dv Pa	10 6	6	10	5	1						

Nom commercial	Composition	Mode d'action	Code	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration ^a	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	Culture(s)												Cible(s)		Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										Orge	Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine		Graminées annuelles	Dicotylées	le long des cours et plans d'eau	le long des fossés de bord de route, de drainage																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
											Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps					Annuelles	Vivaces	50%	75%	90%	50%	75%	90%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MOST MICRO	365 g/l pendiméthaline	3	48	10330P/B	CS	R	01-08	2,2 l/ha	1/culture	x								Da	10	6	6	10	5	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Herbicides (2/3) - Levée à début tallage (BBCH09-20)																							
Nom commercial	Composition	Code	Mode d'action	N° autorisation	Formulation*	Mode de pénétration*	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	Culture(s)						Cible(s)		Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Orge	Froment	Triticale	Epeautre	Séigle	Avoine	Graminées annuelles	Dicotylées	50%	75%	90%	le long des cours et plans d'eau	le long des fossés de bord de route, de drainage	
ACCURATE	20 g/l metsulfuron-méthyle	1	2	9551P/B	WG	F	10-19	0,02 kg/ha**	1/an		x	x		x		Da	Dv	-	6	6	-	1	1
	20 g/l metsulfuron-méthyle	1	2	9450P/B	SG	F	12-20	0,03 kg/ha**	1	x	x		x			Da	Dv	6	6	6	1	1	
	22,2 % metsulfuron-méthyle	3	2	9795P/B	SG	F	12-20	0,045 kg/ha	1	x	x		x			Da	Dv	6	6	6	1	1	
	11,1 % tribénuron-méthyle	3	2	10877P/B																			
ALLIE STAR	400 g/l flufenacet	35	15	10877P/B	SC	R/F	09-13	0,6 l/ha	1/culture	x	x		x			Ga	Da	30	20	10	30	20	
	200 g/l diflufenican	12	12	1351P/P																			
ARNOLD	7,5 g/l cloquintocet-méthyl	53	pp	10517P/B	EC	F	10-20	1 l/ha	1/an	x	x		x			Da		30	20	10	30	20	
	7,8 g/l halauxifène-méthyle	4	4				13-20	0,8 l/ha			x		x										
ARYLEX TECHNICAL*	400 g/l flufenacet	35	15	1354P/P	SC	R/F	11-13	0,6 l/ha	1/culture	x	x		x			Ga	Da	10	6	6	5	2	
	200 g/l diflufenican	12	12																				
	12,5 g/l cloquintocet-méthyl	8	pp	9603P/B	EC	F	13-20	0,9 l/ha	1/culture	x	x	x	x			Fa	Jv	6	6	6	1	1	
	50 g/l pinoxaden	1	1													Vc							
AXEO*	12,5 g/l cloquintocet-méthyl	8	pp	9602P/B	EC	F	13-20	0,9 l/ha	1/culture	x	x	x	x			Fa	Jv	6	6	6	1	1	
	50 g/l pinoxaden	1	1													Vc							
	500 g/l flufenacet	10	15	10886P/B	SC	R	09-21	0,5 l/ha	1	x	x		x			Ga		-	-	10	-	10	
	500 g/l bétflubutamide	11	12	10124P/B	SC/R	F	09-20	0,4 l/ha	1	x	x		x			Da		30	20	10	30	20	
BIATHILON	71,4 % tritosulfuron	12	2	9779P/B	WG	F	13-20	0,07 kg/ha	1		x	x				Da		6	6	6	1	1	
	5,4 % florasulamé	13	2	10263P/B	WG	F	13-20	0,04 kg/ha	1/culture		x	x				Da							
	71,4 % tritosulfuron	2	2					0,07 kg/ha			x	x				Gg	Dv						
	25 % metsulfuron-méthyle	15	2	10190P/B	WG	F	12-19	0,008 kg/ha**	1/an	x	x		x			Da		-	6	-	-	1	
BOUDHA	25 % tribénuron-méthyle	16	2	9581P/B	SG	F	12-20	0,045 kg/ha	1	x	x		x			Da		6	6	6	2	2	
	50 g/l tribénuron-méthyle	16	2	9581P/B	SG	F	12-20	0,045 kg/ha	1	x	x		x			Da		6	6	6	2	2	
	400 g/l flufenacet	35	15	11084P/B	SC	R/F	11-13	0,6 l/ha	1/culture	x	x		x			Ga	Da	20	10	6	20	10	
	200 g/l diflufenican	12	12																				
CARPATUS	68,2 % thifensulfuron-méthyle	23	2	9814P/B	WG	F	12-20	0,06 kg/ha	1	x	x	x	x			Da		6	6	6	1	1	
	6,8 % metsulfuron-méthyle	2	2																				
	225 g/l fluroxypyr	24	4	10957P/B	OD	F	13-19	0,45 l/ha	1/an	x	x					Da		-	20	10	-	20	
	9 g/l metsulfuron-méthyle	24	2																				
CROUPIER OD	800 g/l prosulfocarbe	25	15	7864P/B	EC	R	09-13	5 l/ha***	1/culture	x	x	x	x			Ga	Da	6	6	6	1	1	
	20 g/l metsulfuron-méthyle	1	2	9552P/B	WG	F	10-19	0,02 kg/ha	1/an	x	x		x			Da	Dv	-	6	-	-	1	
	500 g/l diflufenican	57	12	9408P/B	SC	R/F	09-20	0,375 l/ha	1/an	x	x		x			Da		10	6	6	10	5	
	500 g/l diflufenican	57	12	10934P/B	SC	R/F	09-20	0,375 l/ha	1								6	6	6	2	2	1	
DEFI	800 g/l prosulfocarbe	25	15	7864P/B	EC	R	09-13	5 l/ha***	1/culture	x	x	x	x			Ga	Da	6	6	6	2	2	
	20 g/l metsulfuron-méthyle	1	2	9552P/B	WG	F	10-19	0,02 kg/ha	1/an	x	x		x			Da	Dv	-	6	-	-	1	
	500 g/l diflufenican	57	12	9408P/B	SC	R/F	09-20	0,375 l/ha	1														
	500 g/l diflufenican	57	12	10934P/B	SC	R/F	09-20	0,375 l/ha	1	x	x		x			Da		6	6	6	2	2	
DEFI	800 g/l prosulfocarbe	25	15	7864P/B	EC	R	09-13	5 l/ha***	1/culture	x	x	x	x			Ga	Da	6	6	6	5	2	
	20 g/l metsulfuron-méthyle	1	2	9552P/B	WG	F	10-19	0,02 kg/ha	1/an	x	x		x			Da	Dv	-	6	-	-	1	
	500 g/l diflufenican	57	12	9408P/B	SC	R/F	09-20	0,375 l/ha	1														
	500 g/l diflufenican	57	12	10934P/B	SC	R/F	09-20	0,375 l/ha	1	x	x		x			Da		6	6	6	5	2	
FENCE	480 g/l flufenacet	27	15	10523P/B	SC	R	11-13	0,5 l/ha	1/culture	x	x	x	x			Ga	Da	6	6	6	5	2	
	800 g/l prosulfocarbe	25	15	10515P/B	EC	R	09-13	5 l/ha***	1/culture	x	x	x	x			Ga	Da	6	6	6	5	2	
	20 g/l metsulfuron-méthyle	1	2	9482P/B	SG	F	12-20	0,03 kg/ha**	1	x	x		x			Da	Dv	-	6	-	-	1	
	20 g/l metsulfuron-méthyle	1	2	9482P/B	SG	F	12-20	0,03 kg/ha**	1	x	x		x			Da	Dv	-	6	-	-	1	

[illegible]

16 Herbicides

Nom commercial	Composition	Code	Mode d'action	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration ^a	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications (et intervalle)	Culture(s)												Cible(s)		Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive								
										Froment						Triticale		Epeautre		Seigle		Avoine		Graminées annuelles	Dicotylées	le long des cours et plans d'eau		le long des fossés de bord de route, de drainage				
										Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver			50%	75%	90%	50%	75%	90%	
MERTIL	400 g/l flufenacet 200 g/l diflufenican	35 12	15	10833P/B	SC	R/F	11-13	0,6 l/ha	1/culture	x	x	x		x					Ga	Da	10	6	6	10	5	1						
METRO SG	20 % metsulfuron-méthyle	1	2	10143P/B	SG	F	12-20	0,03 kg/ha ^{oo}	1	x	x	x		x					Da	Dv	6	6	6	5	2	1						
METSULFURON 20% WG	20 % metsulfuron-méthyle	1	2	1335P/P	WG	F	10-19	0,02 kg/ha	1/an				x		x				Da	Dv	-	-	6	-	-	1						
MILOT	800 g/l prosulfocarbe ^{¶¶¶}	25	15	11149P/B	EC	R	12-13	5 l/ha ^{ooo}	1/culture	x	x	x	x	x					Ga	Da	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MONITOR	80 % sulfosufuron	47	2	9158P/B	WG	R/F	13-21	0,0125 kg/ha ^{**} 2 (4 sem.)			x	x	x						Ga	Da	6	6	6	2	2	1						
MOST MICRO	365 g/l pendiméthaline	48	3	10330P/B	CS	R	09-20	2,2 l/ha	1/culture	x									Da		10	6	6	10	5	1						
NACETO	400 g/l flufenacet 200 g/l diflufenican	35 12	15	10603P/B	SC	R/F	11-13	0,6 l/ha	1/culture	x	x	x							Ga	Da	10	6	6	10	5	1						
OSSETIA	50 % diflufenican	50	12	10622P/B	WG	R/F	09-20	0,24 kg/ha 0,125 kg/ha	1	x	x	x	x	x					Da		10	6	6	10	5	1						
PIXXARO EC ^o	280 g/l fluroxypyr 12,5 g/l halauxifène-méthyle	53 2	4	10575P/B	EC	F	13-20	0,25 l/ha 0,5 l/ha	1/an		x				x				Da	Dv	-	6	6	-	2	1						
PONTOS	240 g/l flufenacet 100 g/l picolinafen	64 12	15	10604P/B	SC	R/F	10-20	0,5 l/ha	1/culture	x	x	x	x	x					Ga	Da	10	6	6	10	5	1						
PRIMUS	50 g/l florasulame	66	2	9074P/B	SC	F	14-20	0,05 l/ha ^{***} 0,1 l/ha ^{***}	1/culture	x	x	x	x	x	x				Da		6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRIMUS PERFECT ^{¶¶¶}	300 g/l clopyralide 25 g/l florasulame	67 2	4	10317P/B	SC	F	14-20	0,15 l/ha	1/an										Gg													
QUIRINUS	240 g/l flufenacet 50 g/l picolinafen	69 12	15	10605P/B	SC	R/F	09-20	1 l/ha	1/culture	x	x	x	x	x					Da		-	-	6	-	-	1						
RACING EXTRA	68 % thifensulfuron-méthyle 7 % metsulfuron-méthyle	23 2	2	10021P/B	WG	F	12-20	0,06 kg/ha	1	x	x	x	x	x	x				Ga	Da	6	6	6	5	2	1						
RAMPAR	365 g/l pendiméthaline	48	3	10590P/B	CS	R	09-20	2,2 l/ha	1/culture	x									Da		10	6	6	10	5	1						
RELANCE	400 g/l flufenacet 200 g/l diflufenican	35 12	15	10719P/B	SC	R/F	11-13	0,6 l/ha	1/culture	x	x	x							Ga	Da	10	6	6	10	5	1						
RENITAR ^o	6,25 g/l halauxifène-méthyle 6 g/l cloquintocet-méxyl	83 pp	4	10656P/B	OD	F	11-20	0,5 l/ha 0,75 l/ha	1/an	x	x	x	x	x	x				Da		-	-	6	-	-	1						
ROXY EC	800 g/l prosulfocarbe ^{¶¶¶}	25	15	9684P/B	EC	R	09-13	5 l/ha ^{ooo}	1/culture	x	x	x	x	x	x				Ga	Da	6	6	6	5	2	1						
SARACEN DELTA	500 g/l diflufenican 50 g/l florasulame	35 2	12	10386P/B	SC	R/F	12-22	0,075 l/ha	1/an	x	x	x							Da		-	-	10	-	-	10						
SATURNE 500 SC	500 g/l diflufenican	57	12	1196P/P	SC	R/F	09-20	0,375 l/ha 0,125 l/ha	1/an	x	x	x	x	x					Da		30	20	10	30	20	10						
SAVVY	20 % metsulfuron-méthyle	1	2	9980P/B	WG	F	10-19	0,02 kg/ha ^{oo}	1/an	x	x	x							Da	Dv	-	-	6	-	-	1						

Nom commercial	Composition	Code	Mode d'action	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration ^a	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications (et intervalle)	Culture(s)												Cible(s)				Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive				
										Orge	Froment	Triticale	Epeautre	Seigle	Avoine	Graminées annuelles	Annuelles	Vivaces												
SEIBOLD	400 g/l flufenacet 200 g/l diflufenican	35	15 12	11030P/B	SC	R/F	10-13	0,6 l/ha	1/culture	x	x	x	x	x		Ga	Da									50%	75%	90%	10	
SEMPRA	500 g/l diflufenican	57	12	10088P/B	SC	R/F	09-20	0,375 l/ha	1	x	x	x	x	x			Da									6	6	2	2	1
SPOW	800 g/l prosulfocarb ^{¶¶¶}	25	15	10167P/B	EC	R	09-13	5 l/ha ^{***}	1/culture	x	x	x	x	x		Ga	Da								6	6	1	1	1	
STOMP AQUA (30-06-2022)	455 g/l pendiméthaline	78	3	957P/P	CS	R	09-20 11-12	2 l/ha	1/culture	x	x	x	x	x			Da								10	6	6	5	2	1
STOMP AQUA	455 g/l pendiméthaline	78	3	9839P/B	CS	R	09-20 11-12	2 l/ha	1/culture	x	x	x	x	x			Da								10	6	6	5	2	1
SUNFIRE	500 g/l flufenacet	10	15	10938P/B	SC	R	09-20	0,36 l/ha	1/culture	x	x	x		x		Jv Pa									10	6	6	10	5	1
TEKKEN [®] (30-06-2022)	280 g/l fluoxypyr 12,5 g/l halauxifène-	-	4 4	10596P/B	EC	F	13-20	0,48 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha	1/an							Vc									-	6	6	-	2	1
THEIA	50 % diflufenican	50	12	10819P/B	WG	R/F	09-20	0,125 kg/ha 0,24 kg/ha	1	x	x	x	x	x			Da								10	6	6	10	5	1
TOUCAN	500 g/l diflufenican	57	12	9653P/B	SC	R/F	09-20	0,375 l/ha	1/an	x	x	x	x	x			Da								10	6	6	10	5	1
TREVISTAR ^{¶¶¶}	100 g/l fluoxypyr 80 g/l clopyralide 2,5 g/l florasulame	79	4 2	9799P/B	EC	F	13-20	1 l/ha	1	x	x	x	x	x			Da	Dv							-	6	-	-	-	1
TREZAC [®]	31,3 g/l halauxifène-méthyle 30 g/l cloquintocet-méthyl	80	pp	10791P/B	EC	F	13-20	0,2 l/ha	1	x	x	x					Da								-	6	6	-	1	1
TRIMONO	80 % sulfosulfuron	47	4	1172P/P	WG	R/F	13-21	0,0125 kg/ha ^{**}	2 (4 sem.)	x	x	x	x			Ga	Da							6	6	6	2	2	1	
TRINITY ^{¶¶¶}	300 g/l pendiméthaline 250 g/l chlorotoluron	81	3 5	10572P/B	SC	R/F	09-20	2 l/ha	1/an	x	x	x		x		Ga	Da							10	6	6	10	5	1	
TUSK	50 % diflufenican	50	12	10992P/B	WG	R/F	09-20	0,125 kg/ha 0,24 kg/ha	1	x	x	x	x	x			Da								10	6	6	10	5	1
UPTON	50 g/l florasulame	66	2	11053P/B	SC	F	14-20	0,05 l/ha ^{***} 0,1 l/ha ^{***}	1/culture	x	x	x	x	x			Da								-	6	-	-	-	1
WOPRO SULFOSULFURON 80	80 % sulfosulfuron	47	2	1406P/P	WG	R/F	13-21	12,5 g/ha ^{**}	1	x	x	x	x			Ga	Da							6	6	6	2	2	1	
ZYPAR [®]	6,25 g/l halauxifène-méthyle 6 g/l cloquintocet-méthyl	83	2 pp	10655P/B	OD	F	11-20 13-20	0,5 l/ha 0,75 l/ha	1/an	x	x	x	x	x			Da							-	6	-	-	-	-	1

[illegible]

Nom commercial	Composition	Code	Mode d'action	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration ^a	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)												Cible(s)	Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																								Graminées annuelles	Dicotylées	le long des cours et plans d'eau		le long des fossés de bord de route, de drainage																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											Orge	Froment	Triticale	Epeautre	Seigle	Avoine	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver				Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver

Nom commercial	Composition	Code	Mode d'action	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration ^a	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée		Nombre d'applications (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)												Cible(s)	Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								Dose maximum autorisée	1 /ha			Graminées annuelles								Dicotylées					le long des cours et plans d'eau		le long des fossés de bord de route, de drainage																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												Orge	Froment	Triticale	Epeautre	Seigle	Avoine	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver		Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PIXXARO EC°	280 g/l fluoxypyr 12,5 g/l halauxifène-méthyle 12 g/l cloquintocet-méxyl	53	4	10575P/B EC	F	21-30	1/an	0,25 l/ha	1/cult.	-	1/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Nom commercial	Composition	Code	Mode d'action	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration ^a	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)												Cible(s)		Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
											Froment						Triticale		Epeautre		Seigle		Avoine	Graminées annuelles	Dicotylées	le long des cours et plans d'eau		le long des fossés de bord de route, de drainage																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
											Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver			Printemps	50%	75%	90%	50%	75%	90%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SAVY	20 % metsulfuron-méthyle	1	2	9980P/B	WG	F	20-29	0,025 kg/ha**	1/an	-		Hiver	X	X	X	X	X		Da	Dv	-	-	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Nom commercial	Composition	Code	Mode d'action	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration ^a	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée		Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)												Cible(s)		Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive								
								Dose maximum autorisée				Culture(s)								Cible(s)		le long des cours et plans d'eau		le long des fossés de bord de route, de drainage										
								Dose maximum autorisée				Froment				Triticale		Epeautre		Seigle		Avoine		Graminées annuelles		Dicotylées		le long des cours et plans d'eau		le long des fossés de bord de route, de drainage				
								Hiver	Printemps			Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Annuelles	Vivaces	50%	75%	90%	50%	75%	90%	
TOUCAN	500 g/l diflufenican	57	12	9653P/B	SC	R/F	21-29 26-29	0,375 l/ha 0,125 l/ha	1/an	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
TREVISTAR¶¶	100 g/l fluoxypyr 80 g/l clopyralide 2,5 g/l florasulame	79	4	9799P/B	EC	F	21-39	1 l/ha	1	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	1
TREZAC°	31,3 g/l halauxifène-méthyle 30 g/l cloquintocet-méxyl 25 g/l aminopyralide	80	pp 4	10791P/B	EC	F	21-32	0,2 l/ha	1	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	1
TRIBE	75 % tribénuron-méthyle	63	2	10843P/B	WG	F	20-39	0,02 kg/ha	1	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
TRIMONO	80 % sulfosulfuron	47	2	1172P/P	WG	R/F	31-32	0,0125 kg/ha**	2	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
TRINITY¶¶	300 g/l pendiméthaline 250 g/l chlorotoluron	81	3 5	10572P/B	SC	R/F	21-29	2 l/ha	1/an	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
TUSK	50 % diflufenican	50	12	10992P/B	WG	R/F	21-29	0,125 kg/ha 0,24 kg/ha	1	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
U 46 M	750 g/l MCPA	60	4	8439P/B	SL	F	29-32	2 l/ha	1	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
U 46 M750	750 g/l MCPA	60	4	9310P/B 1391P/P	SL	F	29-32	2 l/ha	1	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
U-46-D-500	500 g/l 2,4-D	82	4	7013P/B	SL	F	29-32	1,6 l/ha	1/cult.	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
UPTON	50 g/l florasulame	66	2	11053P/B	SC	F	21-32	0,05 l/ha*** 0,1 l/ha***	1/cult.	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	1
VIVENDI 100 SL¶¶	100 g/l clopyralide	43	4	9356P/B	SL	F	29-31	0,9 l/ha	1/an	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
WOPRO SULFOSULFURON 80	80 % sulfosulfuron	47	2	1406P/P	WG	R/F	21-31 31-32	12,5 g/ha** 25 g/ha**	1	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
ZYPAR°	6,25 g/l halauxifène-méthyle 6 g/l cloquintocet-méxyl 5 g/l florasulame	83	4 pp 2	10655P/B	OD	F	21-30 21-32 33-45	0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha	1/an	50		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	1

Sensibilité variétale au Chlortoluron

Réalisation CePiCOP avec la participation du Landbouwcentrum Granen (LCG vzw) et des semenciers

EPEAUTRE

Peu de données sont disponibles concernant l'épeautre. En cas de traitement à base de chlortoluron, se renseigner préalablement auprès du fournisseur.

FROMENT D'HIVER

VARIETES **TOLERANTES** AU CHLORTOLURON

Les listes des variétés de froment d'hiver tolérantes et sensibles au *chlortoluron* sont disponibles ci-dessous. L'établissement de ces listes n'est pas chose aisée et l'information peut provenir de différentes sources : essais du CRA-W, données d'obteneurs, données d'autres Centres de vulgarisation... Si une variété ne s'y trouve pas, c'est que l'information ne nous est pas connue. Il vaut dès lors mieux éviter d'appliquer du *chlortoluron*. La liste des variétés tolérantes est fournie à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité en cas de manque de sélectivité.

DERNIERE MISE A JOUR FEVRIER 2020.

Complément de liste* variétés tolérantes au chlortoluron, information de firmes :

* Cette liste est fournie à titre indicatif, notre responsabilité ne peut y être engagée, ces variétés n'ayant pas été testées par nos soins (nous n'en connaissons pas le protocole).

Albert – Arezzo – Auckland – Avatar – Avignon – Bernstein – Boregar – Camp Remy – Cellule – Chevignon – Childeric – Complice – Creek – Crossway – Cubitus – Dekan – Diderot – Edgar – Evina – Faustus – Garantius – Gedser – Graham – Homeros – Hybery – Hyking – Hymack – Hysun – Imposanto – Informer – Istabracq – Johnson – KWS Dacanto – KWS Dorset – KWS Extase – KWS Ozon – KWS Salix – KWS Smart – Lektri – LG Initial – LG Vertical – Mentor – Moschus – Mulan – Mutic – Pionier – Porthus – Ragnar – Reflection – RGT Gravity – RGT Reform – RGT Texaco – Rustic – Safari – Sahara – Skyscraper – Suffolk – Sokal – Solehio – Stereo – Sy Epsom – Tobak – Tybalt – Unicum

FROMENT D'HIVER

VARIETTES **SENSIBLES** AU CHLORTOLURON

Complément de liste* variétés sensibles au chlortoluron, information de firmes :

Alcides – Alpha – Altamont – Anapolis – Atomic – Benchmark – Bergamo – Britannia – Campesino – Concret – Corvus – Crusoe – Diantha – Elixer – Expert – Fortis – Furlong – Granamax – Granny – Gustav – Hastings – Henrik – Hyperion – Hyscore – JB Asano – KWS Talent – LG Mocca – Limabel – Linus – Manitou – Meister – Milor – Olympus – Orpheus – Razzano – RGT Mondio – RGT Producto – RGT Sacramento – Rubisko – Salomo – Tabasco – Triumph – Valdo – WPB Calgary – WPB Durand

Pour toutes autres variétés que celles citées dans ces listes, on ne dispose pas de données. En conséquence, il faut éviter d'utiliser du chlortoluron sur ces variétés. Pour des variétés plus anciennes, consultez les précédents Livre Blanc céréales.

FONGICIDES : EPEAUTRE – FROMENT – ORGE – SEIGLE – TRITICALE

Les différents fongicides à pulvériser, autorisés en Belgique pour lutter contre les maladies des céréales sont présentés dans les tableaux suivants :

Orge et escourgeon / Epeautre, froment, seigle et triticales / Avoine

Les fongicides appliqués par traitement des semences font l'objet de tableaux spécifiques (Traitements des semences). Des tableaux spécifiques « fongicides rouille jaune » ou « fongicide fusariose » sont également disponibles sur le site du CePiCOP

Des recommandations pratiques quant à l'utilisation des fongicides figurent dans la rubrique « Protection contre les maladies » (pages blanches ci-avant).

En fonction de la, ou des niveaux de pression en maladies dans votre culture et du stade atteint par la céréale, il vous sera possible sur base des conseils qui y sont développés :

- de décider de l'opportunité d'effectuer un traitement ;
- de choisir les produits les plus efficaces pour le réaliser.

Avertissements CePiCOP-Actualités-Céréales

Grâce à une collaboration entre le CARAH, CPL Végémar, CRA-W, CORDER (UCL), OPA qualité Ciney, ULiège Gx-ABT, et de services extérieurs de la DGARNE, l'évolution de la pression des maladies est suivie par le **CePiCOP** tout au long de la saison. **Ces informations sont disponibles gratuitement** (pour les agriculteurs) au travers des avertissements. Ces avertissements sont disponibles sur le site Centrespilotes.be. De plus, grâce à l'inscription sur ce site, les avertissements vous seront également communiqués par mail.

Commentaires préalables :

- La résistance du piétin-verse au thiophanate-méthyl peut être très fréquente.

Fongicides épeautre, froments, seigle et triticales

- L'efficacité du mancozèbe sur rouille brune ou jaune est très inférieure à celle de triazoles ou de strobilurines.
- Les strobilurines (azoxystrobine, dimoxystrobine, fluoxastrobine, pyraclostrobine, trifloxystrobine) ne fonctionnent plus sur la septoriose.
- Les « SDHI » autorisées en céréales sont des substances actives de la famille des carboxamides (bixafen, boscalid, fluxapyroxad aussi appelé Xémium, isopyrazam).

Légende : WP :	Poudre mouillable	EC :	Solution émulsionnable
SC :	Suspension concentrée	SL :	Concentré soluble
SE :	Suspo-émulsion	EW :	Emulsion aqueuse
WG :	Granulés à disperser	ME :	Micro-émulsion

Fongicides dont l'autorisation va expirer

Une liste des produits phytopharmaceutiques qui ont été retirés en 2021 est présente à la page 5 de ces pages jaunes.

Liste des fongicides utilisables en orge (1/3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Cult.		Cible(s)						Zone tampon (mètres) suivant %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										Orge	Hiver	Plein-verse	Oidium	Ramulariose	Brune	Jaune	Naine	Rhynchosporiose	Fusariose	le long des fossés et plans d'eau	le long des routes de	anti-dérive	le long des fossés et plans d'eau	le long des routes de	anti-dérive	le long des fossés et plans d'eau	le long des routes de	anti-dérive																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AFEX	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10903P/B	SC	-	31-39	1/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x		Oi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

34 Fongicides : orge, escourgeon

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Cult.	Cible(s)				Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive														
											Orge	Piétin-verse	Ramulariose	Rouilles			Rhynchosporiose	Fusariose	le long des cours et plans d'eau										
														Hiver	Printemps	Oï			Brune	Jaune	Naine	Helminthosporiose	Rhynchosporiose	Fusariose	le long des fossés de bord de route, de				
																									50%	75%	90%	50%	75%
COSAVET	Composés inorganiques (gr. M02)	80 % soufre (FU)	8775P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x x x	Oï					6	6	6	1	1	1								
COSINE	Phénylacétamides (gr. 06)	50 g/l cyflufenamide	10060P/B	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	x x x	Oï					6	6	6	1	1	1								
CURBATUR	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10778P/B	EC	-	30-32 31-49	0,8 l/ha 0,8 l/ha	1° 2/an	-	x x x	Pv Oï					6	6	6	2	2	1								
CYFLUMAX	Phénylacétamides (gr. 06)		1393P/P	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	x x x	Oï					6	6	6	1	1	1								
CYFLUMAX (30-09-2022)	Phénylacétamides (gr. 06)	50g/l cyflufenamide	1214P/P	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	x x x	Oï					6	6	6	1	1	1								
DELARO	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	175 g/l prothioconazole 150 g/l trifloxystrobine	9634P/B	SC	-	30-49	0,8 l/ha	2/culture	-	x x x	Oï					6	6	6	2	2	1								
ELATUS PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzoindiflupyr	10601P/B	EC	-	31-45	0,75 l/ha	1/culture	-	x x x		Ra				6	6	6	5	2	1								
EVORAXPRO	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	100 g/l prothioconazole 100 g/l tébuconazole	9970P/B	EC	-	30-32 31-49	1 l/ha 1 l/ha	2/an (14 jours) 2/an (14 jours)	-	x x x	Pv Oï					6	6	6	2	2	1								
EYETAK 450 (30-06-2023)	Imidazoles (G1)	450 g/l prochloraz	11125P/B	EC	-	30-39	1 l/ha	1	-	x x x				He		6	6	6	2	2	1								
FANDANGO	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l prothioconazole 100 g/l fluoxastrobine	9458P/B	EC	-	30-32 31-49	1,25 l/ha 2 l/ha	1*** 2/culture (14 jours)	-	x x x	Pv Oï					20	10	6	20	10	5								
FANDANGO PRO	Strobilurines (C3)	100 g/l fluoxastrobine 50 g/l fluoxastrobine	9723P/B	EC	-	31-32 31-49	2 l/ha 1,75 l/ha	1*** 2/culture	-	x x x	Pv Oï					20	10	6	20	10	5								
FLEXITY	Benzophénones (B6)	300 g/l métrafénone	9511P/B	SC	-	31-59	0,5 l/ha	2/an (21 jours)	-	x x x	Oï					6	6	6	1	1	1								
FLOSUL	Composés inorganiques (gr. M02)	800 g/l soufre (FU)	11022P/B	SC	x	-	5 l/ha	2 (14 jours)	35	x x x	Oï					6	6	6	1	1	1								
GIGANT	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	150 g/l prothioconazole 125 g/l isopropazame	10830P/B	SC	-	31-59	1 l/ha**	2 (14 jours)	-	x x x	Oï	Ra				6	6	6	5	2	1								
GLOBALSTAR AZT 250 SC	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	10793P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture	-	x x x	Oï					6	6	6	2	2	1								
GLOBALSTAR SC	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	10109P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture	-	x x x	Oï					6	6	6	2	2	1								
HELIX	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiromamine	9806P/B	EC	-	30-32 31-49	1,25 l/ha 0,8 l/ha	1° 2/an (14 jours)	-	x x x	Pv Oï					20	10	6	20	10	5								
HELSINKI	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	11157P/B	EC	-	30-32 31-49	0,8 l/ha 0,8 l/ha	2/culture 2/culture	-	x x x	Pv Oï					6	6	6	5	2	1								
HERMOVIT	Composés inorganiques (gr. M02)	80 % soufre (FU)	6676P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x x x	Oï					6	6	6	1	1	1								
IMTRET			10120P/B	EC	-	30-69	2 l/ha	2/culture (21 jours)	-	x x x		Ra				6	6	6	1	1	1								
IMTRET EC	Carboxamides (C2)	62.5 g/l fluxapyroxad	10620P/B	EC	-	31-32 30-69 31-32	2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha	1*** 2/culture (21 jours) 1***	-	x x x	Pv Ra Ra					6	6	6	1	1	1								

Nom commercial	Familie(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BRCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Cult.	Cible(s)						Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive								
											Orge	P létin-verse	Oridium	Ramulirose			Rouilles		Helminthosporiose	Rhynchosporiose	Fusariose	le long des cours et plans d'eau		le long des fossés de bord de route, de	
														Hiver	Printemps	Brune	Jaune	Naine				50%	75%	90%	50%
INPUT	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	9719P/B	EC	-	30-32 31-49	1,25 l/ha	2 2/an (14 jours)	-	X X	Pv	Oi			Rn	He	Rh			6	6	5	2	1	
INTER CYFLUFENAMIDE EW (30-09-2022)	Phénylacétamides (gr. 06)	50 g/l cyflufenamide	1065P/P	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	X X	Oi									6	6	1	1	1	
KESTREL	Triazoles (G1)	160 g/l prothioconazole 80 g/l tébuconazole	10346P/B	EC	-	30-61	1 l/ha	2/culture (14 jours)	-	X X	Pv Oi	Ra	Rj	Rn	He	Rh	Fu			10	6	6	10	5	
KEYNOTE XPRO	Carboxamides (C2) Benzamides (C2)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu)	10996P/B	EC	-	30-61 30-32	1,2 l/ha	1/culture	-	X X		Oi	Ra	Rn	He	Rh				10	6	6	10	5	
KUMULUS WG	Composés inorganiques (gr. M02)	80 % soufre (Fu)	9185P/B	WG	X	-	5 kg/ha	-	-	X X	Oi									6	6	6	1	1	
LENYOR	Triazoles (G1)	100 g/l méfenftruconazole	11041P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	X		Oi	Ra	Rn	He	Rh			6	6	6	2	2		
LIBRAX	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	45 g/l metconazole 62,5 g/l fluxapyroxad	10177P/B	EC	-	25-69	2 l/ha	1/culture	-	X X	Pv Oi	Ra	Rj	Rn	He	Rh			6	6	6	5	2		
MAGNUM	Strobilurine (C3)	200 g/l pyraclostrobine	11087P/B	EC	-	31-39	1,25 l/ha*	2/culture (28 jours)	-	X			Rj	Rn	He				6	6	6	5	2		
MICROTHIOL SPECIAL LIQU	Composés inorganiques (gr. M02)	825 g/l soufre (ACFu)	10929P/B	SC	X	31-59	4,8 l/ha	2 (14 jours)	-	X X	Oi								6	6	6	2	2		
MIRADOR	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	10146P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture	-	X X	Oi			Rn	He				6	6	6	2	2		
MIRADOR EXTRA (30-11-2022)	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	80 g/l cyproconazole 200 g/l azoxystrobine	9502P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/an (21 jours)	-	X X	Oi			Rj	Rn	He	Rh		6	6	6	1	1		
MIZONA	Strobilurines (C3) Carboxamides (C2)	200 g/l pyraclostrobine 30 g/l fluxapyroxad	11065P/B	EC	-	30-69	1 l/ha	2/culture (21 jours)	35						He	Rh			6	6	6	2	2		
NISSODIUM	Phénylacétamides (gr. 06)	50 g/l cyflufenamide	9468P/B	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	X X	Oi								6	6	6	1	1		
NORIOS	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	10907P/B	SC	-	31-39 31-39	1 l/ha 1 l/ha	2/culture (7 jours) 2/culture (7 jours)	35	X	Oi			Rj	Rn	He			6	6	6	5	2		
PATEL 250 EC	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10982P/B	EC	-	30-32 31-49	0,8 l/ha 0,8 l/ha	1*** 2/culture (14 jours)	-	X X	Pv				Rn	He	Rh		6	6	6	5	2		
PECARI 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11163P/B	EC	-	31-49	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	-	X X	Oi				Rn	He	Rh		6	6	6	5	2		
PLEXEO 60	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	10724P/B	SL	-	31-49	1,5 l/ha	1/culture	35	X	Oi			Rn	He	Rh			6	6	6	5	2		
PLEXEO 90	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10897P/B	EC	-	31-49	1 l/ha	1/culture	35	X	Oi			Rn		Rh			6	6	6	5	2		
POLYVERSUM	Microorganisme	Pythium oligandrum M1	11139P/B	WP	X	-	0,1 kg/ha	2 (14 jours)	-		X						Fu		6	6	6	1	1		
PRIAXOR EC	Strobilurines (C3) Carboxamides (C2)	150 g/l pyraclostrobine 75 g/l fluxapyroxad	10616P/B	EC	-	25-59	1,5 l/ha	2/culture (21 jours)	-	X X	Oi	Ra	Rj	Rn	He	Rh			30	20	10	30	20		
PRIDE	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10951P/B	EC	-	30-32 31-49	0,8 l/ha	1*** 1° 2/culture (14 jours)	-	X X	Pv									6	6	6	5	2	

36 Fongicides : orge, escourgeon

Nom commercial	Familie(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Cult.	Cible(s)						Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive								
											Rouilles	Helminthosporiose	Rhynchosporiose	Fusariose	le long des cours et plans d'eau	le long des fossés de bord de route, de	50%	75%	90%	50%	75%	90%			
																							Brune	Jaune	Naine
Orges	Hiver	Printemps	Pv	Pv	Pv	Pv	Pv	Pv	Pv	Pv	Pv	Pv	Pv	Pv	Pv	Pv	Pv	Pv	Pv	Pv	Pv	Pv	Pv		
PRINCE	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	11028P/B	EC	-	30-32	0,8 l/ha	1***	-	x															
PROGER 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11159P/B	EC	-	31-49	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x															
PROFI AZ 250 SC	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobin	11035P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture	-	x															
PROLINE	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	9805P/B	EC	-	30-32	0,8 l/ha	1*	-	x															
PROMINO 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11153P/B	EC	-	31-49	0,65 l/ha	2/culture	-	x															
PROPERTY 180 SC	Benzophénones (B6)	180 g/l pyriofénone	10339P/B	SC	-	30-49	0,5 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x															
PROTENDO 250 EC	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10930P/B	EC	-	30-32	0,8 l/ha	1***	-	x															
PROTENDO 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11111P/B	EC	-	31-49	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x															
PROTIOSTAR	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	11116P/B	EC	-	30-32	0,8 l/ha	3/culture	-	x															
PROTIOSTAR	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	11116P/B	EC	-	31-49	0,8 l/ha	3/culture (14 jours)	-	x															
PYRACLO 200	Strobilurine (C3)	200 g/l pyraclostrobine	1392P/P	EC	-	31-39	1,25 l/ha*	2/culture (28 jours)	-	x															
REVYSTAR	Triazoles (G1)	100 g/l méfentrifluconazole	1396P/P	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x															
REVYSTAR GOLD	Triazoles (G1)	100 g/l méfentrifluconazole 50 g/l fluxapyroxad	11085P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x															
REVYTREX	Carboxamides (C2)	66,7 g/l méfentrifluconazole 66,7 g/l fluxapyroxad	11089P/B 1376P/P	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x															
RIZA EC	Triazoles (G1)	200 g/l tébuconazole	10665P/B	EC	-	31-45	1,25 l/ha	1/culture	-	x															
SILITRA XPRO	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	200 g/l prothioconazole 60 g/l bixafen	10375P/B	EC	-	31-49	1 l/ha	2/an (14 jours)	-	x															
SIMVERIS	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10817P/B	EC	-	31-49	1 l/ha	1/culture	35	x															
SINSTAR	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobin	10441P/B	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture	-	x															
SIRENA	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	10420P/B	SL	-	31-49	1,5 l/ha	1/culture	35	x															
SKYWAY XPRO	Triazoles (G1)	100 g/l prothioconazole	9972P/B	EC	-	30-32	1 l/ha	2/an (14 jours)	-	x															
SOLAGOLD FORTE	Carboxamides (C2)	150 g/l prothioconazole 75 g/l benzovindiflupyr	1277P/P	EC	-	31-45	1 l/ha	1/culture	-	x															
TALENDO	Quinazolines (E1)	200 g/l proquinazide	11048P/B	EC	-	25-49	0,25 l/ha	2 (14 jours)	-	x															
TARCA 250 EW		250 g/l tébuconazole	10236P/B	EW	-	31-45	1 l/ha	1/culture	-	x															
ERA		300 g/l prothioconazole	11078P/B	EC	-	31-49	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x															
TEBUCO 250	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	1178P/P	EC	-	31 ou 45	1,5 l/ha	1/culture	-	x															
TEBUCUR 250 EW		250 g/l tébuconazole	10172P/B	EW	-	31-45	1 l/ha	1/culture	35	x															
					-	61-69	1 l/ha	1/culture	35	x															

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Cult.			Cible(s)						Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive						
										Orge	Piétin-verse	Oidium	Ramulariose	Rouilles			Helminthosporiose	Rhynchosporiose	Fusariose	le long des cours et plans d'eau	le long des fossés de bord de route, de	%			
														Hiver	Printemps	Brune							Jaune	Naïve	
TEBUPHYT	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	1055P/P	EC	-	31 ou 45	1,5 l/ha	1/culture	-	x	x	Oi					Rn	He	Rh	6	6	1	1	1	
TEBUSHA			10766P/B	EW	-	31-45	1 l/ha	1/culture	-	x	x	Oi						Rn	He	Rh	6	6	2	2	1
TEBUSIP			9766P/B	EC	-	31 ou 45	1,5 l/ha	1/culture	-	x	x	Oi						Rn	He	Rh	6	6	1	1	1
THIOVIT JET	Composés inorganiques (gr. M02)	80 % soufre (FU)	5700P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x	Oi								6	6	1	1	1	
TURRET 60	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole 90 g/l metconazole	10923P/B	SL	-	31-49	1,5 l/ha	1/culture	35	x							Rn			6	6	5	2	1	
TURRET 90			10898P/B	EC	-	31-49	1 l/ha	1/culture	35	x	x	Oi					Rn			6	6	5	2	1	
ULTRALINE			250 g/l prothioconazole	11095P/B	EC	-	30-32 31-49	0,8 l/ha	1*** 2/culture (14 jours)	-	x	x	Pv					Rn	He	Rh	6	6	5	2	1
VALPURA XPRO	Carboxamides (C2)	125 g/l bixafen	10871P/B	EC	-	30-61	1 l/ha	1/culture	56	x	x			Ra			Rn	He	Rh	6	6	2	1	1	
VARIANO XPRO	Carboxamides (C2) Strobilurines (C3)	40 g/l bixafen 50 g/l fluoxastrobine 65 g/l bixafen	10327P/B	EC	-	30-61	1,5 l/ha	2/an (14 jours)	-	x		Oi	Ra				Rn	He	Rh	6	6	5	2	1	
			10960P/B	EC	-	30-32 30-61	1,2 l/ha	1/culture		x	x	Pv				Rn	He	Rh							
VELDIG XPRO	Benzamides (C2)	65 g/l fluopyram (fu)					1 l/ha	1/culture		x	x	Oi	Ra				Rn	He	Rh	6	6	5	2	1	
VELOCITY ERA	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	150 g/l prothioconazole 75 g/l benzovindiflupyr	10602P/B	EC	-	31-45	1 l/ha	1/culture	-	x	x		Ra				Rn	He	Rh	6	6	5	2	1	
VERTIPIN	Composés inorganiques (gr. M02)	700 g/l soufre (FU)	11092P/B	SC	x	30-59	6 l/ha	2/culture (10 jours)	-	x	x	Oi								6	6	1	1	1	
VERYDOR	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	100 g/l méfentrifluconazole 50 g/l fluxapyroxad	11101P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x		Ra				Rn	He	Rh	6	6	1	1	1	
VSM CYFLUFENAMIDE 50 E	Phénylacétamides (gr. 06)	50 g/l cyflufenamide	1220P/P	EW	-	31-59	0,5 l/ha	-	-	x	x	Oi								6	6	1	1	1	
VSM ZWAVEL 80 WG (30-06-2022)	Composés inorganiques (gr. M02)	80 % soufre (FU)	1210P/P	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x	Oi								6	6	1	1	1	
ZOXIS	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	10044P/B 1276P/P	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture	-	x	x	Oi					Rn	He		6	6	1	1	1	
ZOXIS (30-06-2022)	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	1153P/P	SC	-	31-39	1 l/ha	2/culture	-	x	x	Oi					Rn	He		6	6	1	1	1	
ZOXIS 250 SC	Strobilurine (C3)	250 g/l azoxystrobine	10684P/B	SC	-	31-39 31-39	1 l/ha 1 l/ha	2/culture (7 jours) 2/culture (7 jours)	35 35	x x		Oi		Rb	Rj	He				6	6	5	2	1	
												Oi		Rb	Rj	He				6	6	1	1	1	

38 Fongicides : froment, seigle, triticales et épeautre

Fongicides autorisés en froment, seigle, triticales et épeautre (2/3)																																			
Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Cultures(s)						Cible(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive											
										Froment		Seigle		Triticale		Epeautre		Piétin-verse	Oridium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	50%	75%	90%	le long des cours et plans bord de route, de drainage	le long des fossés de bord de route, de drainage	50%	75%	90%	
AFFIX	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10903P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (14 jours)	35	X	X	X	X			Oi	Rb	Rj	Sf		Se			6	6	6	5	2	1						
AMISTAR	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	8898P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture	-	X	X	X	X			Oi	Rb	Rj	Sf		Se			6	6	6	2	2	1						
AMISTAR (24-12-2022)	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	1018P/ P	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture	-	X	X	X	X			Oi	Rb	Rj	Sf		Se			6	6	6	2	2	1						
AMPERA	Triazoles (G1) Imidazoles (G1)	267 g/l prochloraz 133 g/l tébuconazole	10312P/ B	EW	-	30-61	1,5 l/ha	2/an (14 jours)	-	X	X					Oi			Sf										1						
						30-69				X	X	X	X																						
						61-69				X	X																								
								X		X																									
AQUINO	Picolinamides (C4)	50 g/l fenpicoxamide	11099P/ B	EC	-	30-69	1,5 l/ha 2 l/ha	1/an	-	X	X	X	X				Rb		Sf																
ARTINA	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	10896P/B	EC	-	31-59	2 l/ha	1/culture	35	X	X					Oi	Rb	Rj	Sf		Se														
ASCRA XPRO	Quin. (E1) Triazoles (G1) Amines (G2)	40 g/l proquinazide 160 g/l prothioconazole 200 g/l spiroxamine	10783P/B	EC	-	65	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	-	X	X	X	X																						
						30-32				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
										X																									
						30-61				X																									
ATACERT	Phénylacétamides (gr. 06)	50 g/l cyfluthénamide	1103P/P	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	X	X	X	X	X		Oi								6	6	6	1	1	1						
ATAK 450 (30-06-2023)	Imidazoles (G1)	450 g/l prochloraz	11126P/B	EC	-	30-39	1 l/ha	1/culture	-	X			X						Sf					6	6	6	2	2	1						
ATTA-BUCO	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	1356P/P	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	X	X		X	X		Oi	Rb	Rj	Sf		Se			6	6	6	2	2	1						
AVIATOR XPRO	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	150 g/l prothioconazole 75 g/l bixafen	9994P/B	EC	-	30-32	1,25 l/ha	2/an	-	X	X		X	X																					
						31-59		2/an		X																									
						31-65		2/an		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
						32-59		2/culture (14 jours)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AZAKA	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10345P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture	-	X	X	X	X			Oi	Rb	Rj	Sf		Se			6	6	6	1	1	1						
AZBANY			10640P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (14 jours)	-	X	X	X	X			Oi	Rb	Rj	Sf		Se			6	6	6	1	1	1						
AZOSHY	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10862P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture	-	X	X	X	X			Oi	Rb	Rj	Sf		Se			6	6	6	5	2	1						
AZOXYSTROBIN 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	1400P/P	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture	-	X	X	X	X			Oi	Rb	Rj	Sf		Se			6	6	6	2	2	1						

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)						Cible(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										Froment		Seigle		Triticale		Epeautre		Piétin-verse	Oidium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps																Hiver	Printemps																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

40 Fongicides : froment, seigle, triticales et épeautre

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)						Cible(s)							Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive								
										Froment	Seigle		Triticales		Epeautre		Pitén-verse	Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau	le long des fossés de bord de route, de drainage	50%	75%	90%	
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver															
COMRADE (30-11-2022)	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	80 g/l cyproconazole 200 g/l tebuconazole	10768P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (21 jours)	-	x					x				Rb	Rj	Sf	Se			10	6	6	10	5	1	
COSAVET	Composés inorganiques (gr. M02)	80 % soufre (FU)	8775P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x	x	x	x	x	x	Oi								6	6	6	1	1	1	
COSINE	Phénylacétamides (gr. Q)	50 g/l cyflufenamide	10060P/B	EW	-	31-32 31-35 32-59	0,5 l/ha	2	1*	x	x	x	x	x	x	x	Pv								6	6	6	1	1	1	
CURBATUR	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10778P/B	EC	-	31-32 31-35 32-59	0,8 l/ha	2/an	35	x							Oi			Rj	Sf		Se	Fu	6	6	6	2	2	1	
CYFLUMAX	Phénylacétamides (gr. Q)	50 g/l cyflufenamide	1393P/P	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	x	x	x	x	x	x	x	Oi								6	6	6	1	1	1	
CYFLUMAX (30-09-2022)	Phénylacétamides (gr. Q)	50 g/l cyflufenamide	1214P/P	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	x	x	x	x	x	x	x	Oi								6	6	6	1	1	1	
DELARO	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	175 g/l prothioconazole 150 g/l tritoxystrobin	9634P/B	SC	-	31-32 31-59	1 l/ha	1*** 2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	Pv			Rb	Rj	Sf		Fu	6	6	6	2	2	1	
DIOPYR	Benzophénones (B6)	180 g/l pyriofénone	10953P/B	SC	-	30-55	0,5 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x						Oi								6	6	6	1	1	1	
ELATUS PLUS	Carboxamides (C2)	100 g/l benzoindiflupyr	10601P/B	EC	-	31-59	0,75 l/ha	1/culture (14 jours)	-	x	x								Rb	Rj	Sf	Se			6	6	6	5	2	1	
EMINENT	Triazoles (G1)	125 g/l tétraconazole	9566P/B	ME	-	31-59	1 l/ha	1/an	-	x									Rb	Rj					6	6	6	1	1	1	
EVORA XPRO	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	100 g/l prothioconazole 100 g/l tébuconazole 75 g/l bixafen	9970P/B	EC	-	30-32 31-59 31-65	1,25 l/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	Pv								6	6	6	2	2	1	
EYETAK 450 (30-06-2023)	Imidazoles (G1)	450 g/l prochloraz	11125P/B	EC	-	30-59	1 l/ha	1/culture (21 jours)	-	x							Pv			Rb	Rj	Sf			6	6	6	2	2	1	
FANDANGO	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	100 g/l prothioconazole 100 g/l fluxastrobin	9458P/B	EC	-	31-32 31-65 32-59	1,5 l/ha	1*** 2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	Pv			Rb	Rj	He	Sf			20	10	6	20	10	5
FANDANGO PRO	Strobilurines (C3)	100 g/l prothioconazole 50 g/l fluxastrobin	9723P/B	EC	-	31-32 31-59 31-65	2 l/ha	1*** 2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	Pv									20	10	6	20	10	5
FLEXITY	Benzophénones (B6)	300 g/l métrifénone	9511P/B	SC	-	31-32 31-59	0,5 l/ha	1*	-	x	x	x	x	x	x	x	Pv			Rb	Rj	Sf	Se	Fu		6	6	6	1	1	1
FLOSUL	Composés inorganiques (gr. M02)	800 g/l soufre (FU)	11022P/B	SC	x	-	5 l/ha	2 (14 jours)	35	x	x	x	x	x	x	x	Oi								6	6	6	1	1	1	

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)						Cible (s)									Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive								
										Froment		Seigle		Triticale		Epeautre		Piétin-verse	Oidium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporose	Septorose (feuilles)	Rhynchosporose	Septorose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau	le long des fossés de bord de route, de drainage	50%	75%	90%		
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Oi	Rb	Rj	Sf			Oi						Rb	Rj
GIGANT	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	150 g/l prothioconazole 125 g/l isoprazam	10830P/B	SC	-	30-69	1 l/ha**	2	-					X	X			Oi	Rb	Rj				6	6	5	2	1					
						61-69		1																									
GLOBALAZTAR AZT 250 SC GLOBALAZTAR SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10793P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture	-					X	X	X	X	Oi	Rb	Rj	Sf			6	6	2	2	1					
			10109P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture							X	X	X	X	Oi	Rb	Rj	Sf			6	6	2	2	1				
HELIX	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	9806P/B	EC	-	31-32	1,25 l/ha	1°	-					X	X	X	X																
						31-59																											
						31-65																											
HELSINKI	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	11157P/B	EC	-	31-32 31-65 32-59	0.8 l/ha	2/culture	35	X													6	6	5	2	1						
HERMOVIT	Composés inorganiques (gr. M02)	80 % soufre (FU)	6676P/B	WG	X	-	5 kg/ha	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	Oi						6	6	1	1	1					
IMTREX	Carboxamides (C2)	62.5 g/l fluxapyroxad	10120P/B	EC	-	30-69	2 l/ha	2/culture (21 jours)	-	X	X			X	X	X	X			Rb	Rj	Sf			6	6	1	1	1				
						31-32			1***			X	X	X	X	X	X	X															
IMTREX EC			10620P/B	EC	-	30-69 31-32 31-59 31-65	2 l/ha	2/culture (21 jours)	-	X	X	X	X	X	X	X	X			Rb	Rj	Sf			6	6	1	1	1				
INPUT	Triazoles (G1) Amines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	9719P/B	EC	-	31-32	1,25 l/ha	2	-					X	X	X	X																
						31-59							X	X	X	X																	
INTER CYFLUFENAMIDE EW (30-09-2022)	Phénylacétamides (gr.	50 g/l cyflufenamide	1065P/P	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	X	X	X	X											6	6	1	1	1					
JADE	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	10972P/ B	EC	-	32-59	1 l/ha	1/an	-	X	X			X	X					Oi	Rb	Rj	Sf										
			1390P/P																														

42 Fongicides : froment, seigle, triticales et épeautre

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)						Cible(s)						Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive							
										Froment	Seigle		Triticales		Épeautre		Piétin-verse	Oidium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau	le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps														
GIGANT	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	150 g/l prothioconazole 125 g/l isopyrazam	10830P/B	SC	-	30-69 61-69	1 l/ha**	2 (14 jours)	-	X	X	X	X	X	X	X	Oi	Rb	Rj	Rj	Sf				6	6	5	2	1
GLOBALSTAR AZT 250 SC GLOBALSTAR SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobin	10793P/B 10109P/B	SC	-	32-59 32-59	1 l/ha	2/culture 2/culture	-	X	X	X	X	X	X	X	Oi	Rb	Rj	Rj	Sf		Se		6	6	2	2	1
HELIX	Triazoles (G1) Anilines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	9806P/B	EC	-	31-32 31-59 31-65	1,25 l/ha	1* 2/an (14 jours)	-	X	X	X	X	X	X	X	Pv		Rb	Rj					6	6	5	2	1
HELISINKI	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	11157P/B	EC	-	31-32 31-65 32-59	0,8 l/ha	2/culture	35	X							Pv	Oi	Rj	Rj	Sf		Se	Fu	6	6	5	2	1
HERMOVIT	Composés inorganiques (gr. M02)	80 % soufre (FU)	6676P/B	WG	X	-	5 kg/ha	-	-	X	X	X	X	X	X	X	Oi								6	6	1	1	1
IMITREX	Carboxamides (C2)	62,5 g/l fluxapyroxad	10120P/B	EC	-	30-69	2 l/ha	2/culture (21 jours)	-	X	X	X	X	X	X	X		Rb	Rj	Rj	Sf				6	6	1	1	1
IMITREX EC			10620P/B	EC	-	31-32 30-69 31-32	2 l/ha	2/culture (21 jours)	-	X	X	X	X	X	X	X		Rb	Rj	Rj	Sf				6	6	1	1	1
INPUT	Triazoles (G1) Anilines (G2)	160 g/l prothioconazole 300 g/l spiroxamine	9719P/B	EC	-	31-32 31-59 31-65	1,25 l/ha	2 2/an (14 jours)	-	X	X	X	X	X	X	X	Pv		Rb	Rj				Fu	6	6	5	2	1
INTER CYFLUFENAMIDE EW (30-09-2022)	Phénylactamides (gr. 50 g/l cyflufenamide)		1065P/P	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	X	X	X	X	X	X	X	Oi								6	6	1	1	1
JADE	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	10972P/B 1390P/P	EC	-	32-59 65	1 l/ha	1/an	-	X				X	X	X	Oi	Rb	Rj	Rj	Sf		Se		6	6	1	1	1

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Cible(s)						Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Cible(s)						Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
Cultures(s)	Froment	Seigle	Triticale	Epeautre	Piétin-verse	Oidium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau	le long des fossés de bord de route, de drainage	50%	75%	90%	10	5	1
KANTIK	Imidazoles (G1) Triazoles (G1) Pipéridines (G2)	200 g/l prochloraz 100 g/l tébuconazole 150 g/l fenpropidine	10740P/B	EC	-	30-61	2 l/ha	2/an (14 jours)	42			Se				10	6	6	10	5	1
KESTREL	Triazoles (G1)	160 g/l prothioconazole 80 g/l tébuconazole	10346P/B	EC	-	30-69	1,25 l/ha	2/culture (14 jours)	-			Se				10	6	6	10	5	1
KEYNOTE XPRO	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu) 130 g/l prothioconazole	10996P/B	EC	-	30-61	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	-			Se				10	6	6	10	5	1
KUMULUS WG	Composés inorganiques (gr. M02)	80 % soufre (FU)	9185P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-							6	6	6	1	1	1
LENYOR	Triazoles (G1)	100 g/l méfentruconazole	11041P/B	EC	-	30-59	6 kg/ha	1	1							6	6	6	2	2	1
LIBRAX	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	45 g/l metconazole 62,5 g/l fluxapyroxad	10177P/B	EC	-	25-69	2 l/ha	1/culture	-			Se				6	6	6	5	2	1
MAGNUM	Strobilurines (C3)	200 g/l pyraclostrobine	11087P/B	EC	-	31-59	1,25 l/ha*	2/culture (28 jours)	35							6	6	6	5	2	1
MICROTHIOL SPECIAL LIQUID	Composés inorganiques (gr. M02)	825 g/l soufre (ACFU)	10929P/B	SC	x	31-59	4,8 l/ha	2/culture (14 jours)	-							6	6	6	2	2	1
MIRADOR	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10146P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture	-			Se				6	6	6	2	2	1
MIRADOR EXTRA (30-11-2022)	Triazoles (G1) Strobilurines (C3)	80 g/l cyproconazole 200 g/l azoxystrobine	9502P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/an (21 jours)	-			Se				6	6	6	1	1	1
MIRAGE 450 ECNA	Imidazoles (G1)	450 g/l prochloraz	8644P/B	EC	-	30-39	1 l/ha	1	-							6	6	6	2	2	1
MIRAGE 450 ECNA	Imidazoles (G1)	450 g/l prochloraz	8644P/B	EC	-	30-39	1 l/ha	1***	-							6	6	6	2	2	1
MIROR	Phthalimides (gr. M04)	500 g/l folpet	11115P/B	SC	-	30-59	1,5 l/ha	2/culture (21 jours)	-			Se				6	6	6	2	2	1
MIZONA	Strobilurines (C3) Carboxamides (C2)	200 g/l pyraclostrobine 30 g/l fluxapyroxad	11065P/B	EC	-	30-69	1 l/ha	2/culture (21 jours)	35							6	6	6	2	2	1
NISSODIUM	Phénylacétamides (gr. D)	50 g/l cyflufenamide	9468P/B	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-							6	6	6	1	1	1
NORIOS	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10907P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (7 jours)	35							6	6	6	5	2	1
					-	32-59	1 l/ha	2/culture (7 jours)	35							6	6	6	1	1	1

44 Fongicides : froment, seigle, triticales et épeautre

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)						Cible(s)							Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive								
										Froment	Seigle		Triticale		Epeautre		Piletin-verse	Oidium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau	le long des fossés de bord de route, de drainage	50%	75%	90%	
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps																
PATEL 250 EC	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10982P/B	EC	-	31-32 31-65 32-59	0,8 l/ha 1,5 l/ha 2 l/ha	1*** 2/culture (14 jours) 1/an	- 35 -	X X X		X					PV	Oi	Ri	Sf				Fu	6	6	5	2	1		
PEACOC	Picolinamides (C4)	50 g/l fenpicoxamide	11118P/B	ZC	-	30-69	1,5 l/ha 2 l/ha	1/an	-	X X X		X	X	X	X				Rb	Ri		Sf				30	20	10	30	20	10
PLEXEO 60	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	10724P/B	SL	-	31-59 65	1,5 l/ha	1/culture	35	X X	X	X							Rb	Ri		Sf		Fu	6	6	5	2	1		
PLEXEO 90	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10897P/B	EC	-	31-59 65	1 l/ha	1/culture	35	X X	X	X	X	X	X			Oi	Rb	Ri		Sf			6	6	5	2	1		
POLYVERSUM	Microorganismes	Pythium oligandrium M1	11139P/B	WP	-	-	0,1 kg/ha	3 (14 jours)	-	X X					X	X								Fu	6	6	1	1	1		
PRIAXOR EC	Strobilurines (C3) Carboxamides (C2)	150 g/l pyraclostrobine 75 g/l fluxapyroxad	10616P/B	EC	-	30-69 30-32 31-32	1,5 l/ha	2/culture (21 jours) 1***	-	X X X	X	X	X	X	X	X		Oi	Rb	Ri		Sf			30	20	10	30	20	10	
PRIDE	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	10951P/B	EC	-	31-32 31-65 32-59	0,8 l/ha	1/culture (14 jours) 1***	35	X X X							PV	Oi		Ri		Sf		Fu	6	6	5	2	1		
PRINCE	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	11028P/B	EC	-	31-32 31-65 32-59	0,8 l/ha	1/culture (14 jours) 1***	-	X X X							PV	Oi		Ri		Sf			6	6	5	2	1		
PROCEC 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11159P/B	EC	-	31-61 32-59 61-65	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	35	X X X	X	X					Oi	Oi		Ri		Sf		Fu	6	6	5	2	1		
PROCHLORUS	Imidazoles (G1)	450 g/l prochloraz	11019P/B	EC	-	30-32 31-32	1 l/ha	1/culture	-	X X							PV					Sf			6	6	2	2	1		
PROFLAZ 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	11035P/B	SC	-	32-59 31-32	1 l/ha	2/culture 1°	-	X X	X	X	X	X	X		PV	Oi	Rb	Ri		Sf			6	6	2	2	1		
PROLINE	Triazoles (G1)	250 g/l prothioconazole	9805P/B	EC	-	31-65 32-59	0,8 l/ha	2/an	35	X X	X							Oi		Ri		Sf		Fu	6	6	2	2	1		

Nom commercial	Familie(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)						Cible(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Froment		Seigle		Triticale		Epeautre		Piétin-verse	Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Helmintosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau	le long des fossés de bord de route, de drainage	
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps												Oï
PROMINO 300 EC	Triazoles (G1)	300 g/l prothioconazole	11153P/B	EC	-	31-61 32-59 61-65	0,65 l/ha	2/culture	35	X	X				Oï	Rb	Rj	Sf	Se					6	6	5	2	1	
PROPERTY 180 SC	Benzophénones (B6)	180 g/l pyriofénone	10339P/B	SC	-	30-65	0,5 l/ha	2/culture (14 jours)	-	X	X	X	X	X	Oï									6	6	1	1	1	
PROSARO	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	9515P/B	EC	-	32-59 65	1 l/ha	1/an	-	X	X				Oï	Rb	Rj	Sf	Se					6	6	2	2	1	
PROTENDO 250 EC		250 g/l prothioconazole	10930P/B	EC	-	31-32 31-65 32-59	0,8 l/ha	2/culture (14 jours)	1***	X					Pv							Fu		6	6	5	2	1	
PROTENDO 300 EC		300 g/l prothioconazole	11111P/B	EC	-	31-61 32-59 61-65	0,65 l/ha	2/culture (14 jours)	35	X	X				Oï	Rb	Rj	Sf	Se					6	6	5	2	1	
PROTIOTAR		250 g/l prothioconazole	11116P/B	EC	-	31-32 32-59 31-61 59-61	0,8 l/ha	3/culture	35	-	X	X	X	X	X	Oï									10	6	10	5	1
PYRACLO 200	Strobilurines (C3)	200 g/l pyraclostrobine	1392P/P	EC	-	31-59	1,25 l/ha*	2/culture (28 jours)	35	X	X		X	X			Rb	Rj						6	6	5	2	1	
QUESTAR	Picolinamides (C4)	50 g/l fenpicoxamide	11076P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha 2 l/ha	1/an	-	X	X		X	X			Rb	Rj		Sf				30	20	10	30	20	10
REVYSTAR	Triazoles (G1)	100 g/l méfentrifluconazole	1396P/P	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	X	X				Oï	Rb	Rj	Sf	Se					6	6	2	2	1	
REVYSTAR GOLD	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	100 g/l méfentrifluconazole 50 g/l fluxapyroxad	11085P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	X	X				Oï	Rb	Rj	Sf	Se					6	6	1	1	1	
REVYTREX	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	66,7 g/l méfentrifluconazole 66,7 g/l fluxapyroxad	11089P/ B 1376P/P	EC	-	30-69	1,125 l/ha 1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35								Rb	Rj		Rh				6	6	5	2	1	

46 Fongicides : froment, seigle, triticales et épeautre

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)						Cible(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive										
										Froment		Seigle		Triticale		Épeautre		Piétin-verse	Oidium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau	le long des fossés de bord de route, de drainage	50%	75%	90%	50%	75%	90%
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Oi	Rb	Rj														
RIVIOR	Triazoles (G1)	125 g/l tétraconazole	11156P/B	ME	-	31-59	1 l/ha	1/an	-	X							Oi	Rb	Rj		Sf						6	6	1	1	1			
		200 g/l tébuconazole	10665P/B	EC	-	30-59	1,25 l/ha	1/culture	-		X							Oi	Rb	Rj							6	6	5	2	1			
SESTO ONE	Phthalimides (gr. M04)	500 g/l folpet	11158P/B	SC	-	30-59	1,5 l/ha	2 (14 jours)	42	X	X											Sf					6	6	2	2	1			
		200 g/l prothioconazole 60 g/l bixafen	10375P/B	EC	-	30-32 31-59 31-65	1 l/ha	2/an (14 jours)	-	X	X							Pv	Oi	Rb	Rj						6	6	5	2	1			
			10817P/B	EC	-	31-59 65	1 l/ha	1/culture	35	X	X								Oi	Rb	Rj		Sf				6	6	5	2	1			
			Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobin	10441P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture	-	X	X							Oi	Rb	Rj		Sf				6	6	2	2	1		
SIRENA	Triazoles (G1)	60 g/l metconazole	10420P/B	SL	-	31-59 65	1,5 l/ha	1/culture	35	X	X								Rb	Rj		Sf				Fu	6	6	5	2	1			
		100 g/l prothioconazole 100 g/l tébuconazole 75 g/l bixafen	9972P/B	EC	-	30-32 31-59 31-65	1,25 l/ha	2/an (14 jours)	-	X	X							Pv	Oi	Rb	Rj						6	6	2	2	1			
																			Oi	Rb	Rj		Sf				6	6	2	2	1			
												X								Oi	Rb	Rj		Sf										
SMARAGD	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	11029P/B	EC	-	32-59	1 l/ha	1/an	-	X								Oi	Rb	Rj		Sf				6	6	1	1	1				
											X	X						Oi	Rb	Rj														
SOLAGOLD FORTE	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	150 g/l prothioconazole 75 g/l benzovindiflupyr	1277P/P	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	X	X								Rb	Rj		Sf				6	6	5	2	1				
																			Rb	Rj														
SOLEIL	Triazoles (G1)	167 g/l bromuconazole 107 g/l tébuconazole	10369P/B	EC	-	30-69	1,2 l/ha	1/culture	-	X	X	X	X	X	X	X		Oi	Rb		Sf					6	6	1	1	1				
											X	X																						
SPORTAK EW	Imidazoles (G1)	450 g/l prochloraz	8510P/B	EW	-	31-39 39-59	1 l/ha	2/culture (21 jours)	-	X	X							Pv				Sf				6	6	2	2	1				
STAVENTO	Phthalimides (gr. M04)	500 g/l folpet	11114P/B	SC	-	30-59	1,5 l/ha	2 (14 jours)	42	X	X											Sf				6	6	2	1	1				
TALENDO	Quinazolinones (E1)	200 g/l proquinazide	11048P/B	EC	-	25-65 25-49	0,25 l/ha	2 (14 jours)	-	X	X							Oi								6	6	2	2	1				

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)						Cible(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive						
										Froment		Seigle		Triticale		Épeautre		Piétin-verse	Oidium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau		le long des fossés de bord de route, de drainage	
										Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps													
TARCZA 250 EW	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	10236P/B	EW	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	X	X							Oi	Rb	Rj				6	6	2	1	1	90%	
ERA		300 g/l prothioconazole	11078P/B	EC	-	31-61 32-59 61-65	0,65 l/ha	2/culture (14 jours) 1***	35	X			X						Oi	Rb	Rj				6	6	5	2	1	75%
			1178P/P	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	X	X			X					Oi	Rb	Rj				6	6	1	1	1	50%
			10172P/B	EW	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	X	X			X	X	X				Rb	Rj				6	6	5	2	1	90%
TEBUCUR 250 EW		Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	1055P/P	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	X	X							Oi	Rb	Rj				6	6	1	1	1	
10766P/B				EW	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	X	X			X	X	X			Oi	Rb	Rj				6	6	2	1	1	
9766P/B				EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	X	X								Oi	Rb	Rj				6	6	1	1	1	
1313P/P 1285P/P				EC	-	32-59 65	1 l/ha	1/an	-											Oi	Rb	Rj				6	6	2	2	1
TEPRONOR	Composés inorganiques (gr. M02) Triazoles (G1)	80 % soufre (FU)	5700P/B	WG	X	-	5 kg/ha	-	-	X	X	X	X	X	X			Oi						6	6	1	1	1		
TURRET 60		60 g/l metconazole	10923P/B	SL	-	31-59	1,5 l/ha	1/culture	35	X			X						Rb	Rj				6	6	5	2	1		
TURRET 60		60 g/l metconazole	10923P/B	SL	-	31-59	1,5 l/ha	1/culture	35	X			X	X	X	X			Oi	Rb	Rj				6	6	5	2	1	
TURRET 90		90 g/l metconazole	10898P/B	EC	-	31-59 65	1 l/ha	1/culture	35	X	X			X	X	X	X			Rb					6	6	5	2	1	
UNIVOQ	Triazoles (G1)	50 g/l FENPICOXAMID 100 g/l PROTHIOCONAZOLE	11179P/B	EC	-	30-59	1,5 l/ha 2 l/ha	1/culture	-	X	X			X	X	X	X							40	30	20	40	30	20	
ULTRALINE		250 g/l prothioconazole				31-32 31-65 32-59	0,8 l/ha	2/culture (14 jours) 1***	-	X								Pv	Oi	Rb	Rj				40	30	20	40	30	20
VALPURA XPRO	Carboxamides (C2)	125 g/l bixafen	10871P/B	EC	-	30-69	1 l/ha	1/culture	35	X	X			X	X	X	X			Rb	Rj				6	6	2	2	1	
																				Rh										

48 Fongicides : froment, seigle, triticale et épeautre

Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum	DAR (jours)	Culture(s)						Cible(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive											
										Froment		Seigle		Triticale		Epeautre		Piétin-verse	Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Helminthosporiose	Septoriose (feuilles)	Rhynchosporiose	Septoriose (épi)	Fusariose	le long des cours et plans d'eau	le long des fossés de bord de route, de drainage	50%	75%	90%				
VARIANO XPRO	Carboxamides (C2) Strobilurines (C3) Triazoles (G1)	40 g/l bixafen 50 g/l fluoxastrobine 100 g/l prothioconazole	10327P/B	EC	-	30-61	1,75 l/ha	2/an (14 jours)	-	Hiver				X		Oi	Rj	He	Sf				6	6	6	5	2	1							
										Printemps																			6	6	6	2	1	1	
										Hiver	X																								
										Printemps																									
VELDIG XPRO	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu) 130 g/l prothioconazole	10960P/B	EC	-	30-61	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	-	Hiver				X		Oi	Rb	Rj	He	Sf				10	6	6	10	5	1						
										Printemps																									
										Hiver	X																								
										Printemps																									
VELOGY ERA	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	150 g/l prothioconazole 75 g/l benzovindiflupyr	10602P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	Hiver				X			Rb	Rj		Sf				6	6	6	5	2	1						
										Printemps																									
										Hiver																									
										Printemps																									
VERTIPIN	Composés inorganiques (gr. M02)	700 g/l soufre (FU)	11092P/B	SC	X	30-59	6 l/ha	2/culture (10 jours)	-	Hiver						Oi				Sf				6	6	6	1	1	1						
										Printemps																									
										Hiver	X																								
										Printemps																									
VERDOR	Triazoles (G1) Carboxamides (C2)	100 g/l méfentrifluconazole 50 g/l fluxapyroxad	11101P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	Hiver				X		Oi	Rb	Rj		Sf				6	6	6	1	1	1						
										Printemps																									
										Hiver																									
										Printemps																									
VSM CYELUFENAMIDE 50 WG VSM ZWAVEL 80 WG (30-06-2022)	Phénylacétamides (gr. C) Composés inorganiques (gr.)	50 g/l cyflufenamide 80 % soufre (FU)	1220P/P	EW	-	31-59	0,5 l/ha	2	-	Hiver				X		Oi							6	6	6	1	1	1							
										Printemps				X																					
										Hiver	X			X																					
										Printemps				X																					
ZOXIS	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10044P/B 1276P/P	SC	-	31-59	1 l/ha	2/culture	-	Hiver				X		Oi	Rb	Rj		Sf				6	6	6	1	1	1						
										Printemps				X																					
										Hiver				X																					
										Printemps				X																					
ZOXIS (30-06-2022)	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	1153P/P	SC	-	31-59	1 l/ha	2/culture	-	Hiver				X		Oi	Rb	Rj		Sf				6	6	6	1	1	1						
										Printemps				X																					
										Hiver	X			X																					
										Printemps				X																					
ZOXIS 250 SC	Strobilurines (C3)	250 g/l azoxystrobine	10684P/B	SC	-	32-59	1 l/ha	2/culture (7 jours)	35	Hiver				X		Oi	Rb	Rj					6	6	6	5	2	1							
										Printemps																									
										Hiver	X			X																					
										Printemps				X																					

Fongicides autorisés en avoine (3/3)																						
Nom commercial	Familles(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Cult.		Cible(s)					Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive					
										Avoine	Printemps Hiver	Piétin-verse	Oïdium	Rouilles		Helminthosporiose	Fusariose	le long des cours et plans d'eau				
														Brune	Jaune			Couronnée des graminées	50%	75%	90%	50%

50 Fongicides : avoine

Nom commercial	Famille(s) chimique(s)	Composition	N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Cult.	Cible(s)				Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive								
											Avoine	Piétin-verse	Oïdium	Rouilles		Helminthosporiose	Fusariose	le long des cours et plans d'eau				le long des fossés de bord de route, de drainage	
														Brune	Couronnée des graminées								
											Avoine	Printemps	Hiver				50%	75%	90%	50%	75%	90%	
Non commercial	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1) Composés inorganiques (gr. M02)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu) 130 g/l prothioconazole	10996P/B	EC	-	30-61	1,2 l/ha	1/culture	-	x	x			Oi			10	6	6	10	5	1	
		80% soufre (fu)	9185P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x			Oi			6	6	6	1	1	1	
	Triazoles (G1)	100 g/l méfenflutriazole	11041P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x			Oi			6	6	6	2	2	1	
	Strobilurines (C3)	200 g/l pyraclostrobine	11087P/B	EC	-	31-59	1,25 l/ha*	2/culture (28 jours)	35	x	x			Rc			6	6	6	5	2	1	
	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10897P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x			Rc			6	6	6	5	2	1	
	Strobilurines (C3)	150 g/l pyraclostrobine						2/culture (21 jours)		x	x			Rc			30	20	10	30	20	10	
	Carboxamides (C2)	75 g/l fluxapyroxad	10616P/B	EC	-	30-59	1,5 l/ha	2/culture (21 jours)	-	x	x												
								1***															
	Benzenophénones (B6)	180 g/l pyriofénone	10339P/B	SC	-	30-49	0,5 l/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x			Oi			6	6	6	1	1	1	
	50g fluxapyroxad																						
	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	100 g/l méfenflutriazole 66,7 g/l fluxapyroxad 66,7 g/l méfenflutriazole	11085P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x			Oi			6	6	6	1	1	1	
	Triazoles (G1)	200 g/l tébuconazole	10665P/B	EC	-	31-45	1,25 l/ha	1/culture	-	x	x			Oi			6	6	6	5	2	1	
	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	60 g/l bixafen 200 g/l prothioconazole	10375P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	2/an	-	x	x			Oi			6	6	6	5	2	1	
	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10817P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x			Rc			6	6	6	5	2	1	
	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l bixafen 100 g/l prothioconazole 100 g/l tébuconazole	9972P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	2/an(14 jours)	-	x	x			Rc			6	6	6	2	1	1	
	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 125 g/l tébuconazole	11029P/B	EC	-	32-59	1 l/ha	1/an	-	x	x			Oi			6	6	6	1	1	1	
	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l benxavindiflupyr 150 g/l prothioconazole	1277P/P	EC	-	31-59	1 l/ha	1/an	-	x	x			Rc			6	6	6	5	2	1	
	Quinazolines (E1)	200 g/l proquazide	11048P/B	EC	-	25-49	0,25 l/ha	2 (14 jours)	-	x	x			Oi			6	6	6	2	1	1	
	Triazoles (G1)	250 g/l tébuconazole	10172P/B	EW	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x			Rc			6	6	6	5	2	1	
	Triazoles (G1)	125 g/l prothioconazole 1285P/P	1313P/P	EC	-	32-59	1 l/ha	1/an	-	x	x			Oi			6	6	6	2	1	1	
	Composés inorganiques (gr. M02)	800 g/l soufre (Fu)	5700P/B	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x			Oi			6	6	6	1	1	1	
	Triazoles (G1)	90 g/l metconazole	10898P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	35	x	x			Rc			6	6	6	5	2	1	
	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	125 g/l bixafen	10871P/B	EC	-	30-61	1 l/ha	1	56	x	x			Rc			6	6	6	2	1	1	
	Carboxamides (C2) Benzamides (C2) Triazoles (G1)	65 g/l bixafen 65 g/l fluopyram (fu) 130 g/l prothioconazole	10960P/B	EC	-	30-61	1,2 l/ha	1/culture	-	x	x			Rc			10	6	6	10	5	2	
	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	75 g/l benxavindiflupyr 150 g/l prothioconazole	10602P/B	EC	-	31-59	1 l/ha	1/culture	-	x	x			Rc			6	6	6	5	2	1	
	Composés inorganiques (gr. M02)	700 g/l soufre (Fu)	11092P/B	SC	x	30-59	6 l/ha	2/culture (10 jours)	-	x	x			Oi			6	6	6	1	1	1	
	Carboxamides (C2) Triazoles (G1)	50g fluxapyroxad 100 g/l méfenflutriazole	11101P/B	EC	-	30-69	1,5 l/ha	2/culture (14 jours)	35	x	x			Oi			6	6	6	1	1	1	
VSM ZWAVEL 80 WG (30-06-2022)	Composés inorganiques (gr. M02)	800 g/l soufre (Fu)	1210P/P	WG	x	-	5 kg/ha	-	-	x	x			Oi			6	6	6	1	1	1	

Traitements des semences – Céréales

Ca = Carie commune ; Ch = Charbon nu ; Fu = Fusariose ; He = Helminthosporiose ; Mg = Mouche grise des céréales ; Pe = Piétin-échaudage ; Sf = Septoriose des feuilles ; Se = Septoriose de l'épi ; Ta = Taupins CS = Suspension de capsules ; ES = Emulsion pour traitement de semences ; FS = Suspension concentrée pour traitement des semences ; ME = Micro-émulsion																		
Nom commercial	N° autorisation	Formulation	Composition	AB	Dose par 100 kg de semences	Culture(s)										Zone tampon le long des cours et plans d'eau, des fossés de bord de route, de drainage (mètres)		
						Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle			Avoine	
						Hiver Printemps	Hiver Printemps	Hiver Printemps	Hiver Printemps	Hiver Printemps	Hiver Printemps	Hiver Printemps	Hiver Printemps	Hiver Printemps	Hiver Printemps			
Traitements fongicides de semences																		
BARITON	9575P/B	FS	37,5 g/l fluoxastrobine 37,5 g/l prothioconazole	-	0,15 l			Ca Ch Fu	Ca Ch Fu	Ca Ch Fu	Ca Ch Fu	Ca Ch Fu	Ca Ch Fu			1		
CELEST	9269P/B	FS	25 g/l fludioxonil	-	0,20 l	He Sf	He Sf	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Fu	Fu	1		
CERALL	9674P/B	FS	10 ³ -10 ¹⁰ CFU/ml <i>Pseudomonas chlororaphis</i> (MA342)	X	1 l			Ca Fu Se	Ca Fu Se	Fu	Fu		Fu	Fu		1		
DIFEND	10160P/B	FS	30 g/l difénoconazole	-	0,20 l			Ca	Ca	Ca	Ca					1		
DIFEND EXTRA	10472P/B	FS	25 g/l difénoconazole 25 g/l fludioxonil	-	0,20 l	Fu	Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Fu	Fu	1		
KINTO DUO (30-06-2023)	9486P/B	FS	60 g/l prochloraz 20 g/l triticonazole	-	0,20 l	Ch He	Ch He	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ch Fu	1		
KINTO PLUS	11051P/B	FS	33,3 g/l fludioxonil 33,3 g/l fluxapyroxad 33,3 g/l triticonazole	-	0,15 l	Ch Fu He	Ch Fu He	Ca Fu	Ca Fu	Ch Fu	Ch Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ch Fu	Ch Fu	1		
LATITUDE MAX	10359P/B	FS	125 g/l silthiopham	-	0,20 l	Pe	Pe	Pe	Pe	Pe	Pe	Pe	Pe			1		
PREMIS	9922P/B	FS	25 g/l triticonazole	-	0,20 l	Ch	Ch	Ca Ch	Ca Ch	Ca Ch	Ca Ch	Ca Ch	Ca Ch			1		
PREPPER	11015P/B	FS	25 g/l fludioxonil	-	0,20 l	Fu He	Fu He	Ca Fu Se	Ca Fu Se	Ca Fu Se	Ca Fu Se	Ca Fu Se	Fu	Fu	Fu	1		
RANCONA 15 ME	10313P/B	ME	15 g/l ipconazole	-	0,1 l			Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Fu	Fu	-		
					0,133 l	Ca Fu He	Ca Fu He									-		
REDIGO	9682P/B	FS	100 g/l prothioconazole	-	0,1 l	Ch Fu He	Ch Fu He	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Ca Fu	Fu	Fu	1		
VIBRANCE DUO	10577P/B	FS	26 g/l fludioxonil 25 g/l sédaxane	-	0,15 l									Ch Fu	Ch Fu	1		
					0,2 l	Ch Fu He	Ch Fu He	Ca Fu Se	Ca Fu Se	Ca Fu Se	Ca Fu Se	Ca Fu Se	Ca Fu Se			1		
VIBRANCE DUO 50 FS	10578P/B	FS	26 g/l fludioxonil 25 g/l sédaxane	-	0,15 l				Ca Fu Se	Ca Fu Se	Ca Fu Se	Ca Fu Se		Ch Fu	Ch Fu	1		
					0,20 l	Ch Fu He	Ch Fu He	Ca Fu Se	Ca Fu Se			Ca Fu Se	Ca Fu Se			1		
VIBRANCE STAR	10834P/B	FS	25 g/l fludioxonil 25 g/l sédaxane 20 g/l triticonazole	-	0,15 l									Ch	Ch	1		
					0,20 l	Ch He	Ch He	Ca Fu Se	Ca Fu Se	Ca Fu Se	Ca Fu Se	Ch	Ch			1		
Traitements insecticides de semences																		
FORCE	7744P/B	CS	200 g/l téfluthrine	-	0,10 l	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	-		
LANGIS	10205P/B	ES	300 g/l cyperméthrine	-	0,20 l	Mg Ta	Mg Ta	Mg Ta	Mg Ta	Mg Ta	Mg Ta	Mg Ta	Mg Ta	Mg Ta	Mg Ta	1		

Insecticides

Pucerons d'hiver

Insecticides (1/3) - Pucerons d'hiver																							
* Le nombre d'application maximum correspond à celui autorisé pour le stade et l'usage correspondant au tableau. Pour ces produits, un maximum de 2 applications est cependant autorisé sur l'année/la culture s'il s'agit d'usages différents.																							
** Le nombre d'application maximum correspond à celui autorisé pour le stade et l'usage correspondant au tableau. Pour le seigle, 2 applications sont autorisées, tandis que 1 application est autorisée pour les autres cultures. Pour ces produits, un maximum de 2 applications est cependant autorisé sur l'année/la culture s'il s'agit d'usages différents.																							
*** Retrait des usages plein air uniquement																							
* Usage autorisé uniquement en automne																							
1. Pyréthrinoides ; 2. Carbamates ; 3. Carbamates + pyréthrinoides																							
Nom commercial	Composition	Mode d'action	N° autorisation	Formulation	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive						
									Orge	Froment	Triticale	Epeautre	Seigle	Avoine	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage					
															Hiver Printemps	Hiver Printemps	Hiver Printemps	Hiver Printemps	Hiver Printemps	Hiver Printemps	50%	75%	90%
AKAPULKO 100 CS	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	1237P/P	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
CYPELCO	500 g/l cyperméthrine	1	1198P/P	EC	09-30	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
CYPERB		1	10357P/B	EC	09-30	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
CYPERSTAR	200 g/l cyperméthrine	1	9727P/B	EC	09-30	100 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
CYTHRIN MAX	500 g/l cyperméthrine	1	10106P/B	EC	09-30	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
CYTOX	100 g/l cyperméthrine	1	8653P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	5	2	1
DECIS 15 EW	15 g/l deltaméthrine	1	10646P/B	EW	12-30	420 ml/ha	1/culture*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
DECIS EC 2,5	25 g/l deltaméthrine	1	7172P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
DELTAPHAR			10354P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
DEMETRINA 25 EC			10943P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
EVURE*			10728P/B	EW	-	200 ml/ha	2	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	5	2	1
FASTAC (30-04-2022)	50 g/l alpha-cyperméthrine	1	8958P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40	30	20	40	30	20
INSECTINE	500 g/l cyperméthrine	1	1331P/P	EC	09-30	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
KARATE ZEON	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	9231P/B 1067P/P	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
KARIS 100 CS			10028P/B 1133P/P	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
KORADO 100 CS			10377P/B	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
LAMBDA 50 EC	50 g/l lambda-cyhalothrine	1	9749P/B	EC	09-30	100 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
MARKATE 50 EC			10888P/B	EC	09-30	100 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
MAVRIK*	240 g/l tau-fluvalinate	1	7535P/B	EW	-	200 ml/ha	2	-	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	5	2	1	
MEZENE	25 g/l deltaméthrine	1	10367P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
NEXIDE	60 g/l gamma-cyhalothrine	1	10110P/B	CS	09-30	75 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
NINJA	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	9571P/B	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
OKAPI (19-01-2022) ***	100 g/l pirimicarbe 5 g/l lambda-cyhalothrine	3	7978P/B	EC	-	750 ml/ha	1	35	x		x	x		x	x	x	6	6	6	2	2	1	
PATRIOT	25 g/l deltaméthrine	1	9207P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
PATRIOT PROTECH	15 g/l deltaméthrine	1	10717P/B	EW	12-30	420 ml/ha	1/culture*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
PIRIMOR	50 % pirimicarbe	2	6640P/B 1337P/P	WG	-	250 g/ha	2	35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
POLECI	25 g/l deltaméthrine	1	10304P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1
RAVANE 50	50 g/l lambda-cyhalothrine	1	9647P/B	EC	09-30	100 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SHERPA 100 EW	100 g/l cyperméthrine	1	11002P/B	EW	-	250 ml/ha	1	21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	10	-	-	10
SHERPA 200 EC	200 g/l cyperméthrine	1	8968P/B	EC	09-30	100 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
SPARROW			11079P/B	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SPARVIERO	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	10179P/B 1336P/P	CS	09-30	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SPLENDID	25 g/l deltaméthrine	1	9627P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SPLENDOUR			10466P/B	EC	09-30	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SPLIT	15 g/l deltaméthrine	1	10718P/B	EW	12-30	420 ml/ha	1/culture*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
SUMI ALPHA	25 g/l esfenvalérate	1	8241P/B	EC	09-30	200 ml/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
VSM PIRIMICARB	50 % pirimicarbe	2	1368P/P	WG	-	250 g/ha	2	35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1
WOPRO DELTAMETHRIN 2,5 EC	25 g/l deltaméthrine	1	1394P/P	EC	09-30	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1

Pucerons d'été

Insecticides (2/3) - Pucerons d'été																											
Nom commercial	Composition	Mode d'action	N° autorisation	Formulation	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)										Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive								
									Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine		le long des cours et plans d'eau			fossés de bord de route, de drainage			
									Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	50%	75%	90%	50%	75%	90%	
AFINTO	50% flonicamide	3	11146P/B	WG	39-75	0,160 kg/ha	2 (21 jours)	28			x										6	6	6	1	1	1	
AKAPULKO 100 CS	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	1237P/P	CS	60-77	50 ml/ha	1-2/culture**	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1	
CYPELCO	500 g/l cyperméthrine	1	1198P/P	EC	50-59	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1	
CYPERB	10357P/B		EC	50-59	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1	
CYPERSTAR	200 g/l cyperméthrine	1	9727P/P	EC	50-59	100 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1	
CYTHRIN MAX	500 g/l cyperméthrine	1	10106P/B	EC	50-59	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1	
CYTOX	100 g/l cyperméthrine	1	8653P/B	EC	50-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	5	2	1	
DECIS 15 EW	15 g/l deltaméthrine	1	10646P/B	EW	51-59	420 ml/ha	1/culture*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
DECIS EC 2,5			7172P/B	EC	50-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
DELTA PHAR	25 g/l deltaméthrine	1	10354P/B	EC	50-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
DEMETRINA 25 EC	10943P/B		EC	50-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
EVJURE	240 g/l tau-fluvalinate	1	10728P/B	EW	>59	150 ml/ha	1	42			x	x	x	x	x						6	6	6	5	2	1	
FASTAC (30-04-2022)	50 g/l alpha-cyperméthrine	1	8958P/B	EC	50-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40	30	20	40	30	20	
FLONICABEL	50% flonicamide	1	1109P/P	WG	39-75	160 g/ha	2 (21 jours)	28			x																
HINODE			10955P/B									x										6	6	6	1	1	1
TEPPEKI			9526P/B		39-77	140 g/ha	1	-	x	x						x	x	x	x	x	x						
INSECTINE	500 g/l cyperméthrine	1	1331P/P	EC	50-59	40 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1	
KARATE ZEON	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	9231P/B	CS	60-77	50 ml/ha	1-2/culture**	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
KARIS 100 CS			10028P/B	CS	60-77	50 ml/ha	1/culture*	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
KORADO 100 CS			1133P/P	CS	60-77	50 ml/ha	1/culture*	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1
LAMBDA 50 EC	50 g/l lambda-cyhalothrine	1	9749P/P	EC	60-77	100 ml/ha	1/culture*	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
MARKATE 50 EC			10888P/B	EC	60-77	100 ml/ha	1/culture*	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
MAVRIK			240 g/l tau-fluvalinate	1	7535P/B	EW	>59	150 ml/ha	1	42			x	x	x	x	x	x				6	6	6	5	2	1
MEZENE	25 g/l deltaméthrine	1	10367P/B	EC	50-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
NEXIDE	60 g/l gamma-cyhalothrine	1	10110P/B	CS	60-77	75 ml/ha	2/culture	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1	
NINJA	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	9571P/B	CS	60-77	50 ml/ha	1-2/culture**	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
OKAPI (19-04-2022) ***	100 g/l pirimicarbe 5 g/l lambda-cyhalothrine	4	7978P/B	EC	>58	750 ml/ha	1	35			x	x									6	6	6	2	2	1	
PATRIOT	25 g/l deltaméthrine	1	9207P/B	EC	50-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
PATRIOT PROTECH	15 g/l deltaméthrine	1	10717P/B	EW	51-59	420 ml/ha	1/culture*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
PIRIMOR	50% pirimicarbe	2	6640P/B	WG	-	250 g/ha	2	35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1	
POLECI	25 g/l deltaméthrine	1	10304P/B	EC	50-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1	
RAVANE 50	50 g/l lambda-cyhalothrine	1	9647P/B	EC	60-77	100 ml/ha	1/culture*	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
SHERPA 100 EW	100 g/l cyperméthrine	1	11002P/B	EW	-	250 ml/ha	1	21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	10	-	-	10	
SHERPA 200 EC	200 g/l cyperméthrine	1	8968P/B	EC	50-59	100 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1	
SPARROW	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	11079P/B	CS	60-77	50 ml/ha	1-2/culture**	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
SPARVIERO			10179P/B	CS	60-77	50 ml/ha	1-2/culture**	30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
			1336P/P																								
SPLENDID	25 g/l deltaméthrine	1	9627P/B	EC	50-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
SPLENDOURE	10466P/B		EC	50-59	200 ml/ha	1/an*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
SPLIT	15 g/l deltaméthrine	1	10718P/B	EW	51-59	420 ml/ha	1/culture*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
SUMI ALPHA	25 g/l esfenvalérate	1	8241P/B	EC	50-59	200 ml/ha	1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	
VSM PIRIMICARB	50% pirimicarbe	2	1368P/P	WG	-	250 g/ha	2	35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1	
WOPRO DELTAMETHRIN 2,5 EC	25 g/l deltaméthrine	1	1394P/P	EC	50-59	200 ml/ha	1/culture*	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1	

Cécidomyies

Insecticides (3/3) - Cécidomyies																											
Nom commercial	Composition		Mode d'action	N° autorisation	Formulation	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)								Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive									
										Orge		Froment		Triticale		Épeautre		Seigle		Avoine		le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage		
										Hiver	Printemp	Hiver	Printemp	Hiver	Printemp	Hiver	Printemp	Hiver	Printemp	Hiver	Printemp	50%	75%	90%	50%	75%	90%
AKAPULKO 100 CS	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	1237P/P	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1			
DECIS 15 EW	15 g/l deltamethrine	1	10646P/B	EW	30-59	420 ml/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1			
DECIS EC 2,5	25 g/l deltamethrine	1	7172P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1			
DELTAPHAR			10354P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1			
DEMETRINA 25 EC			10943P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1		
EVURE	240 g/l tau-fluvalinate	1	10728P/B	EW	30-59	200 ml/ha	2 (10 jours)	-	x		x	x	x	x	x	x		x	6	6	6	5	2	1			
FASTAC (30-04-2022)	50 g/l alpha-cypermethrine	1	8958P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40	30	20	40	30	20			
KARATE ZEON	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	9231P/B 1067P/P	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1			
KARIS 100 CS			10028P/B 1133P/P	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1			
KORADO 100 CS			10377P/B	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1		
LAMBDA 50 EC	50 g/l lambda-cyhalothrine	1	9749P/B	EC	30-59	100 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1			
MARKATE 50 EC			10888P/B	EC	30-59	100 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1		
MAVRIK	240 g/l tau-fluvalinate	1	7535P/B	EW	30-59	200 ml/ha	2 (10 jours)	-	x		x	x	x	x	x	x	x		6	6	6	5	2	1			
MEZENE	25 g/l deltamethrine	1	10367P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1			
NEXIDE	60 g/l gamma-cyhalothrine	1	10110P/B	CS	09-30	75 ml/ha	2/culture	-	x	x									10	6	6	10	5	1			
				CS	30-59	75 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1			
				CS	60-77	75 ml/ha	2/culture	30			x	x								10	6	6	10	5	1		
NINJA	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	9571P/B	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1			
PATRIOT	25 g/l deltamethrine	1	9207P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1			
PATRIOT PROTECH	15 g/l deltamethrine	1	10717P/B	EW	30-59	420 ml/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1			
POLECI	25 g/l deltamethrine	1	10304P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	6	6	10	5	1			
RAVANE 50	50 g/l lambda-cyhalothrine	1	9647P/B	EC	30-59	100 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1			
SPARROW	100 g/l lambda-cyhalothrine	1	11079P/B	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1			
SPARVIERO			10179P/B 1336P/P	CS	30-59	50 ml/ha	2/culture	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1		
SPLENDID	25 g/l deltamethrine	1	9627P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1			
SPLENDOR			10466P/B	EC	30-59	200 ml/ha	2/an (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1		
SPLIT	15 g/l deltamethrine	1	10718P/B	EW	30-59	420 ml/ha	2/culture (14 jours)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1			
WOPRO DELTAMETHRIN 2,5 EC	25 g/l deltamethrine	1	1394P/P	EC	30-59	200 ml/ha	2/an	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	2	2	1			

Molluscicides

N° autorisation	Formulation	AB	Stade d'application BBCH	Dose maximum	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	Culture(s)												Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive											
						Orge		Froment		Triticale		Epeautre		Seigle		Avoine		le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de								
						Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	50%	75%	90%	50%	75%	90%						
4044P/B	RB	-	00-29	7 kg/ha	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9904P/B	RB	X	-	7 kg/ha	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10959P/B	RB	X	-	7 kg/ha	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10581P/B	RB	-	00-29	7 kg/ha	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10939P/B	RB	X	-	6 kg/ha	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10721P/B	RB	X	-	7 kg/ha	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10913P/B	RB	-	00-29	7 kg/ha	2 (7 jours)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4305P/B	RB	-	00-29	7 kg/ha	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6511P/B	RB	-	00-29	7 kg/ha	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10248P/B	RB	-	00-29	7 kg/ha	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10323P/B	RB	-	00-29	7 kg/ha	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1200P/P	RB	-	00-29	5 kg/ha	3 (5 jours)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10764P/B	RB	-	00-29	7 kg/ha	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10204P/B	RB	-	00-29	5 kg/ha	3 (5 jours)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11004P/B	RB	-	00-29	5 kg/ha	4 (5 jours)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9724P/B	RB	X	-	7 kg/ha	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9722P/B	RB	X	-	7 kg/ha	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
262P/P						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PPP autorisés en blé dur, engrain/petit épeautre, amidonnier et blé poulard/barbu (Herbicides - Agents anti-moussants - Régulateurs de croissance)

Ga = Graminées annuelles ; Gv = Graminées vivaces ; Da = Dicotylées annuelles ; Dv = Dicotylées vivaces ; Cd = Chiendent ; Fa = Folle avoine ; Gg = Gaillet gratteron ; Jv = Jouet du vent ; Pr = Prêle ; Pa = Pâturin annuel Rg = Ray-Gras ; Vc = Vulpin des champs

*Produit autorisé en toutes cultures ; **Dosage maximum 3,6 kg de glyphosate/ha/an ; ***Dosage maximum 0,48 kg de triclopyr/ha/an ; Mode de pénétration racinaire (R) et/ou foliaire (F) ; **En mélange avec une huile de colza esterifiée

rc. Régulateur de croissance

Nom commercial	Composition	Mode d'action	N° autorisation	Formulation	Mode de pénétration*	Stade d'application BBCH	Dose maximum autorisée	Nombre d'applications maximum (et intervalle)	DAR (jours)	Culture(s)				Cible(s)		Zone tampon (mètres) suivant % anti-dérive							
										Blé dur	Céréales annuelles	Graminées	Dicotylées	le long des cours et plans d'eau			le long des fossés de bord de route, de drainage						
														Hiver	Printemps	Hiver	Printemps	Annuelles	Vivaces	Annuelles	Vivaces	50%	75%
Régulateurs de croissance																							
MEDAX TOP	300 g/l chlorure de mépiquat 50 g/l prohexadione	rc rc	9840P/B	SC	-	31-32	1 l/ha	1	56	x		x		Verse			6	6	6	1	1	1	
Anti-mousse																							
ANTI-SCHUIM/ANTI-MOUSSE	200 g/l diméthylpolysiloxane	am	10118P/B	EW	-	-	1,4 ml/100 l bouillie	-	-	x	x	x	x	-			6	6	6	1	1	1	
CASS'MOUSSE	294 g/l diméthylpolysiloxane	am	9736P/B	EW	-	-	1,4 ml/100 l bouillie	-	-	x	x	x	x				6	6	6	1	1	1	
Herbicides																							
ALLIE	20% metsulfuron-méthyl	2	9650P/B	SG	-	12-39 21-39	0,03kg/ha	1	-	x		x			Da	Dv	6	6	6	1	1	1	
BIATHLON DUO	5,4 % florasulame 71,4 % tritosulfuron	2 2	10263P/B	WG	F	13-20	0,04 kg/ha	1/culture	-	x	x	x			Da		-	6	6	-	1	1	
							0,07 kg/ha		-	x	x			Gg	Dv	-	6	6	-	1	1		
						13-39	0,07kg/ha		-	x	x			Gg	Dv	-	6	6	-	1	1		
						13-32	0,04 kg/ha		-	x	x			Da		-	6	6	-	1	1		
						21-32	0,04 kg/ha		-	x	x	x		Da		-	6	6	-	1	1		
CITO PRO GLOBAL HERBICIDE*	240 g/l acide acétique	-	10084P/B	SC	-	-	25 ml/m²	6/an (7 jours)	-	x	x	x	x	Ga	Da		6	6	6	1	1	1	
CLYDE COMBI	1 g/l Florasulame 100 g/l Fluroxypyr	2 4	11102P/B	SE	F	21-31	1,2 l/ha	1/culture	-	x	x	x	x		Da	Gg	6	6	6	2	2	1	
HARMONIX LEAF ACTIVE*	240 g/l acide acétique	-	10761P/B	SC	-	-	25 ml/m²	6/an (7 jours)	-	x	x	x	x	Ga	Da		6	6	6	2	2	1	
KYLEO*(09-12-2022)	161 g/l 2,4-D 240 g/l glyphosate**	4 9	10336P/B	SL	F	-	3 l/ha	1	-	x	x	x	x		Da		6	6	6	2	2	1	
						-	5 l/ha	1	-	x	x	x	x	Ga	Gv	Dv	6	6	6	2	2	1	
MATTERA	6,25 g/l halauxifen-méthyl 5 g/l florasulame 6 g/l cloquintocet-méthyl	4 2 pp	10675P/B	OD	F	13-32	0,75 l/ha	1/an	50	x	x	-	-	-	Ga	Gg	-	-	6	-	-	1	
									50	x	x	-	-	-	Ga	Gg	-	-	6	-	-	1	
MESIOFIS PRO	2 g/l iodosulfuron-méthyle-Na 30 g/l méfenpyr-diéthyle	2 pp 2	1215P/P 1307P/P	OD	F	21-31	0,9l/ha	1/culture	-	x	x	x	x	Jv, Vc		Da	-	-	6	-	-	1	
							1,5l/ha		-	x	x		Pa	Rg		-	-	6	-	-	1		
RENITAR	6,25 g/l halauxifen-méthyl 5 g/l florasulame 6 g/l cloquintocet-méthyl	4 2 pp	10656P/B	OD	F	13-32	0,75 l/ha	1/an	50	x	x	-	-	-	Ga	Gg	-	-	6	-	-	1	
SIGMA FLEX	4,5 % mésosulfuron-méthyle 6,75 % propoxycarbazone-Na 9 % méfenpyr-diéthyle	2 2 pp	10623P/B	WG	F	21-31	0,2 kg/ha	1/culture	-	x			Vc, Pa, Jv	Da		6	6	6	5	2	1		
							0,33 kg/ha		-	x			Vc, Pa	Da		6	6	6	5	2	1		
									-	x			Fa	Rg		6	6	6	5	2	1		
SIGMA MAXX	2 g/l iodosulfuron-méthyle-Na 30 g/l méfenpyr-diéthyle	2 pp 2	10409P/B	OD	F	21-31	0,9l/ha	1/culture	-	x	x	x	x	Jv, Vc		Da	-	-	6	-	-	1	
							1,5l/ha		-	x	x		Pa	Rg		-	-	6	-	-	1		
SIGMA PLUS**	5 % amidosulfuron 3 % mésosulfuron-méthyl 1 % iodosulfuron-méthyle-natrium 9 % méfenpyr-diéthyle	1 2 2 pp	10410P/B	WG	R	21-31	0,3 kg/ha	1/culture	-	x			Vc, Jv	Da		-	-	10	-	-	10		
									-	x			Vc, Jv	Da		-	-	6	-	-	1		
							0,5 kg/ha		-	x			Vc, Pa, Jv	Rg		-	-	10	-	-	10		
SIGMA STAR**	0,9 % iodosulfuron-méthyle-natrium 4,5 % mésosulfuron-méthyle	2 2	10636P/B	WG	R	21-32	0,2 kg/ha	1/culture	-	x	x		Vc, Jv	Da		6	6	6	1	1	1		
							0,33 kg/ha		-	x			Vc, Pa	Rg		-	6	6	-	1	1		
SIGMA SUPRA**	5 % amidosulfuron 3 % mésosulfuron-méthyle 1 % iodosulfuron-méthyle-natrium 9 % méfenpyr-diéthyle	1 2 2 pp	10693P/B	WG	R	21-31	0,3 kg/ha	1/culture	-	x			Vc, Pa, Jv	Rg		-	-	10	-	-	10		
									-	x			Vc, Jv	Da		-	-	6	-	-	1		
SILVANET*	60 g/l triclopyr (HE)*** 20 g/l fluroxypyr	4 4	8629P/B	ME	F	-	3 l/100 l	1/an	-	x	x	x	x		Da		-	6	6	-	2	1	

Fiche culture

Epeautre (<i>Triticum spelta</i> L.) (recensement INS 2012): 9.824 ha en Wallonie / 516 ha en Flandre / 10.340 ha en Belgique (recensement INS 2015): 12.847 ha en Wallonie / 682 ha en Flandre / 13.548 ha en Belgique (recensement INS 2018): 12.732 ha en Wallonie / 1.020 ha en Flandre / 12.681 ha en Belgique	
L'épeautre, appelé aussi "blé des Gaulois", est une céréale proche du blé mais à graines vêtues L'épeautre se cultive comme un froment d'hiver sensible à la verse	
Période de semis:	Comme le froment d'hiver, jusqu'en décembre
Densité de semis:	L'objectif est d'atteindre une population de 200 plantes par m ² Le conseil est de 325 épillets/m ² en sols froids; 250-300 épillets/m ² en sols limoneux Le PMG (poids de mille grains) en épeautre considéré comme PME (poids de mille épillets) étant trop aléatoire, il n'est ni calculé ni mentionné sur les sacs
Fumure azotée:	Au total 105-120 unités en région froide et de 135 à 150 unités en région limoneuse, c'est 30 unités en moins qu'un froment
Fractionnement:	Un fractionnement en deux fractions est conseillé avec un apport plus important lors du tallage
	* Un produit autorisé en froment ne l'est pas forcément en épeautre Pour toute information, n'hésitez pas à contacter le CePiCOP
Désherbage*:	Semblable au froment d'hiver
Régulateur*:	Une ou deux intervention(s)
Fongicide*:	En fonction de la pression: un traitement complet au stade dernière feuille à l'épiaison !!! Vigilance contre rouille jaune (cf. en saison: avertissements CePiCOP) Principales maladies: oidium, rouille jaune, septoriose et rouille brune
Pour plus d'informations sur les produits, veuillez consulter les rubriques ad hoc des pages jaunes	
Récolte:	Grille ouverte pour ne pas surcharger le retour des otos Contre batteur ouvert et vitesse du batteur réduit pour diminuer le % de grains nus au battage Vent réduit
Rendement:	Production en grains vêtus comparable en poids à un froment Avant décorticage, le poids spécifique de l'épeautre = à la moitié de celui du froment A la récolte, la proportion de grains nus varie de 5 à 15 %
Avantages:	Céréale résistante au froid Remplace le froment en région froide Alimentation animale et humaine Grande production de paille Epi impénétrable, 1 jour sec après la pluie et on peut à nouveau récolter (2 jours en froment)
Inconvénients:	Sensible à la verse Les grains étant vêtus, le volume à semer ou à stocker est important
Pour plus d'informations, veuillez consulter, le cas échéant, les articles ad hoc des pages blanches	

<u>Triticale</u> (<i>Triticum secale</i> L.) Hybride issu du croisement entre le blé et le seigle très rustique, il s'adapte à tout types de sol (recensement INS 2012): 2.557 ha en Wallonie / 3.362 ha en Flandre / 5.919 ha en Belgique (recensement INS 2015): 3.203 ha en Wallonie / 2.473 ha en Flandre / 5.711 ha en Belgique (recensement INS 2018): 3.661 ha en Wallonie / 1.892 ha en Flandre / 5.586 ha en Belgique	
Période de semis:	Octobre
Densité de semis:	La même que pour le froment d'hiver
Fumure azotée:	10 à 20 unités en moins que le froment d'hiver Fractionnement en trois fois Ne pas forcer la dose de tallage
	* Un produit autorisé en froment ne l'est pas forcément en triticale Pour toute information, n'hésitez pas à contacter le CePiCOP
Désherbage*:	Idéalement, en préémergence
Régulateur*:	Assortiment équivalent au froment d'hiver, excepté pour les mélanges de chlorméquat et d'imazaquin
Fongicide*:	Surveiller les maladies du pied encas de précédent Surveiller la rouille jaune et oïdium Traitement fongicide complet à l'épiaison
Pour plus d'informations sur les produits, veuillez consulter les rubriques <i>ad hoc</i> des pages jaunes	
Récolte:	Comme le froment d'hiver
Rendement:	Comme les bons froments d'hiver (> à 100 quintaux) Rendement paille dépassant de 30 à 50 % celui du froment ou de l'orge
Avantages:	Rusticité Valeur fourragère comprise entre celle du blé et de l'escourgeon
Inconvénients:	Sensible à la verse et à la germination du pied
Pour plus d'informations, veuillez consulter, le cas échéant, les articles <i>ad hoc</i> des pages blanches	

Seigle
(*Secale cereale* L.)

Céréale à épi barbu. Deux grains par épillet. Auto-stérilité élevée, la fécondité est croisée

(recensement INS 2012): 263 ha en Wallonie / 256 ha en Flandre / 519 ha en Belgique
(recensement INS 2015): 190 ha en Wallonie / 198 ha en Flandre / 388 ha en Belgique
(recensement INS 2018): 343 ha en Wallonie / 263 ha en Flandre / 620 ha en Belgique

Période de semis:	Durant le courant d'octobre, de préférence durant la première quinzaine
Densité de semis:	250 grains/m ²
Fumure azotée:	En fonction du type de sol: 20 à 30 unités d'azote en moins que le froment d'hiver Réduire la 3 ^{ème} fraction d'azote par rapport au froment
	* Un produit autorisé en froment ne l'est pas forcément en seigle Pour toute information, n'hésitez pas à contacter le CePiCOP
Désherbage*:	Idéalement, en préémergence
Régulateur*:	Assortiment équivalent à l'orge
Fongicide*:	Surveiller la rouille brune, l'oïdium, en principe, un traitement juste avant l'épiaison avec un produit à bonne rémanence et à très bonne activité contre la rouille brune
Pour plus d'informations sur les produits, veuillez consulter les rubriques <i>ad hoc</i> des pages jaunes	
Récolte:	Comme les froments les plus précoces
Rendement:	Comme les variétés hybrides de froment
Bon CIPAN:	Ne gel pas, à enfouir. Possibilité de récolter comme fourrage au printemps
Avantages:	Résistance à l'hiver Adapté aux terres pauvres, ± acides (mais ressuyant bien) Production importante de paille
Inconvénients:	Pailles très hautes, risque de germination sur pied si verse
Pour plus d'informations, veuillez consulter, le cas échéant, les articles <i>ad hoc</i> des pages blanches	

Avoine de printemps**(*Avena sativa* L.)**

(recensement INS 2012): 2.212 ha en Wallonie / 586 ha en Flandre / 2.798 ha en Belgique

(recensement INS 2015): 2.508 ha en Wallonie / 522 ha en Flandre / 3.040 ha en Belgique

(recensement INS 2018): 2.984 ha en Wallonie / 446 ha en Flandre / 3.469 ha en Belgique

Période de semis:	Mi-février à début avril. Elle peut se cultiver en seconde paille L'avoine supporte bien les terres lourdes, humides et légèrement acides
Densité de semis:	250 grains/m ² à partir de mi-février (cette densité doit être augmentée de 50gr/m ² tous les 15 jours). En région froide: 400 grains/m ²
Fumure azotée:	80-100 unités fractionnées: 1/3 au tallage, 2/3 au redressement En région froide 120 unités: 2/3 au tallage, 1/3 au redressement
	* Un produit autorisé en froment ne l'est pas forcément en avoine de printemps Pour toute information, n'hésitez pas à contacter le CePiCOP
Désherbage*:	Généralement, uniquement des problèmes de dicotylées L'avoine est très concurrentielle vis-à-vis des adventices et est assez sensible aux herbicides
Insecticides*:	Si utile contre pucerons vecteurs de jaunisse nanisante (cf. en saison: avertissements CePiCOP)
Régulateur*:	Le principal risque de la culture est la verse
Fongicide*:	Une protection fongicide n'est rentabilisée que lors d'année à forte pression
Pour plus d'informations sur les produits, veuillez consulter les rubriques ad hoc des pages jaunes	
Récolte:	Comme le froment d'hiver
Rendement:	De 50 à 80 quintaux/ha, exceptionnellement plus selon les conditions printanières
Bon CIPAN:	Est détruite par le gel
Avantages:	Culture risique demandant peu d'investissements Excellent précédent Culture nettoyante (adventices) en transmettant peu de maladies Sèche vite, 1 jour sec après la pluie et on peut à nouveau récolter (2 jours en froment)
Inconvénients:	Sensibilité à la verse Parfois, difficultés à la récolte: mauvaise concordance de maturité paille et grains Rejet du pied en cas de verse
Pour plus d'informations, veuillez consulter, le cas échéant, les articles ad hoc des pages blanches	

Froment de printemps ou alternative (<i>Triticum aestivum</i> L.)	
(recensement INS 2012): 861 ha en Wallonie / 312 ha en Flandre / 1.173 ha en Belgique (recensement INS 2015): 1.512 ha en Wallonie / 2.019 ha en Flandre / 3.544 ha en Belgique (recensement INS 2018): 720 ha en Wallonie / 422 ha en Flandre / 1.143 ha en Belgique	
Période de semis:	Février à début avril
Densité de semis:	300 à 350 grains/m ²
Fumure azotée:	Fumures plus faibles que pour le froment d'hiver de 20-30 unités
	* Un produit autorisé en froment ne l'est pas forcément en froment de printemps Pour toute information, n'hésitez pas à contacter le CePiCOP
Désherbage*:	Choisir le produit en fonction des adventices présentes (en général, peu de graminées)
Insecticides*:	Rare. Si utile contre pucerons vecteurs de jaunisse nanisante (cf. en saison: avertissements CePiCOP)
Régulateur*:	En général, une seule intervention
Fongicide*:	En cas de maladies, un traitement fongicide à la dernière feuille !!! Vigilance contre rouille jaune (cf. en saison: avertissements CePiCOP)
Pour plus d'informations sur les produits, veuillez consulter les rubriques <i>ad hoc</i> des pages jaunes	
Récolte:	Mi-août
Rendement:	De 70 à 90 quintaux/ha
Avantages:	Prix identique au froment d'hiver Pas de problème de commercialisation Froment, en général, de très bonne qualité technologique
Inconvénients:	Rendement souvent inférieur à celui du froment d'hiver
Pour plus d'informations, veuillez consulter, le cas échéant, les articles <i>ad hoc</i> des pages blanches	

Orge de printemps**(*Hordeum vulgare* L.)**

(recensement INS 2012): 1.860 ha en Wallonie / 672 ha en Flandre / 2.532 ha en Belgique
 (recensement INS 2015): 2.351 ha en Wallonie / 1.485 ha en Flandre / 3.853 ha en Belgique
 (recensement INS 2018): 2.279 ha en Wallonie / 853 ha en Flandre / 3.165 ha en Belgique

Période de semis:	Mi-février à début avril, mi-mars étant l'optimum
Préparation du sol:	Labour et semis direct le même jour
Densité de semis:	De 200 à 250 grains/m ² en période normale
Fumure azotée:	90 unités au tallage (en fonction du précédent, des reliquats azotés et de la teneur en humus, cette fumure doit être adaptée) Correction éventuelle début montaison 0 à 30 unités d'azote
	* Un produit autorisé en froment ne l'est pas forcément en orge de printemps Pour toute information, n'hésitez pas à contacter le CePiCOP
Désherbage*:	Pas de préémergence en semis-hâtif
Insecticides*:	Rare. Si utile, contre pucerons vecteurs de jaunisse nanisante Suivre les avis émis en saison
Fongicide*:	Surveiller la culture en fin de tallage et à la dernière feuille
Régulateur*:	Si nécessaire, 3/4 dose de raccourcisseur pour orge d'hiver à la dernière feuille
Pour plus d'informations sur les produits, veuillez consulter les rubriques <i>ad hoc</i> des pages jaunes	
Récolte:	Après les froments les plus précoces
Rendement:	De 45 à 90 quintaux/ha
Intérêt:	Si débouché brassicole Prime agri-environnementale bien adaptée
Pour plus d'informations, veuillez consulter, le cas échéant, les articles <i>ad hoc</i> des pages blanches	

CALENDRIER DES TRAVAUX CULTURAUX

Les avisements "CePICOP - Actualité"

Recevoir dès après rédaction les avisements céréales, colza par fax ou courriel (La gratuité est réservée aux agriculteurs)

Contact: Rémy Blanchard 08162 21 39; rb.cepicop@centrespilotes.be, les avisements sont également consultables sur <https://centrespilotes.be/cp/cepicop/>

	Escourgeon	Froment d'hiver - Epeautre - Triticale	Froment de printemps	Avoine de printemps	Orge de printemps
Septembre	à partir du 20, semis <i>désherbage en prélevé *</i>				
Octobre	Fin des semis désherbage en post précoce	à partir du 110, semis <i>désherbage en prélevé *</i>			
	Fin octobre <i>désherbage post-automnal *</i>				
	<i>Aphicide *</i>				
Novembre	<i>Aphicide *</i>	<i>Aphicide *</i>			
Décembre					
Janvier	tallage	fin des semis			
Février	<i>herbicides anti-graminées *</i>	<i>herbicides anti-graminées *</i>	à partir de février: semis désherbage en prélevé	à partir de mi-février: semis désherbage en prélevé	Mi-février à début avril: semis
Mars	5-10 mars 1 ^{ère} fraction N	<i>désherbage anti-graminées *</i> 1 ^{ère} fraction N	tallage 1 ^{ère} fraction N	tallage 1 ^{ère} fraction N	tallage 1 ^{ère} fraction N <i>herbicides anti-dicotylées *</i> <i>herbicides anti-graminées *</i> <i>Aphicide *</i>
Avril	5-10 avril 2 ^{ème} fraction N au redressement surveillance maladies	2 ^{ème} fraction N régulateurs anti-verse, Cycocel fin des herbicides anti-graminées surveillance maladies	redressement 2 ^{ème} fraction N régulateurs anti-verse, Cycocel	redressement 2 ^{ème} fraction N <i>Aphicide *</i>	
Mai	surveillance maladies <i>fongicide au 1^{er} nœud *</i>	1 ^{er} mai <i>fongicide maladies du pied *</i>	protection fongicide	fin des herbicides anti-dicotylées protection fongicide	2 ^{ème} fraction N 1 ^{er} nœud: 10-15 mai <i>fin des aphicide *</i> <i>protection fongicide *</i> fin des herbicides
	1-5 mai 3 ^{ème} fraction N si liquide fin des herbicides anti-dicotylées	10-15 mai fin des herbicides anti-dicotylées			
	5-10 mai 3 ^{ème} fraction N si solide régulateurs anti-verse protection fongicide	20-25 mai 3 ^{ème} fraction N <i>régulateurs anti-verse *</i> <i>protection fongicide *</i>			
	20 mai				
Juin		01-10 juin: épiation fongicide	dernière feuille fin juin fongicide	dernière feuille régulateurs anti-verse, Cycocel	dernière feuille fongicide régulateur
Juillet	récolte	<i>insecticide *</i> récolte		récolte	récolte
Août		récolte	fin août: récolte	récolte	récolte

*: travail éventuel, cf. avisements